

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
SARAKSTS**

2020



Valsts augu aizsardzības dienests

RĪGA, 2020

UDK 632
La 805

Izdevējs: **Valsts augu aizsardzības dienests**

Izdevumu sagatavojuši

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta speciālisti:

Vents Ezers

Regīna Čūdere

Laila Krupenko

Anitra Lestlande

Maija Gudoviča

Vāka noformējumam izmantota **Valdas Meijeres** fotogrāfija.

Datormaketētāja **Zinta Muciņa-Pinka**

Sagatavots un iespiests SIA “N. I. M. S.”

Pērnavas ielā 47/B, Rīgā LV-1009

ISBN 978-9934-8739-1-1

SATURS

Ievads	5
Saīsinājumi un skaidrojumi	6
Alfabētiskie rādītāji	7
Latvijas Republikā reģistrētie ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi	7
Latvijas Republikā reģistrētie trešās reģistrācijas klases ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi	18
Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu un paralēlo tirdzniecības atļauju darbīgās vielas	19
Latvijas Republikā reģistrētie mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	28
Latvijas Republikā reģistrētie dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi	28
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā	30
Izsniegtās atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlajai tirdzniecībai	31
Augu aizsardzības līdzekļu saraksts, kuriem 2019.gadā izmainīts nosaukums	32
2018. un 2019. gadā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulētie ieraksti	32
2019. gadā anulētās atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlajai tirdzniecībai	34
Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi	35
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus atsevišķās kultūrās nedrīkst lietot tuvāk par 40 / 35 / 30 / 25 / 20 / 15 / 12 vai 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm	35
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus nedrīkst lietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm	38
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus nedrīkst lietot tuvāk par 15 / 16 / 25/ 30 vai 50 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm	39
Citi Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi	40
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir kaitīgi bitēm	41
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus lietojot, ir jāievēro aizsardzības pasākumi blakuskultūrām un citiem ar lietojumu nesaistītiem organismiem	41
Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kuriem ir noteikti lietošanas ierobežojumi attiecībā uz darbīgo vielu.	46
Augu aizsardzības līdzekļu lietojumi	48
Augu augšanas regulatori	48
Dezinfekcijas līdzekļi	59
Kodnes	61
Fungicīdi	71
Herbicīdi	181
Insekticīdi un akaricīdi	256
Limacīdi	283
Repelenti	291
Rodenticīdi	293
Mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	294
Dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi	305

Augu aizsardzības līdzekļi, kuriem paplašināta darbības joma, iekļaujot tajā mazos lietojumus	323
Fungicīdi Kartupeļu lakstu puves (<i>Phytophthora infestans</i>) ierobežošanai	326
Fungicīdi augļu dārziem	327
Kodnes ziemāju graudaugu sēklu kodināšanai, to devas un ierobežojamās augu slimības	328
Kodnes vasarāju graudaugu sēklu kodināšanai, to devas un ierobežojamās augu slimības	329
Fungicīdi graudaugiem	330
Mieži	330
Kvieši	331
Rudzi	333
Tritikāle	334
Auzas	335
Fungicīdi rapsim	336
Ziemas rapsis	336
Vasaras rapsis	337
Apstrādājamo kultūraugu un citu objektu rādītājs	338
Latvijas tīrumos izplatītākās nezāles	370
Augu aizsardzības jomu regulējošie normatīvie akti	373
Augu aizsardzības likums	373
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū	385
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi	393
Aizsargjoslu likuma izraksts	398
Izraksts no likuma “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”	403
Valsts augu aizsardzības dienesta telefona numuri	404
Rapša fenoloģiskās attīstības stadijas	405
Sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas	406

IEVADS

Cienījamie augu aizsardzības līdzekļu lietotāji!

Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD) ir sagatavojis augu aizsardzības līdzekļu sarakstu (turpmāk – AAL) 2020. gadam, kurā ir iekļauti 447 Latvijas Republikā reģistrētie AAL, tai skaitā 381 ķīmiskais, 59 dzīvos organismus saturoši un 7 mikrobioloģiskie līdzekļi. Lai ielādētu AAL sarakstu viedtālrunī, izmantojiet zemāk redzamo QR kodu. Latvijā atļauts ievest, izplatīt un lietot tikai AAL reģistrā iekļautos AAL. AAL iegādājieties licencētās AAL izplatīšanas vietās, jo tikai tā varat gūt pārliecību par produkta kvalitāti un drošumu. Lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi un novērstu AAL atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī, AAL jālieto saskaņā ar augu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un jāievēro norādes AAL marķējumā.

Eiropas Savienībā turpinās AAL darbīgo vielu apstiprinājuma pārskatīšanas programma, kuras ietvaros tiks novērtēta vielu atbilstība pašreizējām pārtikas drošības un vides aizsardzības prasībām. Pārskatīšanas rezultātā daļa vielu no tirgus tiks izņemta vai arī tiks ierobežota tās saturošu AAL lietošana. Šajā izdevumā atradīsiet 2018. un 2019. gadā anulēto AAL sarakstu, kā arī AAL krājumu izplatīšanas un izlietošanas termiņus. Vielu apstiprinājuma pārskatīšanas lēmumus Eiropas Komisija pieņem cauru gadu, tāpēc aicinām lauksaimniekus sekot līdzi aktualitātēm VAAD mājaslapā. Jaunāko informāciju par veiktajām izmaiņām AAL reģistrā atradīsiet Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapas www.vaad.gov.lv sadaļā “Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība”.

Augu aizsardzība ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem kvalitatīvas ražas ieguvei. Vienlaikus sabiedrība pieprasa, lai pārtikas ražošanas metodes būtu vidi saudzējošas un ilgtspējīgas. Šī gada janvārī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas rīcības plānu AAL ilgtspējīgai izmantošanai, kurā ir izvirzīts mērķis mazināt AAL lietošanas radīto risku un ietekmi uz cilvēka veselību un vidi un sekmēt integrētās augu aizsardzības un alternatīvo paņēmieni pilnveidošanu un ieviešanu. Jau šobrīd integrētās augu aizsardzības vispārīgie principi un prasības ir saistoši ikvienam profesionālai lietošanai paredzēto AAL lietotājam. Lai novērtētu, cik lielā mērā saimniecība atbilst IAA prasībām, VAAD aicina lauksaimniekus izmantot pašpārbaudes anketas, kuras pieejamas tīmekļa vietnē <http://noverojumi.vaad.gov.lv> sadaļā “Integrētā audzēšana > Normatīvie akti, metodikas un veidlapu paraugi”. Šajā vietnē ir ievietots plašs IAA informatīvu materiālu klāsts, kas noderēs ikvienam lauksaimniekam.

Noslēgumā vēlos atgādināt, ka AAL aprītē un lietošanā iesaistītajām personām ir jābūt apmācītām. Plašāku informāciju par apmācību veicējiem var iegūt dienesta mājaslapas sadaļā „Pakalpojumi > Augu aizsardzības jomas apmācības”, savukārt apmācību norises laiki un vietas ir atrodamī sadaļā „Augu aizsardzības apmācību KALENDĀRS”. Strādājot ar AAL, atļauts lietot tikai regulāri – ik pēc trīs gadiem – pārbaudītas AAL lietošanas iekārtas. Pārbaudes veic VAAD sertificēti pārbaudītāji, kuru kontaktinformācija publicēta mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes”.

Ja Jums nepieciešama palīdzība jautājumos par prasībām AAL laišanai tirgū un lietošanai vai citos ar augu aizsardzību saistītos jautājumos, sazinieties ar VAAD speciālistiem, kuru kontaktinformāciju varat atrast šī izdevuma nobeigumā un VAAD mājaslapā.

Veiksmi vēlot,
Valsts augu aizsardzības dienesta direktore
2020. gada februārī



K. Lifanova

SAĪSINĀJUMI UN SKAIDROJUMI

A	akaricīds	k.v.v.	koloniju veidojošas vienības
AAL	augu aizsardzības līdzeklis	konc.	koncentrācija
AR	augu augšanas regulators	Lim	limacīds
AS	attīstības stadijas: decimālā kodu sistēma graudaugu attīstības stadiju noteikšanai Zadoks, Chang, Kozak, 1974 rapša fenoloģiskās attīstības stadijas, BBCH skala sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas, BBCH skala	l	litrs
CS	kapsulu suspensija	Me	mikroemulsija
Dez	dezinfekcijas līdzeklis	ml	mililitrs
d.g.; WG	disperģējošas granulas	OD	dispersija eļļā
Dz	dzīvos organismus saturošais augu aizsardzības līdzeklis	p.s.; WP	pulveris suspensijai
EG	emulgējošas granulas	prep.	preparāts
e.k.; EC	emulsijas koncentrāts	R	repelents
e.ū.; EW	emulsija ūdenī	Reģ. klase	reģistrācijas klase
F	fungicīds	Reģ. Nr.	reģistrācijas numurs
F/A	fungicīds – akaricīds	Ro	rodenticīds
g	grams	s., susp.	suspensija
H	herbicīds	s.e., SE	suspo-emulsija
I	insekticīds	s.k.; SC; FS	suspensijas koncentrāts
I/A	insekticīds – akaricīds	š.k.; SL	šķīstošs koncentrāts vai šķīduma koncentrāts
Liet. kat.	lietošanas kategorija	š.g.; SG	šķīstošas granulas
K	kodne	V	viricīds
k.k.f.	koncentrāts karstai fumigācijai	VAAD	Valsts augu aizsardzības dienests
		•	reģistrēts kaitīgā organisma ierobežošanai
		z •	reģistrēts kaitīgā organisma ierobežošanai ziemāju graudaugos
		ZC	kapsulu suspensijas un suspensijas koncentrāta maisījums

Nogaidīšanas laiks	Laiks no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai, dienās
Aizsargjoslas platums	noteikts joslas platums no ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kurā aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus (10 m). Dažiem augu aizsardzības līdzekļiem tas var būt lielāks, tāpēc jāievēro nosacījumi, kas norādīti lietošanas instrukcijās.
Analogie augu aizsardzības līdzekļi	Reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu citi tirdzniecības nosaukumi vai identiski augu aizsardzības līdzekļi, kuriem izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

ALFABĒTISKIE RĀDĪTĀJI

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE ĶĪMISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Reģ. beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4-D Nufarm	H	Nufarm GmbH & Co KG	0095	2	2.4-D	600 g/l	31.12.2031.	181
Accurate 200 WG	H	Nufarm GmbH & Co KG	0342	2	metil- metsulfurons	200 g/kg	31.03.2024.	181
Acrobat Plus	F	SIA BASF	0156	2	dimetomorfs mankocebs	90 g/kg 600 g/kg	31.07.2021.	71
Actellic 50 EC	I/A	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0170	2	metil-pirimifoss	50 %	31.07.2021.	256
Adexar XE	F	SIA BASF	0404	2	fluksapiroksāds epoksikonazols	62.5 g/l 62.5 g/l	30.04.2020.	71
Afrodyta 250 SC	F	Pestila Il Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.	0674	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	74
Agil 100 EC	H	ADAMA Registrations B.V.	0003	2	propakvizafops	100g/l	30.11.2022.	182
Agroksons 75 š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0048	2	MCPA	750 g/l	31.10.2021.	184
Aliette	F	Bayer AG	0650	2	alumīnija fosetils	800 g/kg	30.04.2020.	74
Altima 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0176	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2021.	75
Amistar 250 SC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0187	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2022.	76
Amistar Gold	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0632	2	azoksistrobīns difenokonazols	125 g/l 125 g/l	31.12.2021.	80
Ampera	F	Nufarm GmbH & Co KG	0314	2	tebukonazols prohlorazs	133 g/l 267 g/l	31.08.2020.	81
Ariane S	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0188	2	fluoksipirs klopīralīds MCPA	40 g/l 20 g/l 200 g/l	30.04.2021.	184
Arrat	H	SIA BASF	0249	2	tritosulfurons dikamba	250 g/kg 500 g/kg	31.12.2020.	185
Arrva	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0695	2	MCPA fluoksipirs klopīralīds	233 g/l 50 g/l 28 g/l	30.04.2021.	218
Artina EC	AR/F	Globachem n.v.	0653	2	metkonazols	90 g/l	30.04.2020.	51,120
Ascra Xpro	F	Bayer AG	0549	2	biksafēns protiokonazols fluopīrams	65 g/l 130 g/l 65 g/l	31.07.2021.	82
Attribut	H	Bayer AG	0191	2	Na- propoksikarbazons	700 g/kg	31.08.2033.	185
Avaunt	I	Cheminova A/S	0418	2	indoksakarbs	150 g/l	31.10.2020.	256
Avoxa	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0525	2	pinoksadēns piroksulams	33.3 g/l 8.33 g/l	30.04.2025.	185
Avtar 75 NT	F	Indofil Industries (Netherlands) B.V.	0668	2	mankocebs	750 g/kg	31.01.2021.	100
Azaka	F	Cheminova A/S	0557	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2022.	83
Axial 50 EC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0304	2	pinoksadēns	50 g/l	31.12.2020.	186
Banarg	AR	SIA AGA	0627	2	etilēns	4 %	31.08.2023.	48
Banjo Forte	F	ADAMA Registrations B.V.	0510	2	fluazinams dimetomorfs	200 g/l 200 g/l	28.02.2022.	84
Banvel 4S	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0038	2	dikamba	480 g/l	31.12.2020.	186

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barbarian Biograde 360 š.k.	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0299	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	187
Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0289	2	glifosāts	490 g/l	31.12.2020.	189
Barbarian Super 360	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0503	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	187
Barca 334 SL	H	Pestila II Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.	0560	2	klopiralids piklorams	267 g/l 67 g/l	30.04.2021.	190
Bariton Super	K	Bayer AG	0612	2	protiokonazols tebukonazols fludioksonils	50 g/l 10 g/l 37.5 g/l	31.05.2020.	61
Basagran 480	H	SIA BASF	0024	2	bentazons	480 g/l	30.06.2020.	190
Baythroid	I	Nufarm GmbH & Co KG	0537	2	beta-ciflutrīns	25 g/l	31.10.2021.	257
Belkar	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0598	2	metil-halauksifēns piklorams	10 g/l 48 g/l	31.12.2021.	191
Bell	F	SIA BASF	0290	2	boskalīds epoksikonazols	233 g/l 67 g/l	31.07.2020.	84
Bell Super	F	SIA BASF	0377	2	boskalīds epoksikonazols	140 g/l 50 g/l	13.09.2021.	86
Bertego	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0594	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2021.	54
Betanal	H	Bayer AG	0291	2/3	fenmedifams	160 g/l	31.07.2020.	192
Biathlon 4D	H	SIA BASF	0450	2	tritosulfurons florasulams	714 g/kg 54 g/kg	30.11.2021.	192
Biscaya OD	I	Bayer AG	0459	2	tiakloprīds	240 g/l	30.04.2021.	256
Bolid 250 EC	F	Innvigo Sp. z o.o.	0682	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2025.	87
Boxer 800 EC	H	Syngenta Crop Protection AG	0271	2	prosulfokarbs	800 g/l	31.10.2020.	192
Brasan 540 EC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0320	2	dimetahlors klomazons	500 g/l 40 g/l	31.10.2020.	193
Broadway Star	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0571	2	piroksulams florasulams	70.8 g/kg 14.2 g/kg	30.04.2025.	194
Bulldock 025 EC	I	Nufarm GmbH & Co KG	0090	2	beta-ciflutrīns	25 g/l	31.10.2021.	257
Buteo Start	K	Bayer AG	0710	2	flupiradifurons	480 g/l	09.12.2026.	61
Butisan 400	H	SIA BASF	0037	2	metazahlors	400 g/l	31.07.2022.	194
Butisan Avant	H	SIA BASF	0497	2	metazahlors dimetēnamīds-P kvinmeraks	300 g/l 100 g/l 100 g/l	31.08.2020.	195
Butisan Kombi	H	SIA BASF	0470	2	metazahlors dimetēnamīds-P	200 g/l 200 g/l	31.08.2020.	195
Butisan Pro	H	SIA BASF	0629	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	31.08.2020.	250
Butisan Star	H	SIA BASF	0258	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	31.07.2022.	195
Butoxone	H	Nufarm GmbH & Co KG	0138	2	MCPB	400 g/l	31.10.2021.	195
Cabrio Duo	F	SIA BASF	0508	2	dimetomorfs piraklostrobīns	72 g/l 40 g/l	31.01.2022.	87
Calibre 50 SX	H	Cheminova A/S	0301	2	metil-tifensulfurons metil-tribenurons	333 g/kg 167 g/kg	31.12.2020.	196
Callisto 100 SC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0700	2	mezotrions	100 g/l	31.05.2033.	196
Calma	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0521	2	etil-trineksapaks	175 g/l	30.04.2020.	58
Candit	F	SIA BASF	0197	2	metil-krezoksims	500 g/kg	31.12.2022.	88
Cantus	F	SIA BASF	0280	2	boskalīds	500 g/kg	31.07.2020.	89
Cantus Gold	F	SIA BASF	0468	2	boskalīds dimoksistrobīns	200 g/l 200 g/l	31.07.2020.	89
Caryx	AR	SIA BASF	0440	2	mepikvāta hlors metkonazols	210 g/l 30 g/l	28.02.2022.	48
CCC	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0147	2	hlormekvāta hlors	750 g/l	30.11.2022.	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
CDQ SX	H	Cheminova A/S	0589	2	metil-metsulfurons metil-tribenurons	111 g/kg 222 g/kg	31.12.2022.	196
Celest Trio 060 FS	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0380	2	fludioksonils difenokonazols tebukonazols	25 g/l 25 g/l 10 g/l	27.10.2021.	62
Centurion Plus	H	Arysta LifeScience S.A.S.	0509	2	kletodims	120 g/l	31.05.2022.	197
Ceriox	F	SIA BASF	0405	2	fluksapiroksāds epoksikonazols piraklostrobīns	41.6 g/l 41.6 g/l 66.6 g/l	30.04.2020.	90
Cerone	AR	Bayer AG	0122	2	etefons	480 g/l	31.07.2021.	49
Cervacol extra	R	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG	0337	3	kvarca smiltis	251 g/kg	31.08.2020.	291
Cezix	F	Rotam Agrochemical Europe Limited	0512	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2021.	95
Chambel 6 FS	K	Nufarm GmbH & Co KG	0309	2	tebukonazols	60 g/l	31.08.2021.	62
Champion 50 WG	F	Nufarm GmbH & Co KG	0139	2	vara hidroksīds (kā varš)	500 g/kg	31.01.2023.	91
Chorus 50 WG	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0339	2	ciprodinils	500 g/kg	30.04.2021.	92
Chwastox 750 SL	H	CIECH Sarzyna S.A.	0376	2	MCPA	750 g/l	08.02.2020.	198
Cidely Top	F	Syngenta Crop Protection AG	0472	2	difenokonazols ciflufenamīds	125 g/l 15 g/l	31.12.2020.	93
Ciperkils 500 e.k.	I	Arysta LifeScience Benelux Sprl	0385	2	cipermetrīns	500 g/l	31.10.2021.	258
Clamox	H	SIA BASF	0496	2	metazahlors imazamoks	375 g/l 17.5 g/l	31.07.2020.	198
Clap Forte	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0643	2	klopīrālīds	720 g/kg	30.04.2020.	198
Cleave	H	ADAMA Registrations B.V.	0542	2	florasulams fluoksipīrs	2.5 g/l 100 g/l	31.12.2022.	199
Cleravo	H	SIA BASF	0572	2	imazamokss kvinmeraks	35 g/l 250 g/l	31.12.2021.	199
Clinic Up	H	Nufarm GmbH & Co KG	0554	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	187
Cliophar 600 SL	H	Arysta LifeScience Benelux Sprl	0665	2	klopīrālīds	600 g/l	30.04.2020.	199
Comet Pro	F	SIA BASF	0354	2	piraklostrobīns	200 g/l	21.07.2020.	94
Comrade	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0561	2	azoksistrobīns ciprokonazols	200 g/l 80 g/l	31.12.2022.	94
Countdown NT	AR	Cheminova A/S	0599	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2021.	49
Cuadro NT	AR	Cheminova A/S	0544	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2021.	49
Curbatur	F	Bayer AG	0655	2	protiokonazols	250 g/l	31.07.2020.	151
Cycocel 750	AR	SIA BASF	0096	2	hlormekvāta hlorīds	750 g/l	30.11.2022.	50
DARCOS	F	Rotam Agrochemical Europe Limited	0438	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2021.	95
Decis Forte	I	Bayer AG	0703	2	deltametrīns	100 g/l	31.10.2021.	259
Decis Mega	I	Bayer AG	0310	2	deltametrīns	50 g/l	31.10.2020.	261
Delan Pro	F	SIA BASF	0628	2	ditianons kālija fosfonāts	125 g/l 561 g/l	31.05.2022.	40
Delaro	F	Bayer AG	0638	2	trifloksistrobīns protiokonazols	150 g/l 175 g/l	31.12.2021.	96
Delmetros 100 SC	I	Innvigo SP. z o.o.	0675	2	deltametrīns	100 g/l	31.10.2020.	262
Detia Wühlmausgas	R	Detia Freyberg GmbH	0584	2/3	kalcija karbīds	800 g/kg	31.08.2023.	291
Devrinols s.k.	H	UPL Europe Ltd	0252	2	napropamīds	450 g/l	31.12.2024.	200
Dicash	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0597	2	dikamba	480 g/l	31.12.2021.	201
Dicoherb Super 750 SL	H	Nufarm GmbH & Co KG	0390	2	MCPA dikamba	660 g/l 90 g/l	31.12.2021.	201
Difcor 250 EC	F	Globachem n.v.	0580	2	difenokonazols	250 g/l	31.12.2021.	98
Difend	K	Globachem n.v.	0439	2	difenokonazols	30 g/l	31.12.2020.	62
Difenzone	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0421	2	difenokonazols	250 g/l	31.12.2020.	100
Diflanil 500 SC	H	Globachem n.v.	0530	2	diflufenikans	500 g/l	31.12.2021.	201

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dithane NT	F	Indofil Industries (Netherlands) B.V.	0017	2	mankocebs	750 g/kg	31.01.2021.	100
DMA 600	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0559	2	2.4-D	600 g/l	31.12.2031.	201
Dominic	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0538	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2021.	174
Duett Ultra	F	SIA BASF	0319	2	epoksikonazols metil-tiofanāts	187 g/l 310 g/l	31.10.2020.	102
Duplozāns Super š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0084	2	dihlorprops-P MCPA mekoprops-P	310 g/l 160 g/l 130 g/l	31.10.2021.	202
Effector	F	SIA BASF	0134	2	ditianons	700 g/kg	31.05.2022.	103
Eflor	F	SIA BASF	0372	2	boskalids metkonazols	133 g/l 60 g/l	02.11.2021.	105
Elatus Era	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0552	2	benzovindiflupirs protiokonazols	75 g/l 150 g/l	31.07.2021.	105
Elatus Plus	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0574	2	benzovindiflupirs	100 g/l	02.03.2024.	106
Elegant 2FD	H	ADAMA Registrations B.V.	0478	2	florasulams 2.4-D	6.25 g/l 300 g/l	31.12.2020.	202
Elektis 75 d.g.	F	Gowan Crop Protection Limited	0179	2	zoksamīds mankocebs	83 g/kg 667 g/kg	31.01.2022.	107
Elumis 105 OD	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0573	2	mezotriions nikosulfurons	75 g/l 30 g/l	31.12.2020.	202
Envidor	I/A	Bayer AG	0550	2	spirodiklofēns	240 g/l	31.07.2021.	262
Epo Extra	F	ADAMA Registrations B.V.	0402	2	epoksikonazols folpets	50 g/l 375 g/l	30.04.2020.	108
Epo Top	F	ADAMA Registrations B.V.	0389	2	epoksikonazols fenpropidīns	40 g/l 100 g/l	10.01.2022.	109
Erasmus	F	Rotam Agrochemical Europe Limited	0513	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2021.	95
Ergon	H	Rotam Agrochemical Europe Limited	0357	2	metil- metsulfurons metil- tifensulfurons	68 g/kg 682 g/kg	01.04.2020.	202
Estets 600 e.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0305	2	2.4-D	600 g/l	30.06.2020.	203
Evure	I	ADAMA Registrations B.V.	0577	2	tau-fluvalināts	240 g/l	31.05.2022.	272
Falcon Forte	F	Bayer AG	0343	2	protiokonazols spiroksamīns tebukonazols	53 g/l 224 g/l 148 g/l	31.08.2021.	110
Fastac 50	I	SIA BASF	0250	2	alfa-cipermetrīns	50 g/l	31.07.2021.	264
Fenix	H	Bayer AG	0283	2	aklonifēns	600 g/l	31.07.2023.	203
Ferramol	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0395	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	31.12.2031.	283
Fibro	I/A	Belchim Crop Protection NV	0460	2	parafīnēļa	797 g/l	31.12.2021.	266
Fleksiti s.k.	F	SIA BASF	0265	2	metrafenons	300 g/l	30.04.2021.	111
Flight Forte	H	SIA BASF	0293	2	pendimetalīns pikolinafēns	320 g/l 16 g/l	31.10.2020.	204
Flurostar 180	H	Globachem n.v.	0644	2	fluoksipirs	180 g/l	31.12.2022.	205
Frequent	H	Sharda Cropchem España S.L.	0691	2	butil-fluazifops-P	125 g/l	31.12.2024.	210
Focus Ultra	H	SIA BASF	0065	2	cikloksidīms	100 g/l	31.05.2022.	205
Folicur	F/AR	Bayer AG	0057	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2021.	50,111
Fornet 4 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0436	2	nikosulfurons	40 g/l	31.12.2020.	227
Fornet Max 6 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0433	2	nikosulfurons	60 g/l	31.12.2020.	228
Fox 480 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0375	2	bifenokss	480 g/l	31.12.2021.	209
Foxtrot 69 EW	H	Cheminova A/S	0408	2	etil- fenoksaprops-P	69 g/l	31.12.2020.	210
Frowncide 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0475	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2021.	75
Fuego Top	H	ADAMA Registrations B.V.	0483	2	metazahlor kvinmeraks	375 g/l 125 g/l	31.07.2022.	249
Fury 100 EW	I	FMC Chemical, sprl	0256	2	zeta-cipermetrīns	100 g/l	30.11.2022.	267
Fusilade Forte 150 EC	H	Nufarm GmbH & Co KG	0182	2	butil-fluazifops-P	150 g/l	31.12.2022.	211
Galera š.k.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0313	2	klopīralīds piklorams	267 g/l 67 g/l	31.12.2021.	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Galistop 200	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0602	2	fluroksipirs	200 g/l	31.12.2022.	217
Gallup Super 360	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0502	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	187
Gemino	F	ADAMA Registrations B.V.	0490	2	epoksikonazols tebukonazols	45 g/l 150 g/l	31.08.2020.	112
Gepard 50 EC	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0607	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	30.11.2022.	237
Glifomaks Plus š.k.	H	Albaugh TKI d.o.o.	0316	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	213
Globaztar 250 SC	F	Globachem n.v.	0626	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2022.	113
Glyphomax 480	H	Albaugh TKI d.o.o.	0386	2	glifosāts	480 g/l	30.01.2022.	214
Goltix 700 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0155	2	metamitrons	700 g/l	31.08.2023.	216
Graminis	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0592	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	30.11.2022.	237
Granprotec	I	Sharda Cropchem España S.L.	0664	2	deltametrīns	25 g/l	31.10.2020.	267
Granstar Premia 50 SX	H	Cheminova A/S	0255	2	metil-tribenurons	500 g/kg	31.10.2020.	216
Grassrooter	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0709	2	etefons	480 g/l	31.07.2021.	50
Grodyl	H	Bayer AG	0028	2	amidosulfurons	75 %	31.12.2020.	216
Gusto	Lim	ADAMA Registrations B.V.	0489	2/3	metaldehīds	30 g/kg	31.05.2022.	283, 284
Herbos 110 EC	H	Innvigo Sp. z o.o.	0680	2	etil-fenoksaprops-P	110 g/l	31.12.2020.	217
Hurler	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0601	2	fluroksipirs	200 g/l	31.12.2022.	217
Hussar Activ Plus OD	H	Bayer AG	0588	2	2,4-D 2-etilheksil esteris nātrija metil-jodosulfurons metil-tiēnkarbazons	300 g/l 10 g/l 7.5 g/l	30.06.2025.	217
Imtrex XE	F	SIA BASF	0406	2	fluksapiroksāds	62.5 g/l	31.12.2023.	114
Infinito	F	Bayer AG	0302	2/3	propamokarbs fluopikolids	523.8 g/l 62.5 g/l	31.07.2021.	115, 116
Input	F	Bayer AG	0266	2	protiokonazols spiroksamīns	160 g/l 300 g/l	31.07.2021.	117
Input Triple	F	Bayer AG	0651	3	protiokonazols spiroksamīns prokvinazīds	160 g/l 200 g/l 40 g/l	31.07.2020.	118
Ironmax Pro	Lim	De Sangosse S.A.S.	0630	2	dzelzs (III) fosfāts	24.2 g/kg	31.12.2031.	285
Juventus 90	F	SIA BASF	0221	2	metkonazols	90 g/l	30.04.2021.	51, 120
Kaiso 50 EG	I	Nufarm GmbH & Co KG	0381	2	lambda-cihalotrīns	50 g/kg	09.11.2021.	268
Kalif 360 CS	H	ADAMA Registrations B.V.	0409	2	klomazons	360 g/l	31.10.2021.	218
Kalif Mega	H	ADAMA Registrations B.V.	0410	2	klomazons metazahlors	33 g/l 250 g/l	31.07.2022.	218
Kantik	F	ADAMA Registrations B.V.	0495	2	fenpropidīns prohlorazs tebukonazols	150 g/l 200 g/l 100 g/l	31.12.2021.	122
Karate Zeon 5 CS	I	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0207	2	lambda-cihalotrīns	50 g/l	31.12.2020.	268
Kestac 50	I	SIA BASF	0251	2	alfa-cipermetrīns	50 g/l	31.07.2021.	264
Kinto	K	SIA BASF	0262	2	tritikonazols prohloraza vara hlorīds	20 g/l 60 g/l	30.04.2021.	63
Kinto Plus	K	SIA BASF	0662	2	tritikonazols fluksapiroksāds fludioksonils	33.3 g/l 33.3 g/l 33.3 g/l	31.10.2020.	63
Kinvara	H	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0672	2	MCPA fluroksipirs klopīralīds	233 g/l 50 g/l 28 g/l	30.04.2021.	218

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
K-Obiol	I	Bayer A/S	0394	2	deltametrīns	25 g/l	04.03.2020.	270
Komplet	H	Bayer AG	0393	2	flufenacets diflufenikans	280 g/l 280 g/l	31.12.2020.	219
Korvetto	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0663	2	metil- halauksifēns klopīralīds	5 g/l 120 g/l	30.04.2020.	219
Kyleo	H	Nufarm GmbH & Co KG	0423	2	glifosāts 2.4 -D	240 g/l 160 g/l	30.06.2020.	219
Lancelot	H	Dow AgroScience Danmark A/S	0524	2	aminopīralīds florasulams	300 g/kg 150 g/kg	31.12.2025.	220
Landmaster 360 TF	H	Albaugh TKI d.o.o.	0640	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	187
Latitude XL	K	Certis Europe B.V.	0485	2	siltiofams	125 g/l	31.12.2021.	64
Leander	F	ADAMA Registrations B.V.	0397	2	fenpropidīns	750 g/l	31.12.2021.	123
Leimay SC	F	Nissan Chemical Europe S.A.S.	0346	2	amisulbroms	200 g/l	30.06.2025.	123
Legacy 500 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0411	2	diflufenikans	500 g/l	31.12.2021.	221
Legacy Pro	H	ADAMA Registrations B.V.	0415	2	diflufenikans pendīmetalīns hlortolurons	40 g/l 300 g/l 250 g/l	31.12.2021.	221
Lentagran WP	H	Belchim Crop Protection NV	0330	2	piridāts	450 g/kg	31.12.2031.	221
Leopard	H	ADAMA Registrations B.V.	0424	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	30.11.2022.	223
Librax	F	SIA BASF	0481	2	fluksapīroksāds metkonazols	62.5 g/l 45 g/l	30.04.2020.	124
Lima Oro	Lim	Sharda Europe b.v.b.a.	0568	2/3	metaldehīds	50 g/kg	31.05.2022.	287, 289
Limgol	Lim	Sharda Europe b.v.b.a.	0586	2	metaldehīds	50 g/kg	31.05.2022.	287
Lontrel 72 SG	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0388	2	klopīralīds	720 g/kg	30.04.2021.	224
Lontrel 600 SL	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0666	2	klopīralīds	600 g/l	30.04.2020.	223
MAGTOXIN TABLET	I/A	Detia Degesch GmbH	0111	1	magnija fosfīds foramsulfurons	66 % 30 g/l	31.08.2023.	270
Maister Power OD	H	Bayer AG	0543	2	nātrija metil- jodosulfurons metil- tiēnkarbazons	1 g/l 10 g/l	31.03.2020.	225
Manfil 75 WG	F	Indofil Industries Limited	0425	2	mankocebs	75 %	31.01.2021.	126
Manfil 80 WP	F	Indofil Industries Limited	0426	2	mankocebs	80 %	31.01.2021.	127
Maracas	F	ADAMA Registrations B.V.	0484	2	epoksikonazols prohlorazs	50 g/l 225 g/l	30.04.2020.	127
Maredo 125 SC	F	ADAMA Registrations B.V.	0373	2	epoksikonazols	125 g/l	15.05.2021.	128
Mateno Duo	H	Bayer AG	0704	2	aklonifēns diflufenikans	500 g/l 100 g/l	31.12.2021.	225
Maxim 025 FS	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0089	2	fludioksonīls	25 g/l	31.10.2021.	64
Maxim Extra 050 FS	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0272	2	difenokonazols fludioksonīls	25 g/l 25 g/l	31.12.2021.	64
Maxim Star 025 FS	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0150	2	fludioksonīls ciprokonazols	18.75 g/l 6.25 g/l	31.05.2022.	65
Mavita 250 EC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0576	2	difenokonazols	250 g/l	31.12.2020.	165
Mavrik	I	ADAMA Registrations B.V.	0526	2/3	tau-fluvalināts	240 g/l	31.05.2022.	272, 273
MCPA 750	H	Nufarm GmbH & Co KG	0135	2	MCPA	750 g/l	31.10.2021.	225
MCPA Classic 750 SL	H	CIECH Sarzyna S.A.	0532	2	MCPA	750 g/l	31.10.2020.	
MCPA Super 500 š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0119	2	MCPA	500 g/l	31.10.2021.	226
Medax Max	AR	SIA BASF	0511	2	kalcija proheksadions etil-trineksapaks	50 g/kg 75 g/kg	30.04.2021.	51
Medax Top	AR	SIA BASF	0347	2	kalcija proheksadions mepīkvāta hlorīds	50 g/l 300 g/l	28.02.2022.	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menno Florades	Dez	MENNO Chemie-Vertrieb GmbH	0593	2	benzoscābe	90 g/l	31.01.2021.	59
Meridian	Lim	Sharda Europe b.v.b.a.	0569	2	metaldehīds	50 g/kg	31.05.2022.	287
Merpan 80 WG	F	ADAMA Registrations B.V.	0499	2	kaptāns	800 g/kg	30.06.2024.	130
Metazamix™	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0500	2	metazahlors aminopiralīds piklorams	500 g/l 5.3 g/l 13.3 g/l	31.07.2022.	226
Metric ZC	H	Belchim Crop Protection NV	0344	2	metribuzīns klomazons	233 g/l 60 g/l	31.10.2021.	227
Mezzo WG	H	Nufarm GmbH & Co KG	0322	2	metil- metsulfurons	200 g/kg	31.03.2024.	227
Milagro 4 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0223	2	nikosulfurons	40 g/l	31.12.2020.	227
Milagro Extra 6 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0361	2	nikosulfurons	60 g/l	31.12.2020.	228
Mirador 250 SC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0591	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2022.	76
Mirador Forte	F	ADAMA Registrations B.V.	0558	2	azoksistrobīns tebukonazols	60 g/l 100 g/l	31.08.2020.	131
Mirador Xtra	F	ADAMA Registrations B.V.	0219	2	azoksistrobīns ciprokonazols	200 g/l 80 g/l	31.12.2022.	132
Mirage	F	ADAMA Registrations B.V.	0130	2	prohlorazs	450 g/l	31.12.2022.	133
Mistral 700 WG	H	ADAMA Registrations B.V.	0259	2	metribuzīns	700 g/kg	31.07.2021.	228
Mixin	H	ADAMA Registrations B.V.	0658	2	florasulams fluoksipīrs	2.5 g/l 100 g/l	31.12.2022.	199
Moddus 250 EC	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0183	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2021.	54
Moddus Start	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0498	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2021.	54
Monitor	H	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0145	2	sulfosulfurons	75 %	31.12.2031.	229
Monosate G	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0527	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	187
Moxa	AR	Globachem n.v.	0562	2	etil-trineksapaks	250 g/l	31.07.2022.	55
Mustangs s.e.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0184	2	florasulams 2.4-D	6.25 g/l 300 g/l	30.06.2020.	229
Mustangs Forte s.e.	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0334	2	florasulams aminopiralīds 2.4-D	5 g/l 10 g/l 180 g/l	31.12.2020.	229
Mystic	F	Nufarm GmbH & Co KG	0362	2	tebukonazols	250 g/l	22.12.2020.	135
Mystic 250 EW	F	Nufarm GmbH & Co KG	0696	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2021.	56, 136
Nando 500 SC	F	Nufarm GmbH & Co KG	0427	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2021.	137
NeemAzaal-T/S	I/A	Trifolio-M GmbH	0241	2/3	azadiraktīns-A	10 g/l	31.05.2022.	274, 275
Nexa 500 EC	AR	Innvigo Sp. z o.o.	0667	2	etil-trineksapaks	500 g/l	30.04.2020.	56
Next	AR	Sharda Cropchem España S.L.	0624	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2021.	56
Nicogan	H	ADAMA Registrations B.V.	0413	2	nikosulfurons	40 g/l	31.12.2021.	230
Nimbus SE	H	SIA BASF	0328	2	metazahlors klomazons	250 g/l 33.3 g/l	31.10.2020.	230
Nimbus Gold	H	SIA BASF	0523	2	metazahlors dimetēnamīds-P klomazons	200 g/l 200 g/l 40 g/l	31.08.2020.	230
Nozomi p.s.	H	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0323	2	flumioksazīns	500 g/kg	30.06.2020.	230
Nuance 75 WG	H	Nufarm GmbH & Co KG	0403	2	metil-tribenurons	750 g/kg	31.10.2020.	230
Nufarm MCPA 750 š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0045	2	MCPA	750 g/l	31.10.2021.	231
Ohayo 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0473	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2021.	75
Onyx	H	Belchim Crop Protection N.V.	0657	2	piridāts	600 g/l	31.12.2031.	232
Opera N	F	SIA BASF	0281	2	piraklostrobīns epoksikonazols	85.0 g/l 62.5 g/l	31.01.2021.	138

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Optika Trio š.k.	H	Nufarm GmbH & Co KG	0248	2	mekoprops-P MCPA	130 g/l 160 g/l	31.10.2021.	232
Optimus	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0399	2	dihloroprops-P etil-trineksapaks	310 g/l 175 g/l	30.04.2020.	58
Opus	F	SIA BASF	0190	2	epoksikonazols	125 g/l	30.04.2021.	139
Opus EC	F	SIA BASF	0367	2	epoksikonazols	83 g/l	28.03.2021.	140
Orius 250 EW	F	Nufarm GmbH & Co KG	0267	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2020.	141
Orvego	F	SIA BASF	0368	2	ametoktradīns dimetomorfs	300 g/l 225 g/l	31.07.2021.	142
Osiris	F	SIA BASF	0351	2	epoksikonazols metkonazols	37.5 g/l 27.5 g/l	27.06.2020.	143
Osiris Star	F	SIA BASF	0456	2	epoksikonazols metkonazols	56.25 g/l 41.25 g/l	30.04.2021.	143
Ouragan System 4	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0209	2/3	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	233
Pantera 4 EC	H	Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.	0171	2	tefuril- kvizalofops-P	40 g/l	30.11.2022.	233
Penncozeb 75 DG	F	UPL Europe Ltd	0273	2/3	mankocebs	75 %	31.01.2021.	144
Penncozeb 80 WP	F	UPL Europe Ltd	0180	2/3	mankocebs	80 %	31.01.2021.	145
PHOSTOXIN TABLET	I/A	Detia Degesch GmbH	0112	1	alumīnija fosfīds	56 %	31.08.2023.	277
Pico 750 WG	H	SIA BASF	0671	2	pikolinafēns	750 g/kg	30.06.2032.	233
Pictor Active	F	SIA BASF	0642	2	boskalīds piraklostrobīns	150 g/l 250 g/l	31.07.2020.	145
Pixxaro EC	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0545	2	metil- halauksifēns fluoksipīrs	12.5 g/l 280 g/l	31.12.2022.	234
Plantskydd	R	Plantskydd AB	0274	3	žāvētu asiņu milti	> 99 %	31.08.2021.	291
Plexeo 90	F/AR	Globachem n.v.	0677	2	metkonazols	90 g/l	30.04.2021.	51;120
Polytanol	Ro	Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG	0363	2	kalcija fosfīds	18 %	31.08.2023.	293
Prepper	K	Globachem n.v.	0697	2	fludioksonils	25 g/l	31.10.2021.	65
Previcur Energy	F	Bayer AG	0224	2/3	propamokarbs fosetils	530 g/l 310 g/l	31.07.2021.	146
Priaxor	F	SIA BASF	0514	2	fluksapiroksāds piraklostrobīns	75 g/l 150 g/l	31.01.2022.	149
Primus	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0172	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	234
Primus 250 WG	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0590	2	florasulams	250 g/kg	31.12.2031.	235
Primus XL	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0387	2	florasulams fluoksipīrs	5 g/l 100 g/l	31.12.2022.	236
Pro	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0585	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	234
Profi MCPA 750 SL	H	CIECH Sarzyna S.A.	0531	2	MCPA	750 g/l	31.10.2020.	198
Prolectus	F	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	0458	2	fenpirazamīns	500 g/kg	31.12.2022.	150
Proline	F	Bayer AG	0637	2	protiokonazols	250 g/l	31.07.2020.	151
Proman	H	Belchim Crop Protection N.V.	0656	2	metbromurons	500 g/l	31.12.2025.	236
Property 180 SC	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0567	2	piriofenons	180 g/l	31.01.2025.	152
Propulse	F	Bayer AG	0416	2	fluopīrams protiokonazols	125 g/l 125 g/l	31.07.2021.	153
Prosaro	F	Bayer AG	0276	2	tebukonazols protiokonazols	125 g/l 125 g/l	31.08.2020.	154
Proteus OD	I	Bayer AG	0275	2	tiakloprīds deltametrīns	100 g/l 10 g/l	31.10.2020.	278
Puma Universal	H	Bayer AG	0131	2	etil- fenoksaprops-P	69 g/l	31.12.2020.	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quelex	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0641	2	metil- halauksifēns florasulams	104.2 g/kg 100 g/kg	05.08.2026.	237
Quick 50 EC	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0429	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	30.11.2022.	237
Quickphos pellets 56 GE	I	UPL Europe Ltd	0504	1	alumīnijas fosfīds	56 %	27.02.2024.	279
Quickphos tablets 56 GE	I	UPL Europe Ltd	0505	1	alumīnijas fosfīds	56 %	27.02.2024.	280
Rancona 15 ME	K	Arysta Lifescience Great Britain Ltd	0698	2	ipkonazols	15.1 g/l	31.08.2025.	66
Ranman Top	F	ISK Biosciences Europe S.A.	0355	2	ciazofamīds	160 g/l	01.08.2020.	156
Rapsan 400 SC	H	Globachem n.v.	0617	2	metazohlors	400 g/l	31.07.2022.	194
Rapsan 500 SC	H	Globachem n.v.	0546	2	metazahlors	500 g/l	31.07.2020.	238
Rapsan Plus	H	Globachem n.v.	0636	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	31.07.2022.	238
Rapsan Plus SC	H	Globachem n.v.	0618	2	metazohlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	31.07.2022.	195
Redigo Pro	K	Bayer AG	0553	2	protiokonazols tebukonazols	150 g/l 20 g/l	31.08.2021.	66
Regalis Plus	AR	SIA BASF	0491	2	kalcija proheksadions	100 g/kg	31.12.2022.	57
Regucil	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0595	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2021.	54
Revus 250 SC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0312	2	mandipropamīds	250 g/l	31.07.2024.	156, 157
Revus Top	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0453	2	mandipropamīds difenokonazols	250 g/l 250 g/l	31.12.2021.	157
Revystar XL	F	SIA BASF	0707	2	mefentriflukonazols fluksapiroksāds	100 g/l 50 g/l	31.12.2023.	158
Revytrex	F	SIA BASF	0708	2	mefentriflukonazols fluksapiroksāds	66.7 g/l 66.7 g/l	31.12.2023.	159
Ridomil Gold MZ 68 WG	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0185	2	mankocebs metalaksils-M	64 % 4 %	30.06.2021.	160
Riza 200 EC	F	Cheminova A/S	0507	2	tebukonazols	200 g/l	31.08.2020.	160
Riza 250 EW	F	Cheminova A/S	0352	2	tebukonazols	250 g/l	20.05.2020.	162
Rosate 360 TF	H	Albaugh TKI d.o.o.	0639	2	glifosāts	360 g/	31.12.2020.	187
Roundup 60	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0583	3	glifosāts	60 g/l	31.12.2020.	238
Roundup B	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0516	3	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	238
Roundup Flex	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0462	2	glifosāts	480 g/l	31.12.2020.	239
Roundup Flick	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0515	2	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	240
Roundup G	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0517	3	glifosāts	120 g/l	31.12.2020.	241
Roundup Gel	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0501	3	glifosāts	7.2 g/l	31.12.2020.	242
Roundup Gel Max	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0625	3	glifosāts	72 g/l	31.12.2020.	242
Roundup PowerMax	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0519	2	glifosāts	720 g/kg	31.12.2020.	242
Roundup Quick	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0370	3	glifosāts	7.2 g/l	26.12.2021.	243
Roundup Ultra	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0173	2/3	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	244
Roxy 800 EC	H	Globachem n.v.	0518	2	prosulfokarbs	800 g/l	31.10.2020.	245
RUBRIC	F	Cheminova A/S	0430	2	epoksikonazols	125 g/l	30.04.2021.	164
Samson 4 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0437	2	nikosulfurons	40 g/l	31.12.2020.	227

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Samson Max 6 OD	H	ISK Biosciences Europe N.V.	0434	2	nikosulfurons	60 g/l	31.12.2020.	228
Saracen	H	Nufarm GmbH & Co KG	0471	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	245
Saracen Delta	H	Nufarm GmbH & Co KG	0493	2	florasulams diflufenikans	50 g/l 500 g/l	31.12.2021.	246
Satel 100 EW	I	FMC Chemical, sprl	0613	2	zeta-cipermetrīns	100 g/l	30.11.2022.	267
Scab 80 WG	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0582	2	kaptāns	800 g/kg	31.07.2021.	165
Scenic Gold	K	Bayer AG	0705	2	fluoksastrobīns fluopikolīds	150 g/l 200 g/l	31.07.2021.	67
Score 250 EC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0001	2/3	difenokonazols	250 g/l	31.12.2020.	165, 167
Seedron	K	ADAMA Registrations B.V.	0534	2	fludioksonils tebukonazols	50 g/l 10 g/l	31.10.2021.	67
Sekator OD	H	Bayer AG	0260	2	amidosulfurons nātrija metil- jodosulfurons	100 g/l 25 g/l	31.12.2020.	246
Signum	F	SIA BASF	0269	2	boskalīds piraklostrobīns	26.7 % 6.7 %	31.01.2022.	167
Siltra Xpro	F	Bayer AG	0479	2	biksafēns protiokonazols	60 g/l 200 g/l	31.07.2020.	169
SLUXX ^{HP}	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0396	2	dzelzs (III) fosfāts	29.7 g/kg	31.12.2031.	290
Spitfire 333 HL	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0606	2	fluoksipīrs	333 g/l	31.12.2022.	246
Stabilāns 750 š.k.	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0287	2	hlormekvāta hlorīds	750 g/l	31.11.2022.	49
Starane 333 HL	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0605	2	fluoksipīrs	333 g/l	31.12.2022.	246
Starane XL	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0277	2	fluoksipīrs florasulams	100 g/l 2.5 g/l	31.12.2022.	247
Starship	H	Nufarm GmbH & Co KG	0520	2	mezotrions	100 g/l	31.05.2033.	247
Stomp CS	H	SIA BASF	0431	2	pendimetalīns	455 g/l	31.07.2020.	248
Sultan Super	H	ADAMA Registrations B.V.	0457	2	metazahlors kvinmeraks	375 g/l 125 g/l	31.07.2022.	249
Sultan 500 SC	H	ADAMA Registrations B.V.	0245	2	metazahlors	500 g/l	31.07.2022.	248
Supero	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0587	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	30.11.2022.	237
SuPrim	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0528	2	florasulams	50 g/l	31.12.2031.	234
Switch 62.5 WG	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0244	2	fludioksonils ciprodinils	250 g/kg 375 g/kg	31.10.2021.	171
Swing Gold	F	SIA BASF	0356	2	dimoksistrobīns epoksikonazols	133 g/l 50 g/l	21.07.2020.	170
Syllit 544 SC	F	Arysta LifeScience Benelux Sprl	0477	2	dodīns	544 g/l	31.05.2021.	172
Syrius	F	Nufarm GmbH & Co KG	0522	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2020.	141
Širlans 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0177	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2021.	75
Taifun B	H	ADAMA Registrations B.V.	0027	2/3	glifosāts	360 g/l	31.12.2020.	249
Talius	F	DuPont Danmark ApS	0535	2	prokvinazīds	200 g/l	31.07.2021.	173
Tanaris	H	SIA BASF	0579	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	31.08.2020.	250
Tango Flex	F	SIA BASF	0359	2	metrafenons epoksikonazols	100 g/l 83 g/l	01.11.2020.	173
Targa Super	H	Bayer AG	0383	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	30.11.2022.	250
TBM 75 WG	H	Sharda Europe b.v.b.a.	0581	2	metil-tribenurons	750 g/kg	31.10.2020.	251
Tebuplius	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0539	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2021.	174
Tebusha 25 EW	F	Sharda Europe b.v.b.a.	0432	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2021.	174
Temsa SC	H	Globachem n.v.	0563	2	mezotrions	100 g/l	31.05.2033.	251
Tempo	AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0596	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.04.2021.	54
Teppeki	I	ISK Biosciences Europe N.V.	0699	2	flonikamīds	500 g/kg	31.08.2024.	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teridox 500 EC	H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0051	2	dimetahlors	500 g/l	31.12.2022.	252
Terpal	AR	SIA BASF	0144	2	mepikvāta hlorīds etefons	305 g/l 155 g/l	31.07.2020.	57
Tilmor	F/AR	Bayer AG	0353	2	protiokonazols tebukonazols	80 g/l 160 g/l	31.08.2021.	57, 175
Titus 25 d.g.	H	DuPont Danmark ApS	0059	2	rimsulfurons	250 g/kg	30.04.2021.	252
Tomahawk 200 EC	H	ADAMA Registrations B.V.	0536	2	fluoksipirs	200 g/l	31.12.2022.	252
Tombo WG	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0335	2	piroksulams florasulams aminopiralīds	50 g/kg 25 g/kg 50 g/kg	31.12.2025.	253
Tooler	H	SIA BASF	0284	2	tritosulfurons	714 g/kg	30.11.2020.	253
Topas 100 EC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0009	2	penkonazols	100 g/l	31.12.2022.	176
Toprex 375 SC	F/AR	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0400	2	difenokonazols paklobutrazols	250 g/l 125 g/l	31.12.2020.	57, 177
Torero	F	Cheminova A/S	0600	2	azoksistrobīns	250 g/l	31.12.2022.	83
Trico	R	Kwizda Agro GmbH	0435	3	aitu tauki	65 g/l	31.08.2021.	292
Tridex DG	F	UPL Europe Ltd.	0547	2	mankocebs	75 %	31.01.2021.	144
Trimanoc DG	F	UPL Europe Ltd	0669	2	mankocebs	75 %	31.01.2021.	144
Trimaxx	AR	Nufarm GmbH & Co KG	0398	2	etil-trineksapaks	175 g/l	30.04.2020.	58
Trimmer 500 WG	H	ADAMA Registrations B.V.	0469	2	metil-tribenurons	500 g/kg	31.10.2020.	253
Trimmer 50 SG	H	Cheminova A/S	0321	2	metil-tribenurons	500 g/kg	31.10.2020.	216
Tripali	H	Cheminova A/S	0551	2	metil- metsulfurons metil-tribenurons florasulams	83 g/kg 83 g/kg 105 g/kg	31.10.2020.	254
Tristar 50 SG	H	Innvigo Sp. z o.o.	0652	2	metil-tribenurons	500 g/kg	31.10.2020.	254
Turret 90	F/AR	Globachem n.v.	0678	2	metkonazols biksafēns	90 g/l 40 g/l	30.04.2021.	51, 120
Variano Xpro	F	Bayer AG	0455	2	fluoksastrobīns protiokonazols	50 g/l 100 g/l	31.07.2020.	178
Vertimec 018 EC	A/I	Syngenta Crop Protection AG	0296	2	abamektīns	18 g/l	30.04.2021.	282
Vibrance Duo	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0570	2	sedaksāns fludioksonils	25 g/l 25 g/l	31.10.2021.	68
Vibrance Star	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0679	2	sedaksāns fludioksonils tritikonazols	25 g/l 25 g/l 20 g/l	31.04.2020.	69
Vibrance Trio	K	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0635	2	sedaksāns fludioksonils tebukonazols	25 g/l 25 g/l 10 g/l	31.08.2020.	70
Viverda	F	SIA BASF	0384	2	boskalīds piraklostrobīns epoksikonazols	140 g/l 60 g/l 50 g/l	21.11.2021.	179
Vredmix	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0711	2	azoksistrobīns difenikonazols	125 g/l 125 g/l	31.12.2021.	80
WAM extra	R	Witasek PflanzenSchutz GmbH	0482	2/3	kvarca smiltis	300 g/kg	31.08.2024.	292
Winby 500 s.k.	F	ISK Biosciences Europe N.V.	0474	2	fluazinams	500 g/l	28.02.2021.	75
Wöbra	R	Flügel GmbH	0575	3	kvarca smiltis	480 g/kg	01.04.2026.	292
Zakeo Xtra	F	ADAMA Registrations B.V.	0654	2	azoksistrobīns ciprokonazols	200 g/l 80 g/l	31.12.2022.	132
Zetrola	H	ADAMA Registrations B.V.	0578	2	propakvizafops	100 g/l	30.11.2022.	182
Zorvec Enicade	F	DuPont Danmark ApS	0673	2	oksatiapirolīns	100 g/l	03.03.2028.	180
Zypar	H	Dow AgroSciences Danmark A/S	0555	2	metil- halauksifēns florasulams	6.254 g/l 5 g/l	05.08.2026.	255

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE TREŠĀS REĢISTRĀCIJAS KLASES
ĶĪMISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Darbīgā viela	Reģ. Nr./ Atļaujas Nr.	Maksimālais iepakoējums l, kg	Lpp.
1	2	3	4	5	6
Betanal	H	fenmedifams	0291	1.0 l	192
Cervacol extra	R	kvarca smiltis	0337	5.0 kg	291
Detia Wühlmausgas	R	kalcijs karbīds	0584	0.25 kg	291
Emin dārzam Mavrik Vita	I	tau-fluvalināts	31*	0.005 l	273
Emin dārzam Revus 250 SC	F	mandipropamīds	26*	0.05 l	157
Emin dārzam Score 250 EC	F	difenokonazols	33*	0.005 l	166
Emin dārzam Taifun B	H	glifosāts	30*	0.95 l	249
Ferramol	Lim	dzelzs (III) fosfāts	0395	2.0 kg	283
Gusto	Lim	metaldehīds	0489	1.0 kg	284
Infinito	F	propamokarbs fluopikolīds	0302	0.5 l	115, 116
Lima Oro	Lim	metaldehīds	0568	1.0 kg	289
Mavrik	I	tau-fluvalināts	0526	0.075 l	273
NeemAzal-T/S	I/A	azadiraktīns-A	0241	1.0 l	275
Ouragan System 4	H	glifosāts	0209	1.0 l	233
Penncozeb 75 DG	F	mankocebs	0273	1.0 kg	144
Penncozeb 80 WP	F	mankocebs	0180	1.0 kg	145
Plantskydd	R	žāvētu asiņu milti	0274	1.0 kg	291
Previcur Energy	F	propamokarbs fosetils	0224	1.0 l	146
Revus 250 SC	F	mandipropamīds	0312	0.25 l	157
Roundup 60	H	glifosāts	0583	1.0 l	238
Roundup B	H	glifosāts	0516	1.0 l	238
Roundup G	H	glifosāts	0517	1.0 l	241
Roundup Gel	H	glifosāts	0501	0.15 l	242
Roundup Gel Max	H	glifosāts	0625	0.1 l	242
Roundup Quick	H	glifosāts	0370	1.0 l	243
Roundup Ultra	H	glifosāts	0173	1.0 l	244
Score 250 EC	F	difenokonazols	0001	0.1 l	166
Taifun B	H	glifosāts	0027	1.0 l	249
Trico	R	aitu tauki	0435	10.0 l	292
WAM extra	R	kvarca smiltis	0482	2.5 kg	292
Wöbra	R	kvarca smiltis	0575	10.0 kg	292

* AAL, kuram izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
UN PARALĒLO TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU DARBĪGĀS VIELAS**

Darbīgā viela	Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4
2,4-D	2,4-D Nufarm	600 g/l	181
	DMA 600	600 g/l	201
	Elegant 2FD	300 g/l	202
	Estets 600 e.k.	600 g/l	203
	Kyleo	160 g/l	219
	Mustangs Forte s.e.	180 g/l	229
2,4-D (etil-heksil estera formā)	Hussar Activ Plus OD	300 g/l	217
	Mustangs s.e.	300 g/l	229
abamektīns	Vertimec 018 EC	18 g/l	282
aitu tauki	Trico	65 g/l	292
aklonifēns	Fenix	600 g/l	203
	Mateno Duo	500 g/l	225
alfa-cipermetrīns	Fastac 50	50 g/l	264
	Kestac 50	50 g/l	264
alumīnija fosfīds	PHOSTOXIN TABLET	56 %	277
	Quickphos pellets 56 GE	56 %	279
	Quickphos tablets 56 GE	56 %	280
ametoktradīns	Orvego	300 g/l	142
amidosulfurons	Grodyl	75 %	216
	Sekator OD	100 g/l	246
aminopiralīds	Lancelot	300 g/kg	220
	Metazamix™	5.3 g/l	226
	Mustangs Forte s.e.	10 g/l	229
	Tombo WG	50 g/kg	253
amisulbroms	Leimay SC	200 g/l	123
azadiraktīns-A	NeemAzal-T/S	10 g/l	274, 275
azoksistrobīns	Afrodyta 250 SC	250 g/l	74
	Amistar 250 SC	250 g/l	76
	Amistar Gold	125 g/l	80
	Azaka	250 g/l	83
	Bolid 250 SE	250 g/l	87
	Comrade	200 g/l	94
	Globazar 250 SC	250 g/l	113
	Mirador 250 SC	250 g/l	76
	Mirador Forte	60 g/l	131
	Mirador Xtra	200 g/l	132
	Torero	250 g/l	83
	Vredmix	125 g/l	80
	Zakeo Xtra	200 g/l	132
	Zoxy 250	250 g/l	83
Bacillus subtilis, celms QST 713	Serenade Aso	13.96 g/l	299
bentazons	Basagran 480	480 g/l	190
beta-ciflutrīns	Baythroid	25 g/l	257
	Bulldock 025 EC	25 g/l	257
benzokābe	Menno Florades	90 g/l	59
benzovindiflupīrs	Elatus Era	75 g/l	105
	Elatus Plus	100 g/l	106
bifenokss	Fox 480 SC	480 g/l	209
biksafēns	Ascra Xpro	65 g/l	82
	Siltra Xpro	60 g/l	169
	Variano Xpro	40 g/l	178

1	2	3	4
boskalīds	Bell	233 g/l	84
	Bell Super	140 g/l	86
	Cantus	500 g/kg	89
	Cantus Gold	200 g/l	89
	Eflor	133 g/l	105
	Pictor Active	150 g/l	145
	Signum	26.7 %	167
	Viverda	140 g/l	179
butil-fluazifops-P	Frequent	125 g/l	210
	Fusilade Forte 150 EC	150 g/l	211
ciazofamīds	Ranman Top	160 g/l	156
ciflufenamīds	Cidely Top	15 g/l	93
cikloksidīms	Focus Ultra	100 g/l	205
cipermetrīns	Ciperkils 500 e.k.	500 g/l	258
	Syper	500 g/l	258
	Wizard 500 EC	500 g/l	258
ciprodinīls	Chorus 50 WG	500 g/kg	92
	Switch 62.5 WG	375 g/kg	171
ciprokonazols	Comrade	80 g/l	94
	Maxim Star 025 FS	6.25 g/l	65
	Mirador Xtra	80 g/l	132
	Zakeo Xtra	80 g/l	132
deltametrīns	Decis Forte	100 g/l	259
	Decis Mega	50 g/l	261
	Delmetros 100 SC	100 g/l	262
	Granprotec	25 g/l	267
	K-Obiol	25 g/l	270
	Proteus OD	10 g/l	278
difenokonazols	Amistar Gold	125 g/l	80
	Celest Trio 060 FS	25 g/l	62
	Cidely Top	125 g/l	93
	Difcor 250 EC	250 g/l	98
	Difend	30 g/l	62
	Difenzone	250 g/l	100
	Emin dārzam Score 250 EC	250 g/l	166
	Mavita 250 EC	250 g/l	165
	Maxim Extra 050 FS	25 g/l	64
	Revus Top	250 g/l	157
	Score 250 EC	250 g/l	165, 167
	Toprex 375 SC	250 g/l	57, 177
	Vredmix	125 g/l	80
diflufenikāns	Diflanil 500 SC	500 g/l	201
	Komplet	280 g/l	219
	Legacy 500 SC	500 g/l	221
	Legacy Pro	40 g/l	221
	Mateno Duo	100 g/l	225
	Saracen Delta	500 g/l	246
dihlorprops-P	Duplozāns Super š.k.	310 g/l	202
	Optika Trio š.k.	310 g/l	232
dikamba	Arrat	500 g/kg	185
	Banvel 4S	480 g/l	186
	Dicash	480 g/l	201
	Dicoherb Super 750 SL	90 g/l	201
dimetahlors	Brasan 540 EC	500 g/l	193
	Teridox 500 EC	500 g/l	252
dimetēnamīds-P	Butisan Avant	100 g/l	195
	Butisan Kombi	200 g/l	195
	Butisan Pro	333 g/l	250
	Nimbus Gold	200 g/l	230
	Tanaris	333 g/l	250

1	2	3	4
dimetomorfs	Acrobat Plus	90 g/kg	71
	Banjo Forte	200 g/l	84
	Cabrio Duo	72 g/l	87
	Orvego	225 g/l	142
dimoksistrobīns	Cantus Gold	200 g/l	89
	Swing Gold	133 g/l	170
ditianons	Delan Pro	125 g/l	96
	Effector	700 g/kg	103
dodins	Syllit 544 SC	544 g/l	172
dzelzs (III) fosfāts	Ferramol	9.9 g/kg	283
	Ironmax Pro	24.2 g/kg	285
	SLUXX ^{HP}	29.7 g/kg	290
epoksikonazols	Adexar XE	62.5 g/l	71
	Bell	67 g/l	84
	Bell Super	50 g/l	86
	Cerix	41.6 g/l	90
	Duett Ultra	187 g/l	102
	Epox Extra	50 g/l	108
	Epox Top	40 g/l	109
	Gemino	45 g/l	112
	Maracas	50 g/l	127
	Maredo 125 SC	125 g/l	128
	Opera N	62.5 g/l	138
	Opus EC	83 g/l	140
	Opus	125 g/l	139
	Osiris	37.5 g/l	143
	Osiris Star	56.25 g/l	143
	RUBRIC	125 g/l	164
	Swing Gold	50 g/l	170
	Tango Flex	83 g/l	173
	Viverda	50 g/l	179
etefons	Cerone	480 g/l	49
	Grassrooter	480 g/l	50
	Terpal	155 g/l	57
etilēns	Banarg	4 %	48
etil-fenoksaprops-P	Foxtrot 69 EW	69 g/l	210
	Herbos 110 EC	110 g/l	217
	Puma Universal	69 g/l	236
etil-kvizalofops-P	Graminis	50 g/l	237
	Leopard	50 g/l	223
	Quick 50 EC	50 g/l	237
	Supero	50 g/l	237
	Targa Super	50 g/l	250
etil-trineksapaks	Bertego	250 g/l	54
	Calma	175 g/l	58
	Countdown NT	250 g/l	49
	Cuadro NT	250 g/l	49
	Medax Max	75 g/kg	51
	Moddus 250 EC	250 g/l	54
	Moddus Start	250 g/l	54
	Moxa	250 g/l	55
	Nexa 500 EC	500 g/l	56
	Next	250 g/l	56
	Optimus	175 g/l	58
	Regucil	250 g/l	54
	Tempo	250 g/l	54
	Trimaxx	175 g/l	58
fenmedifams	Betanal	160 g/l	192
fenpirazamīns	Prolectus	500 g/kg	150
fenpropidīns	Epox Top	100 g/l	109
	Kantik	150 g/l	122
	Leander	750 g/l	123

1	2	3	4
flonikamīds	Teppeki	500 g/kg	281
florasulams	Biathlon 4D	54 g/kg	192
	Broadway Star	14.2 g/kg	194
	Cleave	2.5 g/l	199
	Elegant 2FD	6.25 g/l	202
	Lancelot	150 g/kg	220
	Mixin	2.5 g/l	199
	Mollo	50 g/l	245
	Mustangs s.e.	6.25 g/l	229
	Mustangs Forte s.e.	5 g/l	229
	Primus	50 g/l	234
	Primus 250 WG	250 g/kg	235
	Primus XL	5 g/l	236
	Pro	50 g/l	234
	Quelex	100 g/kg	237
	Saracen	50 g/l	245
	Saracen Delta	50 g/l	246
	Starane XL	2.5 g/l	247
	SuPrim	50 g/l	234
	Tombo WG	25 g/kg	253
	Tripali	105 g/kg	254
	Zypar	5 g/l	255
fluazinams	Altima 500 s.k.	500 g/l	75
	Banjo Forte	200 g/l	84
	Frowncide 500 s.k.	500 g/l	75
	Nando 500 SC	500 g/l	137
	Ohayo 500 s.k.	500 g/l	75
	Širlans 500 s.k.	500 g/l	75
	Winby 500 s.k.	500 g/l	75
fludioksonils	Bariton Super	37.5 g/l	61
	Celest Trio 060 FS	25 g/l	62
	Maxim 025 FS	25 g/l	64
	Maxim Extra 050 FS	25 g/l	64
	Maxim Star 025 FS	18.75 g/l	65
	Prepper	25 g/l	65
	Seedron	50 g/l	67
	Switch 62.5 WG	250 g/kg	171
	Vibrance Duo	25 g/l	68
	Vibrance Pro	25 g/l	68
	Vibrance Star	25 g/l	69
	Vibrance Trio	25 g/l	70
flufenacets	Komplet	280 g/l	219
fluksapiroksāds	Adexar XE	62.5 g/l	71
	Cerix	41.6 g/l	90
	Imtrex XE	62.5 g/l	114
	Librax	62.5 g/l	124
	Priaxor	75 g/l	149
	Revystar XL	50 g/l	158
	Revytrex	66.7 g/l	159
flumioksažīns	Nozomi p.s.	500 g/kg	230
fluoksastrobīns	Scenic Gold	150 g/l	67
	Variano Xpro	50 g/l	178
fluopikolīds	Infinito	62.5 g/l	115, 116
	Scenic Gold	200 g/l	67
fluopirams	Ascra Xpro	65 g/l	82
	Propulse	125 g/l	153
flupiradifurons	Buteo Start	480 g/l	61

1	2	3	4
fluroksipirs	Ariane S	40 g/l	184
	Arrva	50 g/l	218
	Cleave	100 g/l	199
	Flurostar 180	180 g/l	205
	Frazer	200 g/l	217
	Galistop 200	200 g/l	217
	Hurler	200 g/l	217
	Kinvara	50 g/l	218
	Mixin	100 g/l	199
	Pixxaro EC	280 g/l	234
	Primus XL	100 g/l	236
	Spitfire 333 HL	333 g/l	246
	Starane 333 HL	333 g/l	246
	Starane XL	100 g/l	247
	Tomahawk 200 EC	200 g/l	252
folpets	Epox Extra	375 g/l	108
foramsulfurons	Maister Power OD	30 g/l	225
fosetils	Aliette	800 g/kg	74
	Previcur Energy	310 g/l	146
glifosāts	Barbarian Biograde 360 š.k.	360 g/l	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	490 g/l	189
	Barbarian Super 360	360 g/l	187
	Clinic Up	360 g/l	187
	Emin dārzam Taifun B	360 g/l	249
	Gallup Super 360	360 g/l	187
	Glifomaks Plus š.k.	360 g/l	213
	Glyphomax 480	480 g/l	214
	Kyleo	240 g/l	219
	Landmaster 360 TF	360 g/l	187
	Monosate G	360 g/l	187
	Ouragan System 4	360 g/l	233
	Rosate 360 TF	360 g/l	187
	Roundup 60	60 g/l	238
	Roundup B	360 g/l	238
	Roundup Flex	480 g/l	239
	Roundup Flick	360 g/l	240
	Roundup G	120 g/l	241
	Roundup Gel	7.2 g/l	242
	Roundup Gel Max	72 g/l	242
	Roundup PowerMax	720 g/kg	242
	Roundup Quick	7.2 g/l	243
	Roundup Ultra	360 g/l	244
	Taifun B	360 g/l	249
	Vagta	490 g/l	189
	Varvar	360 g/l	187
<i>Gliocladium catenulatum</i>	Prestop	320 g/kg	296
hlormekvāta hlorīds	CCC	750 g/l	49
	Cycocel 750	750 g/l	50
	Stabilāns 750 š.k.	750 g/l	49
hlortolurons	Legacy Pro	250 g/l	221
imazamokss	Clamox	17.5 g/l	198
	Cleravo	35 g/l	199
indoksakarbs	Avaunt	150 g/l	256
ipkonazols	Rancona 15 ME	15.1 g/l	66
kalcija fosfīds	Polytanol	18 %	293
kalcija karbīds	Detia Wühlmausgas	800 g/kg	291
kalcija proheksadions	Medax Max	50 g/kg	51
	Medax Top	50 g/l	53
	Regalis Plus	100 g/kg	57
kālija fosfonāts	Delan Pro	561 g/l	96
kaptāns	Merpan 80 WG	800 g/kg	130
	Scab 80 WG	800 g/kg	165

1	2	3	4
kletodims	Centurion Plus	120 g/l	197
klomazons	Brasan 540 EC	40 g/l	193
	Kalif 360 CS	360 g/l	218
	Kalif Mega	33 g/l	218
	Metric ZC	60 g/l	227
	Nimbus Gold	40 g/l	230
	Nimbus SE	33.3 g/l	230
	Regent	360 g/l	218
klopiralīds	Ariane S	20 g/l	184
	Arrva	28 g/l	218
	Barca 334 SL	267 g/l	190
	Clap Forte	720 g/kg	198
	Cliophar 600 SL	600 g/l	199
	Galera š.k.	267 g/l	213
	Kinvara	28 g/l	218
	Korvetto	120 g/l	219
	Lontrel 600 SL	600 g/l	223
	Lontrel 72 SG	720 g/kg	224
kvarca smiltis	Cervacol extra	251 g/kg	291
	WAM extra	300 g/kg	292
	Wöbra	480 g/kg	292
kvinmeraks	Butisan Avant	100 g/l	195
	Butisan Pro	167 g/l	250
	Butisan Star	83 g/l	195
	Cleravo	250 g/l	199
	Fuego Top	125 g/l	249
	Rapsan Plus	83 g/l	238
	Rapsan Plus SC	83 g/l	195
	Sultan Super	125 g/l	249
	Tanaris	167 g/l	250
lambda-cihalotrīns	Kaiso 50 EG	50 g/kg	268
	Karate Zeon 5 CS	50 g/l	268
magnija fosfīds	MAGTOXIN TABLET	66 %	270
mandipropamīds	Emin dārzam Revus 250 SC	250 g/l	157
	Revus 250 SC	250 g/l	156, 157
	Revus Top	250 g/l	157
mankocebs	Acrobat Plus	600 g/kg	71
	Avtar 75 NT	750 g/kg	100
	Dithane NT	750 g/kg	100
	Elektis 75 d.g.	667 g/kg	107
	Manfil 75 WG	75 %	126
	Manfil 80 WP	80 %	127
	Penncozeb 75 DG	75 %	144
	Penncozeb 80 WP	80 %	145
	Ridomil Gold MZ 68 WG	64 %	160
	Tridex DG	75 %	144
	Trimanoc DG	75 %	144
MCPA	Agroksons 75 š.k.	750 g/l	184
	Ariane S	200 g/l	184
	Arrva	233 g/l	218
	Chwastox 750 SL	750 g/l	198
	Dicoherb Super 750 SL	660 g/l	201
	Duplozāns Super š.k.	160 g/l	202
	Kinvara	233 g/l	218
	MCPA 750	750 g/l	225
	MCPA Classic 750 SL	750 g/l	198
	MCPA Super 500 š.k.	500 g/l	226
	Nufarm MCPA 750 š.k.	750 g/l	231
	Optika Trio š.k.	160 g/l	232
	Profi MCPA 750 SL	750 g/l	198
MCPB	Butoxone	400 g/l	195
mefentriflukonazols	Revystar XL	100 g/l	158
	Revytrex	66.7 g/l	159
mekoprops-P	Duplozāns Super š.k.	130 g/l	202
	Optika Trio š.k.	130 g/l	232

1	2	3	4
mepikvāta hlorīds	Caryx	210 g/l	48
	Medax Top	300 g/l	53
	Terpal	305 g/l	57
metalaksils-M	Ridomil Gold MZ 68 WG	4 %	160
metaldehīds	Gusto	30 g/kg	283, 284
	Lima Oro	50 g/kg	287, 289
	Limgol	50 g/kg	287
	Meridian	50 g/kg	287
metamitrons	Goltix 700 SC	700 g/l	216
metazahlors	Butisan 400	400 g/l	194
	Butisan Avant	300 g/l	195
	Butisan Kombi	200 g/l	195
	Butisan Star	333 g/l	195
	Clamox	375 g/l	198
	Fuego Top	375 g/l	249
	Kalif Mega	250 g/l	218
	Metazamix™	500 g/l	226
	Nimbus Gold	200 g/l	230
	Nimbus SE	250 g/l	230
	Rapsan 400 SC	400 g/l	194
	Rapsan 500 SC	500 g/l	238
	Rapsan Plus	333 g/l	238
	Rapsan Plus SC	333 g/l	195
	Sultan 500 SC	500 g/l	248
	Sultan Super	375 g/l	249
metil-halauksifēns	Belkar	10 g/l	191
	Korvetto	5 g/l	219
	Pixxaro EC	12.5 g/l	234
	Quelex	104.2 g/kg	237
	Zypar	6.254 g/l	255
metil-krezoksims	Candit	500 g/kg	88
metil-metsulfurons	Accurate 200 WG	200 g/kg	181
	CDQ SX	111 g/kg	196
	Ergon	68 g/kg	202
	Mezzo WG	200 g/kg	227
	Tripali	83 g/kg	254
metil-pirimifoss	Actellic 50 EC	50 %	256
metil-tiēnkarbazons	Hussar Activ Plus OD	7.5 g/l	217
	Maister Power OD	10 g/l	225
metil-tifensulfurons	Calibre 50 SX	333 g/kg	347
	Ergon	682 g/kg	202
metil-tiofanāts	Duett Ultra	310 g/l	102
metil-tribenurons	Buster	750 g/kg	251
	Calibre 50 SX	167 g/kg	196
	CDQ SX	222 g/kg	196
	Granstar Premia 50 SX	500 g/kg	216
	Nuance 75 WG	750 g/kg	230
	TBM 75 WG	750 g/l	251
	Trimmer 50 SG	500 g/kg	216
	Trimmer 500 WG	500 g/kg	253
	Tripali	83 g/kg	254
metkonazols	Tristar 50 SG	500 g/kg	254
	Artina EC	90 g/l	51, 120
	Caryx	30 g/l	48
	Efilor	60 g/l	105
	Juventus 90	90 g/l	51, 120
	Librax	45 g/l	124
	Osiris	27.5 g/l	143
	Osiris Star	41.25 g/l	143
	Plexeo 90	90 g/l	51, 120
	Turret 90	90 g/l	51, 120
metobromurons	Proman	500 g/l	236
metrafenons	Fleksiti s.k.	300 g/l	111
	Tango Flex	100 g/l	173

1	2	3	4
metribuzīns	Metric ZC	233 g/l	227
	Mistral 700 WG	700 g/kg	228
mezotrions	Callisto 100 SC	100 g/l	196
	Elumis 105 OD	75 g/l	202
	Starship	100 g/l	247
	Temsa SC	100 g/l	251
napropamīds	Devrinols s.k.	450 g/l	200
nātrija metil-jodosulfurons	Hussar Activ Plus OD	10 g/l	217
	Maister Power OD	1 g/l	225
	Sekator OD	25 g/l	246
nātrija propoksikarbazons	Attribut	700 g/kg	185
nikosulfurons	Elumis 105 OD	30 g/l	202
	Fornet 4 OD	40 g/l	227
	Fornet Max 6 OD	60 g/l	228
	Milagro 4 OD	40 g/l	227
	Milagro Extra 6 OD	60 g/l	228
	Nicogan	40 g/l	230
	Niklos 40 OD	40 g/l	227
	Samson 4 OD	40 g/l	227
	Samson Max 6 OD	60 g/l	228
oksatiapirolīns	Zorvec Enicade	100 g/l	180
paklobutrazols	Toprex 375 SC	125 g/l	57, 177
parafinēļa	Fibro	797 g/l	266
pendimetalīns	Flight Forte	320 g/l	204
	Legacy Pro	300 g/l	221
	Stomp CS	455 g/l	248
penkonazols	Topas 100 EC	100 g/l	176
Pepino mosaic vīrusa celma CH2 izolāts 1906	PMV-01	>5 x 10 ⁵ vīrusa daļiņas/μL	295
Phlebiopsis gigantea	Rotstop	2 x 10 ⁶ – 5 x 10 ⁷ k.v.v./g	298
	Rotstop SC	2 x 10 ⁶ – 2 x 10 ⁷ k.v.v./g	298
piklorams	Barca 334 SL	67 g/l	190
	Belkar	48 g/l	191
	Galera š.k.	67 g/l	213
	Metazamix™	13.3 g/l	226
pikolinafēns	Flight Forte	16 g/l	204
	Pico 750 WG	750 g/kg	233
pinoksadēns	Avoxa	33.3 g/l	185
	Axial 50 EC	50 g/l	186
piraklostrobīns	Cabrio Duo	40 g/l	87
	Cerix	66.6 g/l	90
	Comet Pro	200 g/l	94
	Opera N	85.0 g/l	138
	Pictor Active	250 g/l	145
	Priaxor	150 g/l	149
	Signum	6.7 %	167
	Viverda	60 g/l	179
piridāts	Lentagran WP	450 g/kg	221
	Onyx	600 g/l	232
piriofenons	Property 180 SC	180 g/l	152
piroksulams	Avoxa	8.33 g/l	185
	Broadway Star	70.8 g/kg	194
	Tombo WG	50 g/kg	253
prohlorazs	Ampera	267 g/l	81
	Kantik	200 g/l	122
	Kinto	55.1 g/l	63
	Maracas	225 g/l	127
	Mirage	450 g/l	133
prokvinazīds	Input Triple	40 g/l	118
	Talius	200 g/l	173
propakvizafops	Agil 100 EC	100 g/l	182
	Zetrola	100 g/l	182
propamokarbs	Infinito	523.8 g/l	115, 116
	Previcur Energy	530 g/l	146

1	2	3	4
prosulfokarbs	Boxer 800 EC	800 g/l	192
	Roxy 800 EC	800 g/l	245
protiokonazols	Ascra Xpro	130 g/l	82
	Bariton Super	50 g/l	61
	Curbatur	250 g/l	151
	Delaro	175 g/l	96
	Elatus Era	150 g/l	105
	Falcon Forte	53 g/l	110
	Input	160 g/l	117
	Input Triple	160 g/l	118
	Proline	250 g/l	151
	Propulse	125 g/l	153
	Prosaro	125 g/l	154
	Redigo Pro	150 g/l	66
	Siltra Xpro	200 g/l	169
	Tilmor	80 g/l	57, 175
	Variano Xpro	100 g/l	178
rimsulfurons	Titus 25 d.g.	250 g/kg	252
sedaksāns	Vibrance Duo	25 g/l	68
	Vibrance Pro	25 g/l	68
	Vibrance Star	25 g/l	69
	Vibrance Trio	25 g/l	70
siltiofams	Latitude XL	125 g/l	64
spirodiklofēns	Envidor	240 g/l	262
spiroksamīns	Falcon Forte	224 g/l	110
	Input	300 g/l	117
	Input Triple	200 g/l	118
Streptomyces strain K61	Mycostop	5 x 10 ⁸ k.v.v./g	294
sulfosulfurons	Monitor	75 %	229
tau-fluvalināts	Emin dārzam Mavrik Vita	240 g/l	273
	Evure	240 g/l	272
	Mavrik	240 g/l	272, 273
tebukonazols	Ampera	133 g/l	81
	Bariton Super	10 g/l	61
	Celest Trio 060 FS	10 g/l	62
	Cezix	250 g/l	95
	Chambel 6 FS	60 g/l	62
	DARCOS	250 g/l	95
	Dominic	250 g/l	174
	Erasmus	250 g/l	95
	Falcon Forte	148 g/l	110
	Folicur	250 g/l	50, 111
	Gemino	150 g/l	112
	Kantik	100 g/l	122
	Mirador Forte	100 g/l	131
	Mystic	250 g/l	135
	Mystic 250 EW	250 g/l	56, 136
	Orius 250 EW	250 g/l	141
	Prosaro	125 g/l	154
	Redigo Pro	20 g/l	66
	Riza 200 EC	200 g/l	160
	Riza 250 EW	250 g/l	162
	Seedron	10 g/l	67
	Syrius	250 g/l	141
	Tebuplius	250 g/l	174
	Tebusha 25 EW	250 g/l	174
	Tilmor	160 g/l	57, 175
	Vibrance Trio	10 g/l	70
tefuril-kvizalofops-P	Gepard 50 EC	50 g/l	237
	Pantera 4 EC	40 g/l	233
tiakloprids	Biscaya OD	240 g/l	256
	Proteus OD	100 g/l	278

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
<i>Trichoderma harzianum</i>	Trianium-P	10 g/kg	303
trifloksistrobīns	Delaro	150 g/l	96
tritikonazols	Kinto	20 g/l	63
	Vibrance Pro	20 g/l	68
	Vibrance Star	20 g/l	69
tritosulfurons	Arrat	250 g/kg	185
	Biathlon 4D	714 g/kg	192
	Tooler	714 g/kg	253
vara hidroksīds (kā varš)	Champion 50 WG	500 g/kg	91
zeta-cipermetrīns	Fury 100 EW	100 g/l	267
	Satel 100 EW	100 g/l	267
zoksamīds	Elektis 75 d.g.	83 g/kg	107
žāvētu asiņu milti	Plantskydd	990 g/kg	291

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE MIKROBIOLOĢISKIE
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Aktīvās sastāvdaļas nosaukums	Aktīvās sastāvdaļas saturs	Reģistrācijas beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mycostop	F	Danstar Ferment AG	0480	3	<i>Streptomyces</i> strain K61	5 x 10 ⁸ k.v.v./g	30.04.2020.	294
PMV-01	V	De Ceuster Meststoffen n.v.	0701	2	<i>Pepino mosaic</i> vīrusa celma CH2 izolāts 1906	> 5 x 10 ⁵ vīrusa daļiņas/μL	07.08.2031.	295
Prestop	F	Danstar Ferment AG	0681	3	<i>Gliocladium catenulatum</i> , celms J1446	320 g/kg	31.07.2020.	296
Rotstop	F	Danstar Ferment AG	0295	3	<i>Phlebiopsis gigantea</i>	2 x 10 ⁶ – 5 x 10 ⁷ k.v.v./g	30.04.2021.	298
Rotstop SC	F	Danstar Ferment AG	0401	3	<i>Phlebiopsis gigantea</i>	2 x 10 ⁶ – 2 x 10 ⁷ k.v.v./g	30.04.2021.	298
Serenade Aso	F	Bayer AG	0556	2	<i>Bacillus subtilis</i> , celms QST 713	13,96 g/l	30.04.2021.	299
Trianium-P	F	Koppert B.V.	0676	3	<i>Trichoderma harzianum</i> , celms T-22	10 g/kg	30.04.2021.	303

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE DZĪVOS ORGANISMUS SATUROŠIE
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI***

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Dzīvais organisms	Reģistrācijas beigu termiņš	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
ABS sistēma	Biobest Group N.V.	0447	3	<i>Amblyseius cucumeris</i>	03.04.2023.	305
Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Biobest Group N.V.	0463	3	<i>Adalia bipunctata</i>	13.04.2024.	305
Afidius sistēma	Biobest Group N.V.	0442	3	<i>Aphidius colemani</i>	03.04.2023.	305
Afidius	IK "Ciklaneda BS"	0064	3	<i>Aphidius colemani</i>	09.04.2026.	305
Afidoletes sistēma	Biobest Group N.V.	0448	3	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	03.04.2023.	306
Ambliseijus sistēma	Biobest Group N.V.	0464	3	<i>Amblyseius cucumeris</i>	13.04.2024.	306
Ambliseijus	IK "Ciklaneda BS"	0063	3	<i>Amblyseius cucumeris</i>	09.04.2026.	306

1	2	3	4	5	6	7
Aphidend	Koppert B.V.	0124	3	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	02.04.2028.	306
Aphipar	Koppert B.V.	0616	3	<i>Aphidius colemani</i>	01.05.2028.	307
Aphiscout	Koppert B.V.	0702	3	<i>Aphidius colemani</i> <i>Aphidius ervi</i> Haliday <i>Aphelinus abdominalis</i> <i>Praon volucre</i> <i>Ephedrus cerasicola</i>	17.10.2029.	307
CBS sistēma	Biobest Group N.V.	0610	3	<i>Neoseiulus californicus</i>	09.05.2028.	307
Cryptobug	Koppert B.V.	0683	3	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>	26.05.2029.	307
Cryprobug-L	Koppert B.V.	0684	3	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>	26.05.2029.	308
Daknusa sistēma	Biobest Group N.V.	0659	3	<i>Dacnusa sibirica</i>	06.12.2028.	308
Diglifus sistēma	Biobest Group N.V.	0443	3	<i>Diglyphus isaea</i>	03.04.2023.	308
Enermix	Koppert B.V.	0649	3	<i>Eretmocerus eremicus</i> , <i>Encarsia formosa</i>	30.09.2028.	308
Enkarsija	IK "Ciklaneda BS"	0061	3	<i>Encarsia formosa</i>	09.04.2026.	309
Enkarsijas sistēma	Biobest Group N.V.	0444	3	<i>Encarsia formosa</i>	03.04.2023.	309
En-strip	Koppert B.V.	0125	3	<i>Encarsia formosa</i>	02.04.2028.	309
Entomite-M	Koppert B.V.	0615	3	<i>Stratiolaelaps scimitus</i>	01.05.2028.	309
Entonem	Koppert B.V.	0619	3	<i>Steinernema feltiae</i>	16.05.2028.	310
Ercal	Koppert B.V.	0614	3	<i>Eretmocerus eremicus</i>	01.05.2028.	310
Eretmiks sistēma	Biobest Group N.V.	0465	3	<i>Encarsia formosa</i> , <i>Eretmocerus eremicus</i>	13.04.2024.	310
Eretmocerus sistēma	Biobest Group N.V.	0466	3	<i>Eretmocerus eremicus</i>	13.04.2024.	310
Ervipar	Koppert B.V.	0670	3	<i>Aphidius ervi</i> Haliday	11.02.2029.	311
Feltiella sistēma	Biobest Group N.V.	0529	3	<i>Feltiella acarisuga</i>	07.04.2026.	311
Fitoseiulus sistēma	Biobest Group N.V.	0449	3	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	03.04.2023.	311
Fitoseiulus T-sistēma	Biobest Belgium N.V.	0452	3	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	25.06.2023.	312
Fitosējuluss	IK "Ciklaneda BS"	0060	3	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	09.04.2026.	312
Hipoaspis sistēma	Biobest Group N.V.	0445	3	<i>Stratiolaelaps scimitus</i>	03.04.2023.	312
Kalifornikus sistēma	Biobest Group N.V.	0609	3	<i>Neoseiulus californicus</i>	09.05.2028.	312
Larvanem	Koppert B.V.	0692	3	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	08.09.2029.	313
Limonikus sistēma	Biobest Group N.V.	0693	3	<i>Amblydromalus limonicus</i>	08.09.2029.	313
Macro-Mite	Koppert B.V.	0645	3	<i>Macrocheles robustulus</i>	30.09.2028.	313
Makrolofus sistēma (Makrolofus-N sistēma)	Biobest Group N.V.	0446	3	<i>Macrolophus pygmaeus</i>	03.04.2023.	314
Miglyphus	Koppert B.V.	0648	3	<i>Diglyphus isaea</i>	30.09.2028.	314
Mirical	Koppert B.V.	0127	3	<i>Macrolophus pygmaeus</i>	02.04.2028.	314
Montdorensis sistēma	Biobest Group N.V.	0694	3	<i>Transeius montdorensis</i>	08.09.2029.	315
Nemaslug	SIA BASF	0687	3	<i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i>	10.07.2029.	315
Nemasys	SIA BASF	0688	3	<i>Steinernema feltiae</i>	10.07.2029.	315
Nemasys C	SIA BASF	0690	3	<i>Steinernema carpocapsae</i>	10.07.2029.	316
Nemasys H	SIA BASF	0686	3	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	10.07.2029.	317
Nemasys L	SIA BASF	0685	3	<i>Steinernema kraussei</i>	10.07.2029.	317
Nemasys No Ants	SIA BASF	0689	3	<i>Steinernema feltiae</i>	10.07.2029.	317
Orius sistēma	Biobest Group N.V.	0467	3	<i>Orius laevigatus</i>	24.04.2024.	318
Pangodiņš	IK "Ciklaneda BS"	0062	3	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>	09.04.2026.	318
Sferoforia sistēma	Biobest Group N.V.	0660	3	<i>Sphaerophoria rueppellii</i>	06.12.2028.	318
Spical	Koppert B.V.	0633	3	<i>Neoseiulus californicus</i>	12.07.2028.	318
Spical-Plus	Koppert B.V.	0634	3	<i>Neoseiulus californicus</i>	12.07.2028.	319
Spidend	Koppert B.V.	0647	3	<i>Feltiella acarisuga</i>	30.09.2028.	319
Spidex	Koppert B.V.	0128	3	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	02.04.2028.	319
Steinernema sistēma	Biobest Group N.V.	0661	3	<i>Steinernema feltiae</i>	06.12.2028.	320
Swirskii sistēma	Biobest Group N.V.	0441	3	<i>Amblyseius swirskii</i>	03.04.2023.	320
Swirskii-Mite	Koppert B.V.	0620	3	<i>Amblyseius swirskii</i>	16.05.2028.	320
Swirskii-Mite LD	Koppert B.V.	0621	3	<i>Amblyseius swirskii</i>	16.05.2028.	321
Swirskii-Mite Plus	Koppert B.V.	0622	3	<i>Amblyseius swirskii</i>	16.05.2028.	321
Thripex (Thripex-plus)	Koppert B.V.	0129	3	<i>Neoseiulus cucumeris</i>	02.04.2028.	321
Thripor-L	Koppert B.V.	0646	3	<i>Orius laevigatus</i>	30.09.2028.	322
Trihogramma	SIA "Bioefekts"	0143	3	<i>Trichogramma embryophagum</i>	16.12.2028.	322

* Visus dzīvos organismus saturošos augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU
AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURUS ATĻAUTS LIETOT
BIOLOĢISKAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums \ Aktīvās sastāvdaļas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	9
Cervacol extra	R	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG	0337	3	kvarca smiltis	251 g/kg	291
Champion 50 WG	F	Nufarm GmbH & Co KG	0139	2	vara hidroksīds (kā varš)	500 g/kg	91
Ferramol	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0395	3	dzelzs (III) fosfāts	9.9 g/kg	283
Fibro	I/A	Belchim Crop Protection NV	0460	2	parafinēļa	797 g/l	266
Ironmax Pro	Lim	De Sangosse S.A.S.	0630	2	dzelzs (III) fosfāts	24.2 g/kg	285
Mycostop	F	Danstar Ferment AG	0480	3	<i>Streptomyces</i> strain K61	5 x 10 ⁸ k.v.v./g	294
NeemAzal-T/S	I/A	Trifolio-M GmbH	0241	2/3	azadiraktīns-A	10 g/l	274, 275
PMV-01	B/V	De Ceuster Meststoffen n.v.	0701	2	<i>Pepino mosaic</i> vīrusa celma CH2 izolāts 1906	> 5 x 10 ⁵ vīrusa daļiņas/μL	295
Prestop	F/B	Danstar Ferment AG	0681	3	<i>Gliocladium catenulatum</i> , celms J1446	320 g/kg	296
Rotstop	F	Danstar Ferment AG	0295	3	<i>Phlebiopsis gigantea</i>	2 x 10 ⁶ – 5 x 10 ⁷ k.v.v./g	298
Rotstop SC	F	Danstar Ferment AG	0401	3	<i>Phlebiopsis gigantea</i>	2 x 10 ⁶ – 2 x 10 ⁷ k.v.v./g	298
Serenade Aso	F	Bayer AG	0556	2	<i>Bacillus subtilis</i> , celms QST 713	13.96 g/l	299
SLUXX ^{HP}	Lim	W.Neudorff GmbH KG	0396	2	dzelzs (III) fosfāts	29.7 g/kg	290
Trianium - P	F	Koppert B.V.	0676	3	<i>Trichoderma harzianum</i> , celms T-22	10 g/kg	303
Trico	R	Kwizda Agro GmbH	0435	3	aitu tauki	65 g/l	290
WAM extra	R	Witasek PflanzenSchutz GmbH	0482	2/3	kvarca smiltis	300 g/kg	292
Wöbra	R	Flügel GmbH	0575	3	kvarca smiltis	480 g/kg	292

IZSNIEGTĀS ATĻAUJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PARALĒLAJAI TIRDZNIECĪBAI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Atļaujas īpašnieks	Atļaujas Nr.	Reģistrācijas klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Atļauja derīga no	Atļaujas derīguma termiņš	Identiskais Latvijas Repub- likā reģistrētais augu aizsar- dzības līdzeklis		Lpp.
									Nosau- kums	Reģ. Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Attila 250 SC	F	ProEuro Sp. z o.o.	20.	2	azoksistrobīns	250 g/l	11.03.2014.	31.12.2022.	Amistar 250 SC	0187	76
Buster	H	ProEuro Sp. z o.o.	40.	2	metil- tribenurons	750 g/kg	19.02.2019.	31.10.2020.	TBM 75 WG	0581	251
Emin dārzam Mavrik Vita	I	SIA "Emin dārzam"	31.	3	tau-fluvalināts	240 g/l	09.01.2018.	31.05.2022.	Mavrik	0526	273
Emin dārzam Revus 250 SC	F	SIA "Emin dārzam"	26.	3	mandipropamīds	250g/l	05.09.2017.	31.07.2024.	Revus 250 SC	0312	157
Emin dārzam Score 250 EC	F	SIA "Emin dārzam"	33.	3	difenokonazols	250 g/l	07.02.2018.	31.12.2020.	Score 250 EC	0001	166
Emin dārzam Taifun B	H	SIA "Emin dārzam"	30.	3	glifosāts	360 g/l	09.01.2018.	31.12.2020.	Taifun B	0027	249
Frazer	H	ProEuro Sp. z o.o.	38.	2	fluroksipirs	200 g/l	08.10.2018.	31.12.2022.	Hurler	0601	217
Mollo	H	Synergy Generics Limited	34.	2	florasulams	50 g/l	12.06.2018.	31.12.2031.	Saracen	0471	245
Niklos 40 OD	H	ProEuro Sp. z o.o.	14.	2	nikosulfurons	40 g/l	03.05.2012.	31.12.2020.	Milagro 4 OD	0223	227
Regent	H	Top Crop Chem Ltd.	41.	2	klomazons	360 g/l	14.01.2020.	31.10.2020.	Kalif 360 CS	0409	218
Syper	I	Synergy Generics Limited	37.	2	cipermetrīns	500 g/l	20.12.2018.	31.10.2021.	Ciperkils 500 e.k.	0385	258
Vagta	H	Synergy Generics Limited	36.	2	glifosāts	490 g/l	20.12.2018.	31.12.2020.	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	0289	189
Varvar	H	Synergy Generics Limited	35.	2	glifosāts	360 g/l	20.12.2018.	31.12.2020.	Barbarian Super 360	0503	187
Wizard 500 EC	I	ProEuro Sp. z o.o.	17.	2	cipermetrīns	500 g/l	04.01.2013.	31.10.2021.	Ciperkils 500 e.k.	0385	258
Zoxy 250	F	Synergy Generics Limited	29.	2	azoksistrobīns	250 g/l	28.03.2018.	31.12.2022.	Azaka	0557	83

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS, KURIEM 2019. GADĀ MAINĪTS NOSAUKUMS

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Reģ. Nr.	Augu aizsardzības līdzekļa jaunais nosaukums
Falcon Plus	0651	Input Triple
Imbrex XE	0406	Imtrex XE
Lentagran 45 WP	0330	Lentagran WP

2018. UN 2019. GADĀ AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ ANULĒTIE IERAKSTI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģistrācijas īpašnieks	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Esošo krājumu izplatīšanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Actara 25 WG	I	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0167	2	tiametoksams	250 g/kg	30.10.2019.	30.10.2020.
Allegro Super	F	SIA BASF	0270	2	metil- krezoksims epoksikonazols fenpropimorfs	83 g/l 83 g/l 317 g/l	30.10.2019.	30.10.2020.
Amistar Opti 480 SC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0325	2	azoksistrobīns hlortalonils	80 g/l 400 g/l	01.05.2020.	20.05.2020.
Archer Turbo 575 EC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0407	2	propikonazols fenpropidīns	125 g/l 450 g/l	31.08.2019.	31.10.2019.
Bariton Ultra	K	Bayer AG	0336	2	fluoksastrobīns protiokonazols	112.5 g/l 112.5 g/l	08.04.2020.	08.04.2021.
Barclay Bolt XL	F	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.	0379	2	propikonazols	250 g/l	31.08.2019.	31.10.2019.
Basta	H	Bayer AG	0200	2	amonija glufosināts	150 g/l	31.07.2019.	31.01.2020.
Baytan Trio	K	Bayer AG	0419	2	fluopirams fluoksastrobīns triadimenols	5 g/l 25 g/l 150 g/l	29.02.2020.	28.02.2021.
Betanal Expert	H	Bayer AG	0350	2	desmedifams fenmedifams etofumezāts	71 g/l 91 g/l 112 g/l	31.05.2020.	01.07.2020.
Bumper 25 EC	F	ADAMA Registrations B.V.	0133	2	propikonazols	250 g/l	31.08.2019.	31.10.2019.
Bumper Super	F	ADAMA Registrations B.V.	0217	2	propikonazols prohlorazs	90 g/l 400 g/l	31.08.2019.	31.10.2019.
Caliban Duo*	H	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG	0360	2	nātrija propok- sikarbazons, nātrija metiljo- dosulfurons	168 g/kg 10 g/kg	30.06.2019.	30.06.2020.
Capalo	F	SIA BASF	0327	2	epoksikonaazols metrafenons fenpropimorfs	62.5 g/l 75 g/l 200 g/l	30.10.2019.	30.10.2020.
Dessica	D	Sharda Europe b.v.b.a.	0564	2	dikvāts	200 g/l	31.10.2019.	31.12.2019.
Diqua	D	Sharda Europe b.v.b.a.	0338	2	dikvāts	200 g/l	31.10.2019.	31.12.2019.

ALFABĒTISKIE RĀDĪTĀJI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gloria	F	Bayer AG	0213	2	fenamidons propamokarba hidrohlorīds	75 g/l 375 g/l	14.08.2019.	14.11.2019.
Glyfos Supreme Plus*	H	Cheminova A/S	0623	2	glifosāts	450 g/l	14.06.2019.	14.06.2020.
Gro-Stop HN k.k.f.	AR	Certis Europe B.V.	0222	2	hlorprofams	300 g/l	31.01.2020.	08.10.2020.
Inovor	F	SIA BASF	0611	2	piraklostrobīns propikonazols fluksapiroksāds	200 g/l 125 g/l 30 g/l	31.08.2019.	31.10.2019.
Korbels e.k.	F	SIA BASF	0044	2	fenpropimorfs	750 g/l	30.10.2019.	30.10.2020.
Klean G	H	Ventura Agroscience Ltd	0540	2	glifosāts	360 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Maister OD	H	Bayer AG	0326	2	foramsulfurons nātrija metil- jodosulfurons	30 g/l 1 g/l	10.09.2019.	10.09.2020.
Master Gly	H	Generica Europa Ltd	0541	2	glifosāts	360 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Maxima	D	Sharda Europe b.v.b.a.	0565	2	dikvāts	200 g/l	31.10.2019.	31.12.2019.
Milagro 240	H	Cheminova A/S	0548	2	nikosulfurons	240 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Penquat 20 SL	D	Sharda Europe b.v.b.a.	0608	2	dikvāts	200 g/l	31.10.2019.	31.12.2019.
Plenum	I	ADAMA Registrations B.V.	0382	2	pimetrozīns	500 g/kg	31.07.2019.	31.10.2019.
Ranger XL	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0487	2	glifosāts	360 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Raundaps Gold ST š.k.	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0318	2	glifosāts	450 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Reglone Super	D/H	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0087	2	dikvāts	150 g/l	31.10.2019.	31.12.2019.
Rodeo XL	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0486	2	glifosāts	360 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Roundup ACE ST	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0494	2	glifosāts	450 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Roundup Biactive	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0476	2/3	glifosāts	360 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Roundup Classic XL	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0488	2	glifosāts	360 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Roundup Energy	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0506	2	glifosāts	450 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Roundup FL 450	H	Monsanto Crop Sciences Denmark A/S	0566	2	glifosāts	450 g/l	30.06.2020.	30.06.2021.
Roundup Garden*	H	Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.	0369	3	glifosāts	120 g/l	14.06.2019.	14.06.2020.
Tango Super	F	SIA BASF	0110	2	fenpropimorfs epoksikonazols	250 g/l 84 g/l	30.10.2019.	30.10.2020.
Taspa 500 EC	F	Syngenta Polska Sp. z o.o.	0349	2	propikonazols difenokonazols	250 g/l 250 g/l	31.08.2019.	31.10.2019.

* 2018.gadā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulētie ieraksti

2019. GADĀ ANULĒTĀS ATĻAUJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PARALĒLAJAI TIRDZNIECĪBAI

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Atļaujas īpašnieks	Atļaujas Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Esošo krājumu izplatīšanas beigu termiņš	Esošo krājumu izlietošanas beigu termiņš
Chani 25 EW	F	Harvest Agrochemicals Ltd	28.	2	tebukonazols	250 g/l	31.08.2019.	31.08.2019.
Corus 750 SL	AR	Harvest Agrochemicals Ltd	27.	2	hlormekvāta hlorīds	750 g/l	30.11.2019.	30.11.2019.
DQ 200	D	Harvest Agrochemicals Ltd	32.	2	dikvāts	200 g/l	31.10.2019.	31.12.2019.
Golden Metaz 500 SC	H	Goldengrass Ltd	7.	2	metazahlors	500 g/l	31.01.2020.	31.01.2021.
Golden Piccant 334 SL	H	Goldengrass Ltd	8.	2	klopīralīds piklorams	267 g/l 67 g/l	31.12.2019.	31.12.2019.
OSCAR Plus	H	ProEuro Sp. z o.o.	19.	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	31.07.2019.	31.07.2019.
Piccoli 334 SL	H	ProEuro Sp. z o.o.	12.	2	klopīralīds piklorams	267 g/l 67 g/l	31.12.2019.	31.12.2019.
Stunt 250 EC	AR	ProEuro Sp. z o.o.	22.	2	etil-trineksapaks	250 g/l	30.10.2019.	30.10.2020.

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KURUS ATSEVIŠKĀS KULTŪRĀS NEDRĪKST LIETOT TUVĀK PAR
40 / 35 / 30 / 25 / 20 / 15 / 12 VAI 10 M NO ŪDENSTILPĒM UN ŪDENSTECĒM**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Frāze AAL marķējuma tekstā	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8
Avtar 75 NT	F	0668	2	mankocebs	750 g/kg	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un pārējo kultūraugu sējumos un stādījumos 10 m līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	100
Boxer 800 EC	H	0271	2	prosulfokarbs	800 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	192
Champion 50 WG	F/B	0139	2	vara hidroksīds	500 g/kg	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 35 m aizsargjoslu ķiršu un plūmju stādījumos, 30 m aizsargjoslu ābeļu un bumbieru stādījumos, 15 m aizsargjoslu vīnogu un ogulāju stādījumos un 10 m aizsargjoslu kartupeļu stādījumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	91
Decis Forte *	I	0703	2	deltametrīns	100 g/l	“Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un ābeļu un bumbieru stādījumos ievērot 50 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja tiek lietotas smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, aizsargjosla lielumu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm skatīt lietošanas instrukcijā.”	259
Decis Mega*	I	0310	2	deltametrīns	50 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, augļu dārzos ievērot 40 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	261
Difcor 250 EC	F	0580	2	difenokonazols	250 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu un bumbieru stādījumos 20 m aizsargjoslu un rapša sējumos 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	98
Dithane NT	F	0017	2	mankocebs	750 g/kg	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	100

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8
Emin dārzam Mavrik Vita*	I	31. **	3	tau-fluvalināts	240 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, zirņus un pupu sējumus, kartupeļu stādījumos un krāšņumaugu sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, un ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu un galviņkāpostu stādījumos ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	273
Emin dārzam Score 250 EC	F	33. **	3	difnokonazols	250 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	166
Envidor	I/A	0550	2	spirodiklofēns	240 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, aprikožu, persiku un dekoratīvo koku stādījumos, ievērot 20 m aizsargjoslu un zemeņu, krāšņumaugu, krūmcidoniju, ogulāju un dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos stādaudzētavās, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	262
Evure	I	0577	2	tau-fluvalināts	240 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu, rapša, zirņu un pupu sējumus, kartupeļu stādījumos un krāšņumaugu sējumos un stādījumos, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, un ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu un galviņkāpostu stādījumos ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	272
Fibro	I/A	0460	2	parafinēļa	797 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.”	266
Fury 100 EW	I	0256	2	zeta-cipermetrīns	100 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	267
Manfil 75 WG	F	0425	2	mankocebs	75 %	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	126
Manfil 80 WP	F	0426	2	mankocebs	80 %	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	127
Mavita 250 EC	F	0576	2	difenokonazols	250 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	165
Mavrik*	I	0526	2/3	tau-fluvalināts	240 g/l	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu, rapša, zirņu un pupu sējumus, kartupeļu stādījumos un krāšņumaugu sējumos un stādījumos, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, un ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu un galviņkāpostu stādījumos ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	272, 273
Mistral 700 WG	H	0259	2	metribuzīns	700 g/kg	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, kartupeļu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, un sojas un burkānu sējumos ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	228

1	2	3	4	5	6	7	8
NeemAzal-T/S	I/A	0241	2/3	azadiraktīns-A	10 g/l	“Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu un ozolu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un kartupeļu, dārzeņu, vīnogulāju, krāšņumaugu un dekoratīvo augu sējumos un stādījumos 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	274, 275
Satel 100 EW	I	0613	2	zeta- cipermetrīns	100 g/l	“Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	267
Score 250 EC	F	0001	2/3	difenokonazols	250 g/l	“Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”	165, 167
Signum	F	0269	2	piraklostrobīns boskalīds	6.7 % 26.7 %	“Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, lauka kultūrās ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	167
Wizard 500 EC*	I	17. **	2	cipermetrīns	500 g/l	“Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kas pārsniedz 50cm augstumu, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”	258

* AAL, kam jāievēro drošības pasākumi bitēm

** AAL, kuram izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KURUS NEDRĪKST LIETOT TUVĀK PAR 20 M
NO ŪDENSTILPĒM UN ŪDENSTECĒM**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
Ceriox	F	0405	2	fluksapiroksāds epoksikonazols piraklostrobīns	41.6 g/l 41.6 g/l 66.6 g/l	90
Ciperkils 500 e.k.*	I	0385	2	cipermetrīns	500 g/l	258
Delaro	F	0638	2	trifloksistrobīns protiokonazols	150 g/l 175 g/l	96
Delmetros 100 SC*	I	0675	2	deltametrīns	100 g/l	262
Difenzone	F	0421	2	difenokonazols	250 g/l	100
Dominic	F	0538	2	tebukonazols	250 g/l	174
Epox Top	F	0389	2	epoksikonazols fenpropidīns	40 g/l 100 g/l	109
Flight Forte	H	0293	2	pendimetalīns pikolīnafens	320 g/l 16 g/l	204
Kaiso 50 EG*	I	0381	2	lambda-cihalotrīns	50 g/kg	168
Kantik	F	0495	2	fenpropidīns prohlorazs tebukonazols	150 g/l 200 g/l 100 g/l	122
Karate Zeon 5 CS*	I	0207	2	lambda-cihalotrīns	50 g/l	268
Leander	F	0397	2	fenpropidīns	750 g/l	123
Maracas	F	0484	2	epoksikonazols prohlorazs	50 g/l 225 g/l	127
Roxy 800 EC	H	0518	2	prosulfokarbs	800 g/l	245
Stomp CS	H	0431	2	pendimetalīns	455 g/l	248
Syper*	I	37.**	2	cipermetrīns	500 g/l	258
Tebuplius	F	0539	2	tebukonazols	250 g/l	174
Tebusha 25 EW	F	0432	2	tebukonazols	250 g/l	174
Teridox 500 EC	H	0051	2	dimetahlors	500 g/l	252
Viverda	F	0384	2	boskalīds piraklostrobīns epoksikonazols	140 g/l 60 g/l 50 g/l	179

* AAL, kam jāievēro drošības pasākumi bitēm

** AAL, kuram izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KURUS NEDRĪKST LIETOT TUVĀK PAR 15 / 16 / 25 / 30 VAI 50 M
NO ŪDENSTILPĒM UN ŪDENSTECĒM**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
Nedrīkst lietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm						
Chorus 50 WG	F	0339	2	ciprodinils	500 g/kg	92
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Gemino	F	0490	2	epoksikonazols tebukonazols	45 g/l 150 g/l	112
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Gepard 50 EC	H	0607	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	237
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Graminis	H	0592	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	237
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Legacy Pro	H	0415	2	diflufenikans pendimetalīns hlortolurons	40 g/l 300 g/l 250 g/l	221
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.”					
Opera N	F	0281	2	piraklostrobīns epoksikonazols	85 g/l 62.5 g/l	138
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Priaxor	F	0514	2	fluksapiroksāds piraklostrobīns	75 g/l 150 g/l	149
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Quick 50 EC	H	0429	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	237
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Supero	H	0587	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	237
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Nedrīkst lietot tuvāk par 16 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm						
Comet Pro	F	0354	2	piraklostrobīns	200 g/l	94
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Syllit 544 SC	F	0477	2	dodīns	544 g/l	172
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Nedrīkst lietot tuvāk par 25 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm						
Scab 80 WG	F	0582	2	kaptāns	800 g/kg	165
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Nedrīkst lietot tuvāk par 30 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm						
Merpan 80 WG	F	0499	2	kaptāns	800 g/kg	130
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7
Onyx	H	0657	2	piridāts	600 g/l	232
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ja preparāts tiek lietots ar devu 0,75 l/ha , vai ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ja preparāts tiek lietots daļēti ar devu 0,5 l/ha + 0,5 l/ha ”					
Pico 750 WG	H	0671	2	pikolinfēns	750 g/kg	233
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja tiek lietotas smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, aizsargjoslas lielumu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm skatīt lietošanas instrukcijā”					
Nedrīkst lietot tuvāk par 50 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm						
Delan Pro	F	0628	2	ditianons kālija fosfonāts	125 g/l 561 g/l	40
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 50 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					
Effector	F	0134	2	ditianons	700 g/kg	103
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 50 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”					

**CITI LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
Komplet	H	0393	2	flufenacets diflufenikans	280 g/l 280 g/l	219
Frāze AAL marķējuma tekstā	“SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādātajām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, ievērot 12 m ar augiem blīvi apaugušu aizsargjoslu”.					

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURI IR KAITĪGI BITĒM

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Pasākumi bišu aizsardzībai	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8
Avaunt	I	0418	2	indoksakarbs	150 g/l	① ; R	256
Baythroid	I	0537	2	beta-ciflutrīns	25 g/l	① ; R	257
Biscaya OD	I	0459	2	tiakloprīds	240 g/l	① ; R	256
Bulldock 025 EC	I	0090	2	beta-ciflutrīns	25 g/l	① ; R	257
Ciperkils 500 e.k.	I	0385	2	cipermetrīns	500 g/l	① ; R	258
Decis Forte	I	0703	2	deltametrīns	100 g/l	① ; R	259
Decis Mega	I	0310	2	deltametrīns	50 g/l	① ; R	261
Delmetros 100 SC	I	0675	2	deltametrīns	100 g/l	① ; R	262
Emin dārzam Mavrik Vita	I	31.*	3	tau-fluvalināts	240 g/l	①	273
Envidor	I/A	0550	2	spirodiklofēns	240 g/l	①	262
Evure	I	0577	2	tau-fluvalināts	240 g/l	① ; R	272
Fastac 50	I	0250	2	alfa-cipermetrīns	50 g/l	① ; R	264
Fury 100 EW	I	0256	2	zeta-cipermetrīns	100 g/l	① ; R	267
Kaiso 50 EG	I	0381	2	lambda-cihalotrīns	50 g/kg	① ; R	268
Karate Zeon 5 CS	I	0207	2	lambda-cihalotrīns	50 g/l	① ; R	268
Kestac 50	I	0251	2	alfa-cipermetrīns	50 g/l	① ; R	264
Mavrik	I	0526	2/3	tau-fluvalināts	240 g/l	① ; R	272
Proteus OD	I	0275	2	tiakloprīds deltametrīns	100 g/l 10 g/l	① ; R	278
Satel 100 EW	I	0613	2	zeta-cipermetrīns	100 g/l	① ; R	267
Syper	I	37.*	2	cipermetrīns	500 g/l	① ; R	258
Teppeki	I	0699	2	flonikamīds	500 g/kg	①	281
Vertimec 018 EC	A/I	0296	2	abamektīns	18 g/l	①	282
Wizard 500 EC	I	17.*	2	cipermetrīns	500 g/l	① ; R	258

① – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstā un augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie bišu aizsardzības pasākumi;

R – Augu aizsardzības līdzeklis reģistrēts arī lietojumam rapsī

* AAL, kuram izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURUS LIETOJOT, IR JĀIEVĒRO AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BLAKUSKULTŪRĀM UN CITIEM AR LIETOJUMU NESAISTĪTIEM ORGANISMIEM

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Aizsardzības pasākumi	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7	8
Accurate 200 WG	H	0342	2	metil-metsulfurons	200 g/kg	A	181
Ampera	F	0314	2	tebukonazols prohlorazs	133 g/l 267 g	A	81
Ariane S	H	0188	2	fluroksipīrs klopīralīds MCPA	40 g/l 20 g/l 200 g/l	A	184
Arrva	H	0695	2	MCPA fluroksipīrs klopīralīds	233 g/l 50 g/l 28 g/l	A	218
Attribut	H	0191	2	Na-propoksikarbazons	700 g/kg	A	185
Avoxa	H	0525	2	pinoksadēns piroksulams	33.3 g/l 8.33 g/l	A	185
Banvel 4S	H	0038	2	dikamba	480 g/l	A	186
Bariton Super	K	0612	2	protiokonazols tebukonazols fludioksonils	50 g/l 10 g/l 37.5 g/l	P	61

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8
Barca 334 SL	H	0560	2	klopīralīds piklorāms	267 g/l 67 g/l	A	190
Belkar	H	0598	2	metil-halauksifēns piklorāms	10 g/l 48 g/l	A	191
Biathlon 4D	H	0450	2	tritosulfurons florasulāms	714 g/kg 54 g/kg	A	192
Brasan 540 EC	H	0320	2	dimetahlors klomazons	500 g/l 40 g/l	A	193
Broadway Star	H	0571	2	pirosulāms florasulāms	70.8 g/kg 14.2 g/kg	A	194
Buster	H	40*	2	metil-tribenurons	750 g/kg	A	251
Buteo Start	K	0710	2	flupiradifurons	480 g/l	P	61
Butisan 400	H	0037	2	metazahlors	400 g/l	A	194
Butisan Avant	H	0497	2	metazahlors dimetēnamīds-P kvīnmerāks	300 g/l 100 g/l 100 g/l	A	195
Butisan Kombi	H	0470	2	metazahlors dimetēnamīds-P	200 g/l 200 g/l	A	195
Butisan Pro	H	0629	2	dimetēnamīds-P kvīnmerāks	333 g/l 167 g/l	A	250
Butisan Star	H	0258	2	metazahlors kvīnmerāks	333 g/l 83 g/l	A	195
Butoxone	H	0138	2	MCPB	400 g/l	A	195
Cabrio Duo	F	0508	2	dimetomorfs piraklostrobīns	72 g/l 40 g/l	K	87
Calibre 50 SX	H	0301	2	metil-tifensulfurons metil-tribenurons	333 g/kg 167 g/kg	A	196
Callisto 100 SC	H	0700	2	mezotriions	100 g/l	A	196
CDQ SX	H	0589	2	metil-metsulfurons metil-tribenurons	111 g/kg 222 g/kg	A	196
Centurion Plus	H	0509	3	kletodīms	120 g/l	A	197
Chambel 6 FS	K	0309	2	tebukonazols	60 g/l	P	62
Chwastox 750 SL	H	0376	2	MCPA	750 g/l	A	198
Clamox	H	0496	2	metazahlors imazamokss	375 g/l 17.5 g/l	A	198
Clap Forte	H	0643	2	klopīralīds	720 g/kg	A	198
Cleave	H	0542	2	florasulāms fluoksipīrs	2.5 g/l 100 g/l	A	199
Cleravo	H	0572	2	imazamokss kvīnmerāks	35 g/l 250 g/l	A	199
Cliophar 600 SL	H	0665	2	klopīralīds	600 g/l	A	199
Decis Forte	I	0703	2	deltametrīns	100 g/l	K	259
Decis Mega	I	0310	2/3	deltametrīns	50 g/l	K	261
Delmetros 100 SC	I	0675	2	deltametrīns	100 g/l	K	262
Dicash	H	0597	2	dikamba	480 g/l	A	201
Dicoherb Super 750 SL	H	0390	2	MCPA dikamba	660 g/l 90 g/l	A	201
Elegant 2FD	H	0478	2	florasulāms 2,4-D	6.25 g/l 300 g/l	A	202
Elektis 75 d.g.	F	0179	2	zoksamīds mankocebs	83 g/kg 667 g/kg	K	107
Elumis 105 OD	H	0573	2	mezotriions nikosulfurons	75 g/l 30 g/l	A	202
Ergon	H	0357	2	metil-metsulfurons metil-tifensulfurons	68 g/kg 682 g/kg	A	202
Estets 600 e.k.	H	0305	2	2,4-D	600 g/l	A	203
Fenix	H	0283	2	aklonifēns	600 g/l	A	203
Focus Ultra	H	0065	2	cikloksidīms	100 g/l	A	205
Fornet 4 OD	H	0436	2	nikosulfurons	40 g/l	A	227
Fornet Max 6 OD	H	0433	2	nikosulfurons	60 g/l	A	228
Foxtrot 69 EW	H	0408	2	etil-fenoksaprops-P	69 g/l	A	210

1	2	3	4	5	6	7	8
Frazer	H	38.*	2	fluroksipirs	200 g/l	A	217
Frequent	H	0691	2	butil-fluazifops-P	125 g/l	A	210
Fuego Top	H	0483	2	metazahlors kvinmeraks	375 g/l 125 g/l	A	249
Fusilade Forte 150 EC	H	0182	2	butil-fluazifops-P	150 g/l	A	211
Galistop 200	H	0602	2	fluroksipirs	200 g/l	A	217
Gepard 50 EC	H	0607	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	A	237
Goltix 700 SC	H	0155	2	metamitrons	700 g/l	A	216
Graminis	H	0592	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	A	237
Grodyl	H	0028	2	amidosulfurons	75 %	A	216
Gusto	Lim	0489	2/3	metaldehīds	30 g/kg	P	283, 284
Herbos 110 EC	H	0680	2	etil-fenoksaprops-P	110 g/l	A	217
Hurler	H	0601	2	fluroksipirs	200 g/l	A	217
Hussar Activ Plus OD	H	0588	2	2.4-D 2-etilheksil esteris nātrija metil-jodosulfurons metil-tiēnkarbazons	300 g/l 10 g/l 7.5 g/l	A	217
Kaiso 50 EG	I	0381	2	lambda-cihalotrīns	50 g/kg	K	268
Kalif 360 CS	H	0409	2	klomazons	360 g/l	A	218
Kalif Mega	H	0410	2	klomazons metazahlors	33 g/l 250 g/l	K	218
Kinto	K	0262	2	tritikonazols prohlorazs	20 g/l 55.1 g/l	P	63
Kinvara	H	0672	2	MCPA fluroksipirs klopīralīds	233 g/l 50 g/l 28 g/l	A	218
Komplet	H	0393	2	flufenacets diflufenikans	280 g/l 280 g/l	A	219
Korvetto	H	0663	2	metil-halauksifēns klopīralīds	5 g/l 120 g/l	A	219
Kyleo	H	0423	2	glifosāts 2.4-D	240 g/l 160 g/l	A	219
Lancelot	H	0524	2	aminopīralīds florasulams	300 g/kg 150 g/kg	A	220
Legacy Pro	H	0415	2	diflufenikans pendimetalīns hlortolurons	40 g/l 300 g/l 250 g/l	A	221
Lentagran WP	H	0330	2	piridāts	450 g/kg	A	221
Leopard	H	0424	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	A	223
Lima Oro	Lim	0568	2/3	metaldehīds	50 g/kg	P	287, 289
Limgol	Lim	0586	2	metaldehīds	50 g/kg	P	287
Lontrel 72 SG	H	0388	2	klopīralīds	720 g/kg	A	224
Lontrel 600 SL	H	0666	2	klopīralīds	600 g/l	A	223
Maister Power OD	H	0543	2	foramsulfurons nātrija metil-jodosulfurons metil-tiēnkarbazons	30 g/l 1 g/l 10 g/l	A	225
Maredo 125 SC	F	0373	2	epoksikonazols	125 g/l	A	128
Maxim Star 025 FS	K	0150	2	fludioksonīls ciprokonazols	18.75 g/l 6.25 g/l	P	65
MCPA Classic 750 SL	H	0532	2	MCPA	750 g/l	A	198
Meridian	Lim	0569	2	metaldehīds	50 g/kg	P	287
Metazamix™	H	0500	2	metazahlors aminopīralīds piklorams	500 g/l 5.3 g/l 13.3 g/l	A	226
Metric ZC	H	0344	2	metribuzīns klomazons	233 g/l 60 g/l	A	227
Milagro 4 OD	H	0223	2	nikosulfurons	40 g/l	A	227
Milagro Extra 6 OD	H	0361	2	nikosulfurons	60 g/l	A	228
Mistral 700 WG	H	0259	2	metribuzīns	700 g/kg	A	228
Mixin	H	0658	2	florasulams fluroksipirs	2.5 g/l 100 g/l	A	199
Mollo	H	34.*	2	florasulams	50 g/l	A	245

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4	5	6	7	8
Monitor	H	0145	2	sulfosulfurons	75 %	A	229
Mustangs Forte s.e.	H	0334	2	florasulams aminopirals 2,4-D	5 g/l 10 g/l 180 g/l	A	229
Mystic	F	0362	2	tebukonazols	250 g/l	A	135
Mystic 250 EW	F/AR	0696	2	tebukonazols	250 g/l	A	56, 136
Nicogan	H	0413	2	nikosulfurons	40 g/l	A	230
Nimbus Gold	H	0523	2	metazahlori dimetēnamīds-P klomazons	200 g/l 200 g/l 40 g/l	A	230
Nimbus SE	H	0328	2	metazahlori klomazons	250 g/l 33.3 g/l	A	230
Nuance 75 WG	H	0403	2	metil-tribenurons	750 g/kg	A	230
Opus EC	F	0367	2	epoksikonazols	83 g/l	A	140
Pantera 4 EC	H	0171	2	tefuril-kvialofops-P	40 g/l	A	233
Pixxaro EC	H	0545	2	metil-halauksifēns fluoksipīrs	12.5 g/l 280 g/l	A	234
Polytanol	Ro	0363	2	kalcija fosfīds	18 %	P	293
Prepper	K	0697	2	fludioksonils	25 g/l	P	65
Primus	H	0172	2	florasulams	50 g/l	A	234
Primus XL	H	0387	2	florasulams fluoksipīrs	5 g/l 100 g/l	A	236
Pro	H	0585	2	florasulams	50 g/l	A	234
Profi MCPA 750 SL	H	0531	2	MCPA	750 g/l	A	198
Puma Universal	H	0131	2	etil-fenoksaprops -P	69 g/l	A	236
Quelex	H	0641	2	metil-halauksifēns florasulams	104.2 g/kg 100 g/kg	A	237
Quick 50 EC	H	0429	2	etil-kvialofops-P	50 g/l	A	237
Rancona 15 ME	K	0698	2	ipkonazols	15.1 g/l	P	66
Rapsan 400 SC	H	0617	2	metazahlori	400 g/l	A	194
Rapsan 500 SC	H	0546	2	metazahlori	500 g/l	A	238
Rapsan Plus	H	0636	2	metazahlori kvīnmeraks	333 g/l 83 g/l	A	238
Rapsan Plus SC	H	0618	2	metazahlori kvīnmeraks	333 g/l 83 g/l	A	195
Redigo Pro	K	0553	2	protiokonazols tebukonazols	150 g/l 20 g/l	P	66
Regent	H	41.*	2	klomazons	360 g/l	A	218
Roundup 60	H	0583	3	glifosāts	60 g/l	A	238
Roundup B	H	0516	3	glifosāts	360 g/l	A	238
Roundup Flex	H	0462	2	glifosāts	480 g/l	A	239
Roundup Flick	H	0515	2	glifosāts	360 g/l	A	240
Roundup G	H	0517	3	glifosāts	120 g/l	A	241
Roundup PowerMax	H	0519	2	glifosāts	720 g/kg	A	242
Roxy 800 EC	H	0518	2	prosulfokarbs	800 g/l	A	245
Samson 4 OD	H	0437	2	nikosulfurons	40 g/l	A	227
Samson Max 6 OD	H	0434	2	nikosulfurons	60 g/l	A	228
Saracen	H	0471	2	florasulams	50 g/l	A	245
Saracen Delta	H	0493	2	florasulams diflufenikāns	50 g/l 500 g/l	A	246
Scenic Gold	K	0705	2	fluoksastrobīns fluopikolīds	150 g/l 200 g/l	P	67
Seedron	K	0534	2	fludioksonils tebukonazols	50 g/l 10 g/l	P	67
Sekator OD	H	0260	2	amidosulfurons nātrija metil-jodosulfurons	100 g/l 25 g/l	A	246
Spitfire 333 HL	H	0606	2	fluoksipīrs	333 g/l	A	246
Starane 333 HL	H	0605	2	fluoksipīrs	333 g/l	A	246
Starship	H	0520	2	mezotrions	100 g/l	A	247

1	2	3	4	5	6	7
Sultan 500 SC	H	0245	2	metazahlors	500 g/l	A 248
Sultan Super	H	0457	2	metazahlors kvinmeraks	375 g/l 125 g/l	A 249
Supero	H	0592	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	A 237
SuPrim	H	0528	2	florasulams	50 g/l	A 234
Syllit 544 SC	F	0477	2	dodīns	544 g/l	A 172
Tanaris	H	0579	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	A 250
Targa Super	H	0383	2	etil-kvizalofops-P	50 g/l	A 250
TBM 75 WG	H	0581	2	metil-tribenurons	750 g/kg	A 251
Temsa SC	H	0563	2	mezotriions	100 g/l	A 251
Teridox 500 EC	H	0051	2	dimetahlors	500 g/l	A 252
Tomahawk 200 EC	H	0536	2	fluroksipirs	200 g/l	A 252
Tombo WG	H	0335	2	piroksulams florasulams aminopiralīds	50 g/kg 25 g/kg 50 g/kg	A 253
Trimmer 500 WG	H	0469	2	metil-tribenurons	500 g/kg	A 253
Tripali	H	0551	2	metil-metsulfurons metil-tribenurons florasulams	83 g/kg 83 g/kg 105 g/kg	A 254
Tristar 50 SG	H	0652	2	metil-tribenurons	500 g/kg	A 254
Vibrance Duo	K	0570	2	sedaksāns fludioksonils	25 g/l 25 g/l	P 68
Vibrance Pro	K	0631	2	sedaksāns fludioksonils tritikonazols	25 g/l 25 g/l 20 g/l	P 68
Vibrance Star	K	0679	2	sedaksāns fludioksonils tritikonazols	25 g/l 25 g/l 20 g/l	P 69
Vibrance Trio	K	0635	2	sedaksāns fludioksonils tebukonazols	25 g/l 25 g/l 10 g/l	P 70
Zypar	H	0555	2	metil-halauksifēns florasulams	6.254 g/l 5 g/l	A 255

A – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie aizsardzības pasākumi ar lietojumu nesaistītiem augiem un citiem kultūraugiem;

P – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie aizsardzības pasākumi putniem;

K – Personai, kas lieto augu aizsardzības līdzekli, jāievēro konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas instrukcijā noteiktie aizsardzības pasākumi ar lietojumu nesaistītiem kukaiņiem/posmkājiem.

* AAL, kuram izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

**LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI,
KURIEM IR NOTEIKTI LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
ATTIECĪBĀ UZ DARBĪGO VIELU**

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Liet. kat.	Reģ. Nr.	Reģ. klase	Darbīgās vielas nosaukums	Darbīgās vielas saturs	Lpp.
1	2	3	4	5	6	7
Aminopirālids: “SPe1 Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur aminopirālīdu biežāk, kā katru otro gadu tajā pašā laukā.”						
Metazamix™	H	0500	2	metazahlorš aminopirālids piklorams	500 g/l 5.3 g/l 13.3 g/l	226
Dimetahlors: “SPe1 Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetahloru, vairāk kā 1 kg d.v./ha vienā un tajā pašā laukā reizi trijos gados.”						
Brasan 540 EC	H	0320	2	dimetahlors klomazons	500 g/l 40 g/l	193
Teridox 500 EC	H	0051	2	dimetahlors	500 g/l	252
Dimetēnamīds-P: “SPe1 Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetēnamīdu-P vairāk, kā vienu reizi trijos gados.”						
Butisan Kombi	H	0470	2	metazahlorš dimetēnamīds-P	200 g/l 200 g/l	195
Butisan Pro	H	0629	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	250
Nimbus Gold	H	0523	2	metazahlorš dimetēnamīds-P klomazons	200 g/l 200 g/l 40 g/l	230
Tanaris	H	0579	2	dimetēnamīds-P kvinmeraks	333 g/l 167 g/l	250
Fluazinams: “SPe1 Lai aizsargātu augsnes organismus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur fluazinamu, biežāk, kā katru otro gadu tajā pašā laukā.”						
Altima 500 s.k.	F	0176	2	fluazinams	500 g/l	75
Frowncide 500 s.k.	F	0475	2	fluazinams	500 g/l	75
Nando 500 SC	F	0427	2	fluazinams	500 g/l	137
Ohayo 500 s.k.	F	0473	2	fluazinams	500 g/l	75
Širlans 500 s.k.	F	0177	2	fluazinams	500 g/l	75
Winby 500 s.k.	F	0474	2	fluazinams	500 g/l	75
Kvinmeraks: “SPe1 Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur kvinmeraku vairāk kā vienu reizi vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.”						
Rapsan Plus	H	0636	2	metazahlorš kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	238
Metazahlorš: “SPe1 Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru vairāk kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.”						
Butisan 400	H	0037	2	metazahlorš	400 g/l	194
Butisan Avant	H	0497	2	metazahlorš dimetēnamīds-P kvinmeraks	300 g/l 100 g/l 100 g/l	195
Butisan Kombi	H	0470	2	metazahlorš dimetēnamīds-P	200 g/l 200 g/l	195
Butisan Star	H	0258	2	metazahlorš kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	195
Clamox	H	0496	2	metazahlorš imazamokss	375 g/l 17.5 g/l	198
Fuego Top	H	0483	2	metazahlorš kvinmeraks	375 g/l 125 g/l	249
Kalif Mega	H	0410	2	klomazons metazahlorš	33 g/l 250 g/l	218

1	2	3	4	5	6	7
Metazamix™	H	0500	2	metazahlors aminopiralīds piklorams	500 g/l 5.3 g/l 13.3 g/l	220
Nimbus Gold	H	0523	2	metazahlors dimetēnamīds-P klomazons	200 g/l 200 g/l 40 g/l	230
Nimbus SE	H	0328	2	klomazons metazahlors	33.3 g/l 250 g/l	230
Rapsan 400 SC	H	0617	2	metazahlors	400 g/l	194
Rapsan 500 SC	H	0546	2	metazahlors	500 g/l	238
Rapsan Plus	H	0636	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	238
Rapsan Plus SC	H	0618	2	metazahlors kvinmeraks	333 g/l 83 g/l	195
Sultan 500 SC	H	0245	2	metazahlors	500 g/l	248
Sultan Super	H	0457	2	metazahlors kvinemraks	375 g/l 125 g/l	249
Nikosulfurons: "SPe1 Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur nikosulfuronu vairāk nekā vienu reizi katru otro gadu tajā pašā laukā."						
Elumis 105 OD	H	0573	2	mezotrions nikosulfurons	75 g/l 30 g/l	202
Fornet 4 OD	H	0436	2	nikosulfurons	40 g/l	227
Fornet Max 6 OD	H	0433	2	nikosulfurons	60 g/l	228
Milagro 4 OD	H	0223	2	nikosulfurons	40 g/l	227
Milagro Extra 6 OD	H	0361	2	nikosulfurons	60 g/l	227
Niklos 40 OD	H	14.*	2	nikosulfurons	40 g/l	227
Samson 4 OD	H	0437	2	nikosulfurons	40 g/l	227
Samson Max 6 OD	H	0434	2	nikosulfurons	60 g/l	228
Parafineļļa: "SPe1 Lai aizsargātu augsnes organismus, nelietot šo augu aizsardzības līdzekli vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur parafineļļu vairāk par 8 reizēm sezonā katru trešo gadu vienā un tajā pašā laukā."						
Fibro	I/A	0460	2	parafineļļa	797 g/l	266

* AAL, kuram izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOJUMI

AUGU AUGŠANAS REGULATORI

1. Banarg

Reģ. Nr. 0627, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etilēns, 4%.

Augu augšanas regulators.

SIA AGA

Apstrādājamā produkcija	Lietošanas mērķis	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Maksimālais apstrāžu skaits, produkcijas partijai
Banāni	Nogatavināt, veicināt augļu krāsas maiņu	11.25–25 l/m ³ (450–1000 ppm)	Produkcijas partijas apstrādes ilgums 24 stundas. Apstrādāt produkcijas partiju 24 stundas	1
Apelsīni, mandarīni, citroni, klementīni, greipfrūti, citi citrusaugļi	Veicināt augļu krāsas maiņu	0.025–0.25 l/m ³ (1–10 ppm)	Produkcijas partijas apstrādes ilgums 72 stundas. Apstrādāt produkcijas partiju 72 stundas	1

2. Caryx

Reģ. Nr. 0440, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds, 210 g/l,
metkonazols, 30 g/l.

Augu augšanas regulators.

SIA BASF

Apstrādājamā kultūra	Deva, l, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5
Ziemas rapsis	0.7–1.4	<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no trīs lapu stadijas līdz sānu dzinumu attīstības sākumam (AS 13–20) un atkārtoti apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar sānu dzinumu attīstības sākumu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59)	–	2
	0.7–1.4	<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar sānu dzinumu attīstības sākumu līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59)	–	1
Vasaras rapsis	0.7–1.4	Apsmidzināt sējumus, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31–55)	–	1

1	2	3	4	5

3. CCC

Reģ. Nr. 0147, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.
Pretveldres preparāts.
Nufarm GmbH & Co KG

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Stabilāns 750 š.k.

Reģ. Nr. 0287, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.
Pretveldres preparāts.
Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, tritikāle	1.0–1.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, cerošanas stadijā līdz pirmā mezgla stadijai. Drikt apstrādāt arī graudaugu sējumus ar daudzgadīgo stiebrzāļu un āboliņa pasēju	–	1
Vasaras kvieši	0.3–1.0 atkarībā no šķirnes		–	1
Rudzi	1.5–2.0		–	1
Mieži	0.6		–	1
Auzas	1.0–1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar divu mezglu stadiju līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32–49)	–	1

4. Cerone

Reģ. Nr. 0122, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etefons, 480 g/l.
Pretveldres preparāts.
Bayer AG

Ziemas kvieši	0.50–0.75	Apsmidzināt sējumus, sākot no karoglapas parādīšanās līdz pēdējās lapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 37–45)	42	1
Tritikāle	1.0		42	1
Ziemas rudzi	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no karoglapas parādīšanās līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 37–49)	42	1
Vasaras mieži	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no otrā mezgla līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32–49)	42	1
Ziemas mieži	0.75–1.00		42	1

5. Cuadro NT

Reģ. Nr. 0544, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Cheminova A/S

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Countdown NT

Reģ. Nr. 0599, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.
Augu augšanas regulators.
Cheminova A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	0.2–0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
Ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi, tritikāle	0.4–0.6	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
Auzas	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
Daudzgadīgā airene, daudziedu airene, sarkanā auzene, niedru auzene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle (sēklai)	0.4–0.8	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas vai skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)	–	1

1	2	3	4	5

6. Cycocel 750

Reģ. Nr. 0096, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds, 750 g/l.

Pretveldres preparāts.

SIA BASF

Ziemas kvieši	1.0–1.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32)	–	1
Vasaras kvieši	0.8–1.25	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32)	–	1
Tritikāle	1.0–1.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32)	–	1
Rudzi	1.0–2.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32)	–	1
Auzas	1.0–1.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	–	1
Vasaras mieži	1.0–1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32)	–	1
Stiebrzāles* (sēklai)	1.2–2.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32)	–	1

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

7. Folicur

Reģ. Nr. 0057, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

Bayer AG

Ziemas rapsis	0.5	Apsmidzināt sējumus rudenī 5–6 lapu attīstības stadijā (AS 15–16)	56	1
	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)		
Vasaras rapsis	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)	56	1

8. Grassrooter

Reģ. Nr.0709, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etefons, 480 g/l.

Pretveldres preparāts.

Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši, ziemas mieži	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanās stadiju līdz vārpošanas sākumam (AS 41–51)	-	1
Vasaras mieži	0.75	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanās stadiju līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 41–49)	-	1

1	2	3	4	5

9. Juventus 90

Reģ. Nr. 0221, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Artina EC

Reģ. Nr. 0653, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Plexeo 90

Reģ. Nr. 0677, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Turret 90

Reģ. Nr. 0677, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
Augu augšanas regulators.
Globachem n.v.

Ziemas rapsis	0.5	Apsmidzināt sējumus rudenī kultūrauga 4–6 lapu stadijā (AS 14–16)	56	1
	0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31–55)		
Vasaras rapsis	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31–55)	56	1

10. Medax Max

Reģ. Nr. 0511, reģ. klase 2.
Darbīgās vielas: kalcija proheksadions, 50 g/kg,
etil-trineksapaks, 75 g/kg.
Augu augšanas regulators/pretveldres preparāts.
SIA BASF

Ziemas kvieši	0.3-0.75	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.3-0.5	vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49)		
	0.3-0.75	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā.	-	2
Ziemas mieži	0.5-1.0	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.5-0.75	vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49)		
	0.5-0.75	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā	-	2

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1	2	3	4	5
Rudzi	0.5- 1.0	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.5-0.75	vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49)		
	0.5-0.75	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā	-	2
Ziemas tritikāle	0.3-0.75	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.5	vai apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39-49)		
	0.3-0.75	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29-49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā	-	2
Ziemas auzas	0.3-0.75	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
Vasaras mieži	0.3-0.5	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39)	-	1
	0.15-0.35	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 0.5 kg/ha sezonā	-	2
Vasaras kvieši	0.3-0.5	<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39). Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0.3 kg/ha	-	1
	0.15-0.35	<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29-39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 0.5 kg/ha sezonā. Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0.3 kg/ha	-	2
Vasaras auzas	0.3-0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz četru mezglu stadijai (AS 29-34)	-	1

1	2	3	4	5
11. Medax Top				
Reģ. Nr. 0347, reģ. klase 2.				
Darbīgās vielas: kalcija proheksadions, 50 g/l, mepikvāta hlorīds, 300 g/l.				
Augu augšanas regulators/pretveldres preparāts.				
SIA BASF				
Ziemas kvieši	0.75–1.5	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
	0.75 + 0.75	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39), dalītā apstrādē. Nelietot vairāk, kā 1.5 l/ha sezonā	–	2
Ziemas mieži	0.75–1.5	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
	0.75 + 0.75	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39), dalītā apstrādē. Nelietot vairāk, kā 1.5 l/ha sezonā	–	2
Ziemas tritikāle	0.75–1.5	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
	0.75 + 0.75	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39), dalītā apstrādē. Nelietot vairāk, kā 1.5 l/ha sezonā	–	2
Rudzi	0.75–1.5	1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
	0.75 + 0.75	2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39), dalītā apstrādē. Nelietot vairāk, kā 1.5 l/ha sezonā	–	2
Vasaras mieži	0.75–1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
Vasaras kvieši	0.5–1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
Auzas	0.6–1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
Sarkanā auzene, niedru auzene, parastā kamolzāle (sēklai)	1.0–1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)	–	1
Airenes (sēklai)	1.0–1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)	–	1

12. Moddus 250 EC

Reģ. Nr. 0183, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

*Syngenta Polska Sp. z o.o.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Bertego**

Reģ. Nr. 0594, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

*Syngenta Polska Sp. z o.o.***Tempo**

Reģ. Nr. 0596, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

*Syngenta Polska Sp. z o.o.***Regucil**

Reģ. Nr. 0595, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Apstrādājamie kultūraugi	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši	0.3–0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37)	–	1
Vasaras kvieši	0.3–0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37)	–	1
Vasaras mieži, ziemas mieži	0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29–37)	–	1
Tritikāle, rudzi	0.3–0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no trešā mezgla stadijas līdz attīstītas karoglapas parādīšanās stadijai (AS 33–39)	–	1
Auzas	0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30–32)	–	1

13. Moddus Start

Reģ. Nr. 0498, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25–49)	–	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	0.6	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga no cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25–49)	–	1
	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2
Tritikāle, rudzi	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25–49)	–	1
	0.25	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2

1	2	3	4	5
Auzas	0.4	Apsmidzināt sējumus sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32)	–	1
	0.2	Apsmidzināt sējumus sākot no kultūrauga stiebrošanas cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2
Stiebrzāles (sēklai)	0.8	Apsmidzināt sējumus sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)	–	1
	0.4	Apsmidzināt sējumus sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2

14. Moxa

Reģ. Nr. 0562, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

Globachem n.v.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	0.2–0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39)	–	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	0.4–0.6	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39)	–	1
	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2
Rudzi	0.5–0.6	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39)	–	1
	0.25	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	0.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39)	–	1
	0.25	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 25–39), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2
Auzas	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32)	–	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25–32), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2
Stiebrzāles: sarkanā auzene, pļavas auzene, timotiņš, daudzgadīgā airene (sēklai)	0.4–0.8	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga pirmā mezgla līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31–49)	–	1
	0.4	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga pirmā mezgla līdz vārpskaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 31–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas	–	2

1	2	3	4	5

15. Mystic 250 EW

Reģ. Nr. 0696, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Augu augšanas regulators

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas rapsis	0.5	Apsmidzināt sējumus rudenī kultūrauga četrā līdz astoņu lapu stadijā (AS 14-18)	56	1

16. Nexa 500 EC

Reģ. Nr.0667, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 500 g/l.

Augu augšanas regulators.

Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cirošanas beigām līdz trešā mezgla stadijai (AS 29-33) un nākamā apstrāde pēc 7-25 dienām, sākot ar trešā mezgla stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 33-39)	-	2
Rudzi	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cirošanas beigām karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29-37)	-	1
	0.15	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cirošanas beigām līdz piecu mezglu stadijai (AS 29-35) un atkārtoti pēc 6-16 dienām no piecu mezglu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 35-39)	-	2
Ziemas tritikāle	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz sestā mezgla stadijai (AS 30-36)	-	1
Ziemas mieži	0.3	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31-37)	-	1
Vasaras mieži	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)	-	1

17. Next

Reģ. Nr. 0624, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 250 g/l.

Augu augšanas regulators.

Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas kvieši	0.3–0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 31–32)	–	1
Ziemas mieži	0.4–0.6	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31–39)	–	1

1	2	3	4	5

18. Regalis Plus

Reģ. Nr. 0491, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: kalcijs proheksadions, 100 g/kg.

Augu augšanas regulators.

SIA BASF

Ābeles, bumbieres	0.5–2.5	1. apstrādes veids Apsmidzināt stādījumus, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69), maksimālā deva 2.5 kg. Tiek ierobežota bakteriālās iedegas (<i>Erwinia amylovora</i>) sekundārās infekcijas izplatība	–	1
	0.5–2.5 un 0.5–1.5	2. apstrādes veids Apsmidzināt stādījumus dalītā apstrādē, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69), maksimālā deva 2.5 kg un augļu attīstības fāzes vidum (AS 71–75), maksimālā deva 1.5 kg/ha, kopā sezonā nepārsniedzot 3.0 kg/ha. Tiek ierobežota bakteriālās iedegas (<i>Erwinia amylovora</i>) sekundārās infekcijas izplatība	–	2

19. Terpal

Reģ. Nr. 0144, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds, 305 g/l,
etefons, 155 g/l.

Augu augšanas regulators/pretveldres preparāts.

SIA BASF

Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži	0.5–1.5	Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu divu mezglu stadijas līdz vārpa piebriešanas karoglapas maksti fāzes beigām (AS 32–49)	–	1
Rudzi	1.0–1.5			

20. Tilmor

Reģ. Nr. 0353, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 80 g/l,
tebukonazols, 160 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas rapsis	0.8–1.0	Apsmidzināt sējumus rudenī, 5–6 lapu attīstības stadijā (AS 15–16)	56	1
	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)		
Vasaras rapsis	1.0	Apsmidzināt sējumus, sākot no stublāja veidošanās fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)	56	1

21. Toprex 375 SC

Reģ. Nr. 0400, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: difenokonazols, 250 g/l,
paklobutrazols, 125 g/l.

Augu augšanas regulators.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis	0.3	Apsmidzināt sējumus rudenī, rapša četru lapu līdz sešu lapu stadijā (AS 14–16)	–	1
	0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā starpmezglu posma attīstības līdz stadijai, kad starp lapām redzami ziedpumpuri (AS 31–50)	100	1

22. Trimaxx

Reģ. Nr. 0398, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.

Augu augšanas regulators.

*Nufarm GmbH & Co KG***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Calma**

Reģ. Nr. 0521, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.

Augu augšanas regulators.

*Nufarm GmbH & Co KG***Optimus**

Reģ. Nr. 0399, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks, 175 g/l.

Augu augšanas regulators.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši	0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37)	–	1
Vasaras kvieši	0.4	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37)	–	1
Vasaras mieži, ziemas mieži	0.3–0.5	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29–37)	–	1

DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

Apstrādājamais objekts	Kaitīgais organisms	Ieteicamā darba šķidruma konc. %	Ekspozīcijas laiks	Apstrādes veids, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās
1	2	3	4	5	6

1. Menno Florades

Reģ. Nr. 0593, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: benzoscābe, 90 g/l.

Dezinfekcijas līdzeklis.

Menno Chemie-Vertrieb GmbH

Naži, darbarīki	Vīrusi: ArMV, CyMV, PLCV, TSWV, PLPV	4	3 min	Mērcēt darba šķīdumā	–
	Vīrusi: PepMV, MNSV, ZYMV, PFBV				
	Vīrusi: ORSV, TMV, TSV, BePMV, PMMoV, ToMV				
	Viroīdi: PSTYd, CSVd				
	Sēnes: <i>Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cercospora, Chalara, Colletotrichum, Cylindrocladium, Dactylium, Didimella, Erysiphe, Fusarium, Helminthosporium, Mucor, Perenospora, Pythium, Phytophthora, Ramularia, Rhizoctonia, Rhizopus, Thielaviopsis, Trichoderma, Verticillium</i>				
	Baktērijas: <i>Acidovorax, Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Rastonia</i> (dekoratīvajā dārzkopībā, dārzenkopībā, sēņu audzēšanā)				
Virsmas: noliktavu telpas, mehānismi, siltumnīcas, tīrīšanas iekārtas, soli, galdi, konteineri, podī, paliktņi, darba virsmas u.c.	Baktērijas: Kartupeļu gaišā gredzenpuve (<i>Clavibacter michiganensis</i>), kartupeļu tumšā gredzenpuve (<i>Rastonia solanacearum</i>);	1 2 4 1 1 2	16 h 16 h 16 h 16 h 16 h 4 h	Apsmidzināšana vai pārklāšana ar putām, salaistīšana, saliešana. Darba šķidruma patēriņš 0.2–0.8 l/m ²	–
	Sēnes: Kartupeļu laktu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), melnais kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>) (augkopībā / kartupeļu noliktavās)				
	Vīrusi: ArMV, CyMV, PLCV, TSWV, PLPV				
	Vīrusi: PepMV, MNSV, ZYMV, PFBV				
	Vīrusi: ORSV, TMV, TSV, BePMV, PMMoV, ToMV				
	Viroīdi: PSTYd, CSVd				
	Sēnes: <i>Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cercospora, Chalara, Colletotrichum, Cylindrocladium, Dactylium, Didimella, Erysiphe, Fusarium, Helminthosporium, Mucor, Perenospora, Pythium, Phytophthora, Ramularia, Rhizoctonia, Rhizopus, Thielaviopsis, Trichoderma, Verticillium</i>				
	Baktērijas: <i>Acidovorax, Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Rastonia</i> (dekoratīvajā dārzkopībā, dārzenkopībā, sēņu audzēšanā)				

1	2	3	4	5	6
Kartupeļu noliktava (grīda, sienas, ventilēšanas kanāli), konteineri, iekraušanas iekārtas, lauksaimniecības tehnika	Baktērijas: Kartupeļu gaišā gredzenpuve (<i>Clavibacter michiganensis</i>), kartupeļu tumšā gredzenpuve (<i>Rastonia solanacearum</i>); Sēnes: Kartupeļu laktu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), melnais kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2	4 h	Apsmidzināt apstrādājamo virsmu. Darba šķidruma patēriņš 0.8 l/m ²	–

KODNES

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/t	Ieteicamais darba šķidruma patēriņš, l/t	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
1	2	3	4	5

1. Bariton Super

Reģ. Nr. 0612, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 50 g/l,

tebukonazols, 10 g/l,

fludioksonils, 37.5 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas kvieši,	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras tritikāle	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda f.sp.hordei</i>)	1.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras mieži	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda f.sp.hordei</i>)	1.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0	6.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

2. Buteo Start

Reģ. Nr. 0710, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: flupiradifurons, 480 g/l.

Sistēmas iedarbība

Bayer AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), rapša stublāju spradzis (<i>Psylliodes chrysocephala</i>), agrā kāpostu muša (<i>Delia radicum</i>)	6.25	6.25	Kodināt sēklas pirms sējas

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5

3. Celest Trio 060 FS

Reģ. Nr. 0380, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fludioksonils, 25 g/l,
difenokonazols, 25 g/l,
tebukonazols, 10 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), kviešu pundurmelnplauka (<i>Tilletia controversa</i>)	2.0	6–10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	1.5–2.0	5.5–10	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>)	2.0	6–10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	1.5–2.0	5.5–10	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	2.0	6–10	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	1.5–2.0	5.5–10	Kodināt sēklas pirms sējas
Tritikāle	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	1.5–2.0	5.5–10	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>)	1.5	5.5–9.5	Kodināt sēklas pirms sējas

4. Chambel 6 FS

Reģ. Nr. 0309, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 60 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	0.5	5.5	Kodināt sēklas pirms sējas

5. Difend

Reģ. Nr. 0439, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: difenokonazols, 30 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Globachem n.v.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, vasaras kvieši, vasaras tritikāle	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	2.0	2–6	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas kvieši, ziemas tritikāle	Kviešu pundurmelnplauka (<i>Tilletia controversa</i>)	2.5	2.5–6.5	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

6. Kinto

Reģ. Nr. 0262, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tritikonazols, 20 g/l,
prohlorazs 55.1 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Tritikāle	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>)	2.0	2.0–8.0	Kodināt sēklas pirms sējas

7. Kinto Plus

Reģ. Nr. 0662, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tritikonazols, 33.3 g/l,
fluksapiroksāds, 33.3 g/l,
fludioksonils, 33.3 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras tritikāle	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. hordei</i>), pelēkais sniega pelējums (<i>Thyphula graminea</i>)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras mieži	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. hordei</i>)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5	1.5-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

8. Latitude XL

Reģ. Nr. 0485, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: siltiofams, 125 g/l.

Pieskares iedarbība.

Certis Europe B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Sakņu kakla puve (<i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>tritici</i>)	2.0	līdz 10	Kodināt sēklas pirms sējas

9. Maxim 025 FS

Reģ. Nr. 0089, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fludioksonils, 25 g/l.

Pieskares iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)	2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>)	2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Zirņi*, lauka pupas*, lupīna*	Zirņu iedegas (<i>Ascochyta spp.</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0	1.5–6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Kartupeļi	Melnais kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>), sudrabotais kraupis (<i>Helmintosporium solani</i>), fuzarioze, sausā puve (<i>Fusarium spp.</i>), fomoze (<i>Phoma exigua</i>)*, paugurainais kraupis (<i>Polyscytalum pustulans</i>)*, parastais kraupis (<i>Steptomyces scabies</i>)*	0.2	2.0–5.0	Apstrādāt stādīšanai paredzētos bumbulus pavasarī pirms stādīšanas

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

10. Maxim Extra 050 FS

Reģ. Nr. 0272, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fludioksonils, 25 g/l,

difenokonazols, 25 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), pundurmelnplauka (<i>Tilletia contraversa</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>)	1.5–2.0	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas



1	2	3	4	5
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5–2.0	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	1.5–2.0	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5–2.0	1.0–7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>)	1.5–2.0	5.0–9.0	Kodināt sēklas pirms sējas

11. Maxim Star 025 FS

Reģ. Nr. 0150, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fludioksonils, 18.75 g/l,
ciprokonazols, 6.25 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago tritici</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochliobolus sativus</i>)	1.5	4.0–7.5	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago hordei</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5–2.0	4.0–7.5	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>)	2.0	4.0–7.5	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5–2.0	4.0–7.5	Kodināt sēklas pirms sējas
Lini*	Linu iedegas (<i>Colletotrichum lini</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), linu sīkplankumainība (<i>Septoria linicola</i>)	1.5	4.0–7.5	Kodināt sēklas pirms sējas

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

12. Prepper

Reģ. Nr. 0697, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fludioksonils, 25 g/l.

Pieskares iedarbība.

Globachem n.v.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	2.0	2.0-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)	2.0	2.5-6.5	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0	2.0-6.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

13. Rancona 15 ME

Reģ. Nr. 0698, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: ipkonazols, 15.1 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.

Ziemas kvieši	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	1.0	1.0-3.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	1.0	1.0-3.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. nuda</i>)	1.33	1.33-3.33	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras mieži	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. nuda</i>)	1.33	1.33-3.33	Kodināt sēklas pirms sējas

14. Redigo Pro

Reģ. Nr. 0553, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 150 g/l,

tebukonazols, 20 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Vasaras kvieši	Kviešu cietās melnplaukas (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda tritici</i>)	0.5	2.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	0.667		
Vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda hordei</i>)	0.5	2.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Cochiobolus sativus</i>)	0.667		
Vasaras tritikāle	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	0.667	2.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>)	0.5	2.0–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0.667		

1	2	3	4	5

15. Scenic Gold

Reģ. Nr. 0705, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluoksastrobīns, 150 g/l,
fluopikolīds, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i> , <i>Leptosphaeria biglobosa</i>), krustziežu neistā milttrasa (<i>Hayloperonospora</i> <i>barassicae</i>), krustziežu sauspalnkumainība (<i>Alternaria</i> <i>brassicae</i> , <i>Alternaria brassicicola</i>), dīgstu melnkaja (<i>Rhizoctonia solani</i>)	10.0	10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

16. Seedron

Reģ. Nr. 0534, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fludioksonils, 50 g/l,
tebukonazols, 10 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>) (sēklu infekcija), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia foetida</i>), putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda f.sp. tritici</i>), parastā sakņu un dīgstu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0	1.0–7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži, vasaras mieži	Sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>) (sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve (<i>Fusarium spp.</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)	1.0	1.0–7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>) (sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulata</i>)	1.0	1.0–7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Sārtais sniega pelējums (<i>Microdochium nivale</i>) (sēklu infekcija), parastā sakņu un dīgstu puve (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0	1.0–7.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Parastā sakņu un dīgstu puve (<i>Fusarium spp.</i>), auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago avenae</i>)	1.0	1.0–7.0	Kodināt sēklas pirms sējas

1	2	3	4	5

17. Vibrance Duo

Reģ. Nr. 0570, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: sedaksāns, 25 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago nuda tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), rizoktonija (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	2.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Ustilago occulta</i>)	2.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	2.0	6.0-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

18. Vibrance Pro

Reģ. Nr. 0631, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: sedaksāns, 25 g/l,
tritikonazols, 20 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, speltas kvieši	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), rizoktonija (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), rizoktonija (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras tritikāle	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas



1	2	3	4	5
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>hordei</i>), pelēkais sniega pelējums (<i>Thyphula graminea</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras mieži	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>hordei</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>avenae</i>)	1.5	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

19. Vibrance Star

Reģ. Nr. 0679, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: sedaksāns, 25 g/l,
tritikonazols, 20 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska sp. z o.o.

Ziemas kvieši, speltas kvieši	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), rizoktonija (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), rizoktonija (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras tritikāle	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago segetum</i> var. <i>hordei</i>), pelēkais sniega pelējums (<i>Thyphula graminea</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas



1	2	3	4	5
Vasaras mieži	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. nuda</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. hordei</i>)	1.5-2.0	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Auzas	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. avenae</i>)	1.5	5.5-10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

20. Vibrance Trio

Reģ. Nr. 0635, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: sedaksāns, 25 g/l,
tebukonazols, 10 g/l,
fludioksonils, 25 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), rizoktonija (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Vasaras kvieši	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), kviešu cietā melnplauka (<i>Tilletia caries</i>), kviešu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), rizoktonija (<i>Rhizoctonia spp.</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Rudzi	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), rudzu stiebru melnplauka (<i>Urocystis occulta</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas tritikāle	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5–2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
Ziemas mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. nuda</i>)	2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sārtais sniega pelējums (<i>Monographella nivalis</i>), sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. hordei</i>), pelēkais sniega pelējums (<i>Thyphula graminea</i>)	1.5–2.0		
Vasaras mieži	Miežu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. nuda</i>)	2.0	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas
	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), miežu lapu brūnsvitrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>), miežu cietā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. hordei</i>)	1.5–2.0		
Auzas	Sakņu un dīgstu puves (<i>Fusarium spp.</i>), auzu putošā melnplauka (<i>Ustilago segetum var. avenae</i>)	1.5	5.5–10.0	Kodināt sēklas pirms sējas

FUNGICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. Acrobat Plus

Reģ. Nr. 0156, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetomorfs, 90 g/kg,
mankocebs, 600 g/kg.

Pieskares un lokāla sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, vai pirms lakstu sakļaušanās vagās. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4
Sīpoli, ķiploki	Sīpolu neistā miltrasa (<i>Peronospora destructor</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai pēc brīdinājuma par sagaidāmo slimības parādīšanos līdz sīpola bumbulis sasniedzis >50 % no vēlamā izmēra un sakņu kakls ir pilnībā izveidojies (AS 46). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām	14	3

2. Adexar XE

Reģ. Nr. 0404, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 62.5 g/l,
epoksikonazols, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.33–2.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	1.33–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.33–2.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.33–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.33–2.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.33–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.33–2.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.33–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.33–2.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

3. Afrodyta 250 SC

Reģ. Nr.0674, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Pestila II Spolka z Ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

Ziemas kvieši	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.8-1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz attīstītas karo- glapas stadijai (AS 31-39)	35	1

4. Aliette

Reģ. Nr. 0650, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: alumīnija fosfīts, 800 g/kg.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Zemes stādu audzēšanai mātesaugu laukos	Sakņu puve (<i>Phytophthora fragariae</i>), sakņu kakla puve (<i>Phytophthora cactorum</i>)	– 4.0	0.2–0.3	Sakņu iemērkšana ūsī pirms stādīšanas uz 15–20 minūtēm Apsmidzināt augus 4 nedēļas pēc iestādīšanas	–	2
Zemes (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu puve (<i>Phytophthora fragariae</i>), sakņu kakla puve (<i>Phytophthora cactorum</i>)	– 4.0	0.2–0.3	Sakņu iemērkšana ūsī pirms stādīšanas uz 15–20 minūtēm Apsmidzināt stādījumu. Pirmā apstrāde 2–3 nedēļas pēc iestādīšanas, otrā apstrāde 20–30 dienas pēc pirmās apstrādes, trešā apstrāde rudenī	42	1 3
Avenes* (jaunie stādījumi, atklātā laukā)	Sakņu kakla puve (<i>Phytophthora cactorum</i>)	– 4.0	0.2–0.3	<u>1.lietošanas variants ar sakņu iemērkšanu:</u> sakņu iemērkšana ūsī pirms stādīšanas uz 15–20 minūtēm Apsmidzināt iestādītos augus joslās 4 nedēļas pēc iestādīšanas	42	2
	Sakņu kakla puve (<i>Phytophthora cactorum</i>)	4.0		<u>2.lietošanas variants bez sakņu iemērkšanas</u> Apsmidzināt iestādītos augus joslās. Pirmā apstrāde 2–3 nedēļas pēc stādīšanas, otrā apstrāde 20–30 dienas pēc pirmās apstrādes, trešā apstrāde rudenī.	42	3
Gurķi (atklātā laukā)	Gurķu neīstā milttrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	3.0–4.0		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtota apstrāde atkarībā no slimības attīstības intensitātes 8–14 dienas	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi (segtās platībās)	Gurķu neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.3–0.4	Apsmidzināt stādījumu profilaktiski iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem. Atkārtota apstrāde pie augstas slimības attīstības intensitātes 10 dienas	3	4
Salātu dēsti (izstādīšanai atklātā laukā)	Salātu neīstā miltrasa (<i>Bremia lactucae</i>)	0.3–0.7 kg/m ³		Iestrādāt substrātā pirms sējas	14	1
Salāti (atklātā laukā)	Salātu neīstā miltrasa (<i>Bremia lactucae</i>)	3.0		Apsmidzināt dēstus tieši pirms pārstādīšanas	14	4
		3.0		Apsmidzināt augus, kad tie ir iesakņojušies un ir 4–6 lapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt ar 7–14 dienu intervālu		
Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Phytium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), stublāju puves (<i>Phytophthora spp.</i>)	–	0.05–0.1	Aplaištīt augus pirms vai pēc pārstādīšanas	–	1
Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Phytium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), stublāju puves (<i>Phytophthora spp.</i>)	–	0.25–0.5	Aplaištīt, smidzinot pirms slimību iespējamās izplatības. Atkārtota apstrāde pēc 7–10 dienām.	–	2
Orhidejas	Sakņu puves (<i>Phytium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), stublāju puves (<i>Phytophthora spp.</i>)	–	0.125	Aplaištīt, smidzinot pirms slimību iespējamās izplatības. Atkārtota apstrāde pēc 7–10 dienām.	–	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

5. Altima 500 s.k.

Reģ. Nr. 0176, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

ISK Bioscience Europe N.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Frowncide 500 s.k.

Reģ. Nr. 0475, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

ISK Bioscience Europe N.V.

Ohayo 500 s.k.

Reģ. Nr. 0473, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

ISK Bioscience Europe N.V.

Širlans 500 s.k.

Reģ. Nr. 0177, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

ISK Bioscience Europe N.V.

Winby 500 s.k.

Reģ. Nr. 0474, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

ISK Bioscience Europe N.V.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījums profilaktiski pēc brīdinājuma signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem. Atkārtoti pēc 7–10 dienām atkārtībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8

1	2	3	4	5	6	7

6. Amistar 250 SC

Reģ. Nr. 0187, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

*Syngenta Polska Sp. z o.o.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Attila 250 SC**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 20, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

*ProEuro Sp. z o.o.***Mirador 250 SC**

Reģ. Nr. 0591, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
Tritikāle	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sauspilnkumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)		
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60 % ziedu (AS 60–65)	21	1
Kartupeļi	Kartupeļu lapu sauspilnkumainība (<i>Alternaria solani</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga bumbuļu aizmetņu veidošanas sākumu līdz bumbuļu sasniegumi 60–70 % no paredzamās masas (AS 40–47)	7	2

1	2	3	4	5	6	7
Zirņi (svaigam patēriņam ar/bez pakštim, graudiem) pupas (svaigam patēriņam ar/bez pakštim, graudiem)	Zirņu gaišplankumu iedegas (<i>Ascpchya pisi</i>), zirņu tumšplankumu iedegas (<i>Mycosphaerella pinodes</i>), zirņu īstā miltresa (<i>Erysiphe pisi</i>), zirņu neīstā miltresa (<i>Prerenospora vicae sp. pisi</i>), zirņu rūsa (<i>Uromyces pisi</i>)	0.8		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar pirmo ziedpumpuru parādīšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 51–69)	14	1
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi	Kāpostu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>), krustziežu neīstā miltresa (<i>Peronospora parasitica</i>), krustziežu īstā miltresa (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), krustziežu baltkreves (<i>Albugo candida</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz kultūrauga galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16–49)	14	1
Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti	Kāpostu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>), krustziežu neīstā miltresa (<i>Peronospora parasitica</i>), krustziežu īstā miltresa (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), krustziežu baltkreves (<i>Albugo candida</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz kultūraugam izveidojusies 80 % šķirnei raksturīgā lapu masa (AS 16–48)	21	1
Selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki	Seleriju lapu gaišplankumainība (<i>Septoria apiicola</i>), burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>), čemurziežu īstā miltresa (<i>Erysiphe heraclei</i>), burkānu lapu brūnplankumainība (<i>Cercosporium carotae</i>), seleriju lapu brūnplankumainība (<i>Cercospora apii</i>), seleriju rūsa (<i>Puccinia apii</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 40–49)	14	1
Selerijas (kātu)	Seleriju lapu gaišplankumainība (<i>Septoria apiicola</i>), burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>), čemurziežu īstā miltresa (<i>Erysiphe heraclei</i>), burkānu lapu brūnplankumainība (<i>Cercosporium carotae</i>), seleriju lapu brūnplankumainība (<i>Cercospora apii</i>), seleriju rūsa (<i>Puccinia apii</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga kātu veidošanas sākumu līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41–49)	14	1
Kāļi, rāceņi	Lapu sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40–49)	14	1

1	2	3	4	5	6	7
Burkāni	Burkānu lapu sausalummainība (<i>Alternaria dauci</i>), čemurziežu istā miltresa (<i>Erysiphe heraclei</i>), burkānu lapu brūnplankumainība (<i>Cercospora carotae</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40–49)	14	1
Sīpoli, ķiploki*	Sīpolu neistā miltresa (<i>Peronospora destructor</i>), lapu plankumainība (<i>Alternaria porri</i>), sīpolu kakla puves (<i>Botryotinia squamosa</i> , <i>Botrytis alli</i>), rūsas (<i>Puccinia spp.</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz 50 % lapu noliekušās (AS 16–48)	14	1
Ķirbji*, melones*, arbūzi*	Ķirbjaugu istā miltresa (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), kvēpainā miltresa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augli sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16–79)	3	1
Puravi	Sīpolu rūsa (<i>Puccinia allii</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium allii</i>), lapu plankumainība (<i>Alternaria porri</i>), puravu neistā miltresa (<i>Phytophthora porri</i>)	0.8		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga stublāja veidošanas sākumu līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41–49)	21	1
Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)	Gurķu neistā miltresa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.08	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augli sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16–79)	3	2
Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)	Ķirbjaugu istā miltresa (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), kvēpainā miltresa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), gurķu kraupis (<i>Cladosporium cucumerinum</i>), gurķu stublāju iedegas (<i>Didymella bryoniae</i>),		0.08	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augli sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16–79)		
Tomāti (segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)		0.08	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augli pilnīgi gatavi (AS 16–89)	3	2
Tomāti, paprika* (segtās platībās)	Tomātu istā miltresa (<i>Oidium lycopersici</i>), tomātu lapu brūnais pelējums (<i>Cladosporium fulvum</i>), tomātu lapu sausalummainība (<i>Alternaria solani</i>)		0.08	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augli pilnīgi gatavi (AS 16–89)		

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Salāti* (atklātā laukā)	Salātu neistā milttrasa (<i>Bremia lactucae</i>) dīgstu melnkāja (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz izveidojies kultūrauga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16–49)	14	1
Salāti* (segtās platībās)	Salātu neistā milttrasa (<i>Bremia lactucae</i>), dīgstu melnkāja (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz izveidojies kultūrauga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16–49)	14	2
Skuju koki kokaudzētavās	Skujbire (<i>Lophodermium spp.</i>)	0.8	0.1	Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām	–	2
Lapu koki kokaudzētavās	Rūsas (<i>Puccinia spp.</i>), bērzu tumšbrūnā plankumainība (<i>Marssonina betulae</i>), sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), istā milttrasa (<i>Erysiphe spp.</i>), iedegas (<i>Colletotrichum spp.</i>), lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i>)	0.8	0.1	Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām	–	2
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Rūsas (<i>Puccinia spp.</i>), sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), istā milttrasa (<i>Erysiphe spp.</i>), iedegas (<i>Colletotrichum spp.</i>), lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i>)	0.8	0.1	Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	1
Krāšņumaugi (segtās platībās)	Rūsas (<i>Puccinia spp.</i>), sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), istā milttrasa (<i>Erysiphe spp.</i>), iedegas (<i>Colletotrichum spp.</i>), lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i>)	0.8	0.1	Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām	–	2
Krizantēmas* (atklātā laukā)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	0.48 – augi līdz 50 cm; 0.72 – augi līdz 125 cm; 0.96 – augi virs 125 cm	0.1	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski	–	1
Krizantēmas* (segtās platībās)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	0.48 – augi līdz 50 cm; 0.72 – augi līdz 125 cm; 0.96 – augi virs 125 cm	0.1	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām	–	2

1	2	3	4	5	6	7
Zāliens, zāliens golfa laukumā	Fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt zālienu rudenī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādīties slimības pirmajām pazīmēm	–	1

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

7. Amistar Gold

Reģ. Nr. 0632, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistriobīns, 125 g/l
difenokonazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Vredmix

Reģ. Nr. 0711, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistriobīns, 125 g/l
difenokonazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)	21	1
Vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.75		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–61)	21	1
Cukurbietes, lopbarības bietes*, galda bietes*	Biešu lapu sīkplankumainība (<i>Cercospora beticola</i>), biešu rūsa (<i>Uromyces betae</i>), biešu miltrasa (<i>Erysiphe betae</i>), biešu lapu sarmplankumainība (<i>Ramularia beticola</i>)	0.75		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar lapotnes izveidošanās stadiju līdz sakne sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu (AS 39–49)	35	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
8. Ampera						
Reģ. Nr. 0314, reģ. klase 2.						
Darbīgās vielas: tebukonazols, 133 g/l, prohlorazs, 267 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
Nufarm GmbH & Co KG						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>),	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 59–65)		
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 61–65)	63	1

9. Ascra Xpro

Reģ. Nr. 0549, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: biksafēns, 65 g/l,
protriokonazols, 130 g/l,
fluopirams, 65 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēk- plankumainība (<i>Mycosphaerella graminicola</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Lepto- sphaeria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia strii- formis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	42	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīkl- plankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), ramulārīja (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.6–1.2		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	42	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Mycosphaerella graminicola</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Leptosphaeria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	42	1
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	42	1
Auzas	Auzu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.6–1.2		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	42	1

10. Azaka

Reģ. Nr. 0557, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Torero

Reģ. Nr. 0600, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Zoxy 250

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 29, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Synergy Generics Limited

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, ziemas rudzi, vasaras rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria barssicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)	56	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

11. Banjo Forte

Reģ. Nr. 0510, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluazinams, 200 g/l,
dimetomorfs, 200 g/l.

Pieskares un translamināra iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4

12. Bell

Reģ. Nr. 0290, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 233 g/l,
epoksikonazols, 67 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

13. Bell Super

Reģ. Nr. 0377, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 140 g/l,
epoksikonazols, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	49	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia strii- formis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attī- stībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu stiebro- šanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumai- nība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)		
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	49	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumai- nība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)		
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

14. Bolid 250 SE

Reģ. Nr. 0682, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), brūna rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0		Apsmidznāt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30-65)	35	1
Vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidznāt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)	35	1
Ziemas rapsis	Krustziežu sauspalnkumainība (<i>Alternaria brassicae</i>), peleķā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar dzelteno pumpuru stadiju līdz pāksteņu veidošanās sākumam (AS 59-71)	35	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar dzelteno pumpuru stadiju līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 59-65)		

Fungicīdi

15. Cabrio Duo

Reģ. Nr. 0508, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetomorfs, 72 g/l,
piraklostrobīns, 40 g/l.

Lokāla sistēmas un translamināra iedarbība.

SIA BASF

Sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli (atklātā laukā)	Neīstā miltrasa (<i>Peronospora destructor</i>)	2.0–2.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar 3 lapu stadiju līdz kultūraugu 50 % lapas noliekušās (AS 13–48). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām	7	3
Gurķi, kabači, cukini, patisoni (atklātā laukā)	Neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), īstā miltrasa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	2.0–2.5		Apsmidzināt kultūraugu stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 2 lapu stadijas līdz augļu nogatavošanās fāzes beigām (AS 12–89). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām	1	3

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Salāti (atklātā laukā)	Neīstā miltrasa (<i>Bremia lactucae</i>)	2.5		Apsmidzināt kultūrauga sējumus un stādījumu pēc to sadīgšanas, līdz sasniegta šķirnei raksturīgā lapu masa (AS 10–49). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām	7	3

16. Candit

Reģ. Nr. 0197, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-krezoksims, 500 g/kg.

Lokāla sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>),	0.2		Apsmidzināt, saskaņā ar kraupja ierobežošanas programmu, sākot ar kultūrauga “zaļā konusa” sākumu līdz augļu nogatavošanās sākumam (AS 07/53–81). Minimālais intervāls starp apstrādēm 7 dienas	28	3
Ābeles, bumbieres	Ābeļu miltrasa (<i>Podospaera leucotricha</i>)	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga “zaļā konusa” sākumu līdz augļu nogatavošanās sākumam (AS 07/53–81). Minimālais intervāls starp apstrādēm 7 dienas		
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa (<i>Podospaera macularis</i>)	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar lapu attīstības fāzes sākumu līdz ogu nogatavošanās beigām (AS 11–89)	7	2
Jānogas, ērķšķogas, upenes, krūmmellenes, dzērvenes	Īstās miltrasas (<i>Podospaera mors- uvae</i> , <i>Microspira spp.</i>)	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar lapu/ziedpumpuru attīstības fāzes sākumu līdz ogu krāsošanās sākumam (AS 11/51–85)	14	2
Rozes (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā miltrasa (<i>Podospaera pannosa</i>), rožu lapu tumšplankumainība (<i>Diplocarpon rosae</i>)	0.06–0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	3
Krizantēmas (atklātā laukā* un segtās platībās)	Baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	0.06–0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	3
Begonijas* (atklātā laukā un segtās platībās)	Begoniju īstā miltrasa (<i>Microspira begoniae</i>)	0.06–0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	2
Nelķes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Nelķu rūsa (<i>Uromyces dianthi</i>)	0.06–0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	2
Gerberas* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu kakla puve (<i>Phytophthora cryptogea</i>)		0.1	Apliet dēstus pēc izstādīšanas. Uz vienu augu izlietot 60 ml 0.1 % darba šķidruma	–	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ozoli*	Ozolu īstā miltrasa (<i>Microsphaera alphitoides</i>)	0.2		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	–	2
Tomāti*, paprika* (segtās platībās)	Īstā miltrasa (<i>Leveillula taurica</i>)	0.2		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	3	2

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

17. Cantus

Reģ. Nr. 0280, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: boskalīds, 500 g/kg.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rapša agrā ziedēšanas stadijā līdz pilnas ziedēšanas stadijā, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60 % ziedu (AS 63–65)	56	1

18. Cantus Gold

Reģ. Nr. 0468, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 200 g/l,
dimoksistrobīns, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no rapša ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)	42	1
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)			Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)		

1	2	3	4	5	6	7
19. Ceriax						
Reģ. Nr. 0405, reģ. klase 2.						
Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 41.6 g/l, epoksikonazols, 41.6 g/l, piraklostrobīns, 66.6 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
SIA BASF						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumai- nība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.5–3.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
		1.5 + 1.5		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumai- nība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārīja (<i>Ramularia collo-cygni</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.5–3.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
		1.5 + 1.5		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumai- nība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.5–3.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
		1.5 + 1.5		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumai- nība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.5–3.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
		1.5 + 1.5		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.5–3.0		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
		1.5 + 1.5		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

20. Champion 50 WG

Reģ. Nr. 0139, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: vara hidroksīds (kā varš), 500 g/kg.

Pieskares iedarbība.

Nufarm GmbH & Co KG

Ābeles, bumbieres	Augļu koku vēzis (<i>Nectria galligena</i>)	1.0		Apsmidzināt pavasarī miera periodā pēc zaru apgriešanas līdz zaļa konusa stadijai (AS 53) vai rudenī pēc lapu nobiršanas	–	4
Kartupeļi	Kartupeļu laktu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	2
Vīnogas*	Vīnkoku īstā miltrasa (<i>Uncinula necator</i>), neistā miltrasa (<i>Plasmopara viticola</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumu pavasarī, sākot no pumpuru plaukšanas līdz ziedēšanai. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Ķirši*, plūmes*	Kauleņkoku sauspalkumainība (<i>Stigmia carpophila</i>), kauleņkoku pelēkā puve (<i>Monilia laxa</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus agri pavasarī pirms ziedēšanas	–	1
Upenes*, jāņogas*, ērķšķogas*	Ogulāju lapu iedegas (<i>Drepanopeziza ribis</i>), lapu sīkplankumainība (<i>Mycosphaerella ribis</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus pavasarī pirms lapu plaukšanas vai rudenī pēc ražas novākšanas	–	2
Avenes*, kazenēs*	Avenāju mizas plaisāšana (<i>Didymella appianata</i>), avenāju iedegas (<i>Elsinoe veneta</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus pavasarī pirms lapu plaukšanas vai rudenī pēc ražas novākšanas	–	2
Krūmmellenes*	Bakteriālais vēzis (<i>Pseudomonas spp.</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus vēl rudenī	–	2
Krāšņumaugi segtās platībās: filodendroni*, arālijas*	Lapu plankumainības (<i>Xanthomonas spp.</i> , <i>Cercospora spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Acālijas*	Lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), sakņu puve (<i>Phytophthora spp.</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6	7
Jukas*	Lapu plankumainības (<i>Cercospora spp.</i> , <i>Septoria spp.</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Rozes* (segtās platībās un atklātā laukā)	Miltrasa (<i>Sphaerotheca spp.</i>), rožu lapu tumšplankumainība (<i>Marssonina rosae</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Neļķes* (segtās platībās un atklātā laukā)	Lapu plankumainības (<i>Alternaria spp.</i> , <i>Pseudomonas sp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Begonijas* (segtās platībās un atklātā laukā)	Bakterioze (<i>Xanthomonas sp.</i>) iedegas (<i>Glomerella cingulata</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Krizantēmas* (segtās platībās un atklātā laukā)	Lapu plankumainības (<i>Septoria sp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Lilijas*, tulpes*, gladiolas*	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Klitenes*	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Pirakantas*, segliņi*, efejas*	Bakterioze (<i>Xanthomonas sp.</i>), iedegas (<i>Glomerella cingulata</i> , <i>Colletotrichum spp.</i>), kraupis (<i>Sphaceloma spp.</i>)		0.10–0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

21. Chorus 50 WG

Reģ. Nr. 0339, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: ciprodinils, 500 g/kg.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	0.3–0.45		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no kultūr- auga peļausu stadijas (AS 55). Atkārtoti ar 7–10 dienu intervālu	7	3
Bumbieres	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	0.45		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no kultūr- auga peļausu stadijas (AS 55). Atkārtoti ar 7–10 dienu intervālu	7	3

1	2	3	4	5	6	7
Ķirši	Kaulenķoku pelēkā puve (<i>Monilinia laxa</i>)	0.45		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu (AS 60). Atkārtoti ar 7–10 dienu intervālu	7	3
Plūmes	Augļu puves (<i>Monilinia spp.</i>)	0.45		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu (AS 60). Atkārtoti ar 7–10 dienu intervālu	14	3

22. Cidely Top

Reģ. Nr. 0472, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: difenokonazols, 125 g/l,
ciflufenamīds, 15 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

Syngenta Crop Protection AG

Tomāti, paprika (segtās platībās)	Īstās miltrasas (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe lycopersici</i>), tomātu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>), tomātu lapu brūnais pelējums (<i>Fulvia fulva</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Substrātā audzētiem kultūraugiem apstrāde AS 20–89, augsnē audzētiem kultūraugiem apstrāde AS 40–89. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	3	2
Gurķi, cukini (segtās platībās)	Īstās miltrasas (<i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>), ķirbjaugu sausplankumainība (<i>Alternaria cucumerina</i>), stublāju iedegas (<i>Didymella bryoniae</i>), gurķu kraupis (<i>Cladosporium cucumerium</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Substrātā audzētiem kultūraugiem apstrāde AS 20–89, augsnē audzētiem kultūraugiem apstrāde AS 40–89. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	3	2
Zemenes (segtās platībās)	Zemeņu miltrasa (<i>Podosphaera macularis</i>), zemeņu antraknoze (<i>Colletotrichum acutatum</i>), sausplankumainība (<i>Alternaria sp.</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Substrātā audzētām zemenēm apstrāde AS 20–89, augsnē audzētām zemenēm apstrāde AS 40–89. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	3	2

1	2	3	4	5	6	7

23. Comet Pro

Reģ. Nr. 0354, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: piraklostrobīns, 200 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25–61)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga cerošanas vidus līdz ziedēšanas sākumam (AS 25–61)	35	2

24. Comrade

Reģ. Nr. 0561, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistrobīns, 200 g/l,
ciprokonazols, 80 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Sharda Europe b.v.b.a.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7

25. DARCOS

Reģ. Nr. 0438, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Rotam Agrochemical Europe Limited**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Cezix**

Reģ. Nr. 0512, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Rotam Agrochemical Europe Limited**Erasmus**

Reģ. Nr. 0513, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Rotam Agrochemical Europe Limited

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.75		Apsmidzināt sējumus rudenī, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz 8 lapu stadijai (AS 14–18)		
	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stublāja pagarināšanās beigu stadijas līdz redzama galvenā ziedkopa (AS 39–55)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stublāja pagarināšanās beigu stadijas līdz redzama galvenā ziedkopa (AS 39–55)		

1	2	3	4	5	6	7

26. Delan Pro

Reģ. Nr. 0628, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: ditianons, 125 g/l,
kālija fosfonāts, 561 g/l.

Pieskares un sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pirina</i>)	2.5		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par asku sporu izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot ar kultūrauga pumpuru plaukšanas stadiju līdz augļu nogatavošanās sākumam (AS 53–83). Atkārtoti apsmidzināt pēc 8 dienām	35	6

27. Delaro

Reģ. Nr. 0638, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: trifloksistrobīns, 150 g/l,
protriokonazols, 175 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu mltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), graudzāļu mltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
	Vārpu furazioze (<i>Fusarium spp.</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Auzas	Graudzāļu mltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		

1	2	3	4	5	6	7
28. Difcor 250 EC						
Reģ. Nr. 0580, reģ. klase 2.						
Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
Globachem n.v.						
Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	0.2		Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, sākot no sarkano pumpuru stadijas līdz augļu pilngatavībai (AS 57–89)	14	4
	Ābeļu miltresa (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0.2		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no sarkano pumpuru stadijas līdz augļu pilngatavībai (AS 57–89)		
Bumbieres	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	0.2		Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, sākot no balto pumpuru stadijas līdz augļu pilngatavībai (AS 57–89)	14	4
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sasplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 60–65)	56	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 60–65)		
Galviņkāposti*, ziedkāposti*, brokoļi*, Briseles kāposti*	Krustziežu sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), krustziežu istā miltresa (<i>Erysiphe cruciferarum</i>) kāpostu gredzenplankumainība (<i>Mycosphaerella brassiciola</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga galviņas veidošanās sākumu līdz galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 41–49)	21	2
Selerijas* (kātu)	Seleriju lapu gaišplankumainība (<i>Septoria apiicola</i>), burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>), čēmurziežu istā miltresa (<i>Erysiphe heraclei</i>) seleriju rūsa (<i>Puccinia apii</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga kātu veidošanas sākumu līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41–49)	14	2
Burkāni*, pētersīļi* (sakņu), pastinaki*, mārrutki*	Lapu sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), čēmurziežu istā miltresa (<i>Erysiphe heraclei</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 41–49)	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Selerijas* (sakņu)	Seleriju lapu baltplankumainība (<i>Septoria appicola</i>), burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>), čemurziežu īstā milt-rasa (<i>Erysiphe heraclei</i>) seleriju rūsa (<i>Puccinia apii</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41–49)	14	2
Kāļi*, rāceņi*, melnie rutki*	Lapu sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), kāpostu gredzenplankumainība (<i>Mycosphaerella brassiciola</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41–49)	14	2
Galda bietes*	Rūsa (<i>Uromyces betae</i>), biešu milt-rasa (<i>Erysiphe communis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41–49)	14	2
Cigoriņi* (sakņu)	Rūsa (<i>Puccinia hieracii</i>), īstā milt-rasa (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 41–49)	14	2
Spargēļi*	Rūsa (<i>Puccinia asparagi</i>), plankumainība (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm pēc ražas novākšanas	–	1
Puravi*	Sīpolu rūsa (<i>Puccinia allii</i>), lapu plankumainība (<i>Alternaria porri</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga stublāj veidošanas sākumu līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41–49)	21	2
Mangolds*	Lapu sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), rūsa (<i>Puccinia spp.</i>), īstā milt-rasa (<i>Leveillula taurica</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga lapojuma veidošanos līdz izveidojies šķirnei raksturīgais lapojuma lielums AS (41–49)	14	2
Rozes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā milt-rasa (<i>Spaeroteca pannosa</i>), rūsa, (<i>Phragmidium mucronatum</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumu parādotes slimības pirmajām pazīmēm	–	2
Krāšņumaugi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstās milt-rasas (<i>Erysipheales</i>), rūsas (<i>Pucciniales</i>) sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumu vai stādījumu parādotes slimības pirmajām pazīmēm.	–	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

29. Difenzone

Reģ. Nr. 0421, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Sharda Europe b.v.b.a.

Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	0.2		Apsmidzināt stādījumus, sākot no peļausu stadijas (AS 55), atkārtoti pēc 7–14 dienām	21	2

30. Dithane NT

Reģ. Nr. 0017, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mankocebs, 750 g/kg.

Pieskares iedarbība.

*Indofil Industries (Netherlands) B.V.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Avtar 75 NT**

Reģ. Nr. 0668, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mankocebs, 750 g/kg.

Pieskares iedarbība.

Indofil Industries (Netherlands) B.V.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
Sīpoli, ķiploki (atklātā laukā)	Sīpolu neīstā miltrasa (<i>Peronospora destructor</i>), rūsa (<i>Puccinia allii</i>)	2.5		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām	28	4
Puravi (atklātā laukā)	Puravu neīstā miltrasa (<i>Phytophthora porri</i>), rūsa (<i>Puccinia allii</i>)	2.5		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām	60	3
Burkāni	Burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga dīgstu stadiju. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	30	4
Ziedkāposti, brokoļi (atklātā laukā)	Neīstā miltrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	30	4
Ziemas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar graudaugu viena mezgla stadiju līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31–37). Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	60	2
Pupas, zirņi	Neīstās miltrasas (<i>Peronospora viciae</i> , <i>Phytophthora phaseoli</i>), rūsas (<i>Uromyces appendiculatus</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 50 % no pākstīm sasniegušas pilno garumu	28	1

1	2	3	4	5	6	7
Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par asku sporu izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot ar kultūrauga pumpuru piebriešanas stadiju līdz kraupja sporu izplatīšanās beigām. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	28	4
Bumbieres	Bumbieru-kadiķu rūsa* (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)	2.0		Apsmidzināt bumbieres pumpuru plaukšanas laikā un atkārtoti pēc 14 dienām līdz primārās infekcijas uzliesmojuma beigām	28	4
Plūmes, ķirši	Plūmju rūsa (<i>Tranzschelia discolor</i>), kaulenķoku sausplankumainība (<i>Stigmata carpophila</i>), vējplūmes (<i>Taphrina pruni</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, kad pirmās lapas ir pilnīgi izplaukušas. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	30	4
Vinogas	Neistā miltrasa (<i>Plasmopara viticola</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	56	4
Upenes, jānogas, ērkšķogas	Ogulāju lapu iedegas (<i>Pseudopeziza ribis</i>)	2.0		Apsmidzināt ērkšķogas ziedēšanas sākumā, upenes un jānogas pēc ziedēšanas. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām. Ja nepieciešams, apsmidzināt arī pēc ražas novākšanas	30	4
Sīpolpuķes: hiacintes, tulpes, krokusi, narcises, gladiolas, irisi, lilijas (atklātā laukā)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski, kad augi 1–2.5 cm gari. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām. Veikt divas apstrādes pēc ziedēšanas	–	4
Pelargonijas, nelķes, ģerānijas, magones u.c. krāšņumaugi (atklātā laukā)	Neistās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i>), rūsas (<i>Puccinia spp.</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām	–	4
Rozes (atklātā laukā)	Rožu lapu tumšplankumainība (<i>Diplocarpon rosae</i>), rožu rūsa (<i>Phragmidium mucronatum</i>)	2.0		Apsmidzināt parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām	–	4
Dekoratīvie kokaugi un krūmi	Neistās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i>), rūsas (<i>Puccinia spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 14 dienām	–	4
Priedes (kokaudzētavās un jaunaudzēs)	Priežu skujbire (<i>Lophodermium pinastri</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski īsi pirms slimības ierosinātāja izplatības sākuma. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības ierosinātāja izplatības intensitātes	–	4

1	2	3	4	5	6	7
Egles (kokaudzētavās un jaunaudzēs)	Egļu skujbire (<i>Lophodermium macrosporum</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski, īsi pirms slimības ierosinātāja izplatības sākuma. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības ierosinātāja izplatības intensitātes	–	4

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem

31. Duett Ultra

Reģ. Nr. 0319, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-tiofanāts, 310 g/l,
epoksikonazols, 187 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēk- plankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

32. Effector

Reģ. Nr.0134, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: ditianons, 700 g/kg.

Pieskares iedarbība.

SIA BASF

Ābeles	Augļu parastā puve (<i>Monilia fructigena</i>), augļu rūgtā puve (<i>Gleosporium spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75–85). Atkārtota apstrāde pēc 5–7 dienām	28	3
	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)			Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51–85) Atkārtota apstrāde pēc 5–7 dienām		
Bumbieres	Augļu parastā puve (<i>Monilia fructigena</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75–85). Atkārtota apstrāde pēc 5–7 dienām	28	3
	Rūsa (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)			Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar bumbieru lapu plaukšanu līdz augļizmetņu veidošanās sākumam (AS 55–72). Atkārtota apstrāde pēc 5–7 dienām		
	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)			Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu, līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51–85). Atkārtota apstrāde pēc 5–7 dienām		

1	2	3	4	5	6	7
Ķirši	Augļu parstā puve (<i>Monilia fructigena</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļu briešanas sākumu līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 75–81). Atkārtota apstrāde pēc 7–10 dienām	21	3
	Ķiršu lapbire (<i>Blumeriella jaapii</i>)			Apsmidzināt stādījumus slimības attīstību veicinošos apstākļos, pirms ziedēšanas līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 59–81) vai pēc ražas novākšanas		
	Ķiršu kraupis (<i>Venturia cerasi</i>)			Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas parādīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 51–81). Atkārtota apstrāde pēc 7–10 dienām		
	Kauleņkoku sausplankumainība (<i>Clasterosporium carpophilum</i>)			Apsmidzināt stādījumus pavasarī sākoties ziedēšanai (AS 60–64) un atkārtoti rudenī		
Plūmes*	Plūmju rūsa (<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumu, sākoties augļaižmetņu nobīršanai un atkārtoti pēc mēneša vai parādīties slimības pirmajām pazīmēm līdz augļu gatavošanās sākumam (AS 72–81)	21	3
	Kauleņkoku sausplankumainība (<i>Clasterosporium carpophilum</i>)			Apsmidzināt stādījumus pavasarī, sākoties ziedēšanai (AS 60–64) un atkārtoti rudenī		
Upenes*, jānogas*, ērkšķogas*	Rūsa (<i>Cronartium ribicola</i>), lapu plankumainība (<i>Drepanopeziza ribis</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādīties slimību pirmajām pazīmēm pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	–	3
Avenes*	Avenāju mizas plaisāšana (<i>Dydymella applanata</i>), dzinumu iedegas (<i>Sphaceloma necator</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījums, parādīties slimības pirmajām pazīmēm pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas	–	3

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

33. Efilor

Reģ. Nr. 0372, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 133 g/l,
metkonazols, 60 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu stublāju puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 7 lapu stadijas līdz rapša pilnas ziedēšanas stadijai, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 17–65)	42	1
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 7 lapu stadijas līdz rapša pilnas ziedēšanas stadijai, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 17–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.7–1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no agras ziedēšanas stadijas līdz rapša ziedēšanas fāzes vidum, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 63–65)		

34. Elatus Era

Reģ. Nr. 0552, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: benzovindiflupirs, 75 g/l,
protiokonazols, 150 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	42	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 40–59)	42	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	42	1
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	42	1

35. Elatus Plus

Reģ. Nr. 0574, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: benzovindiflupirs, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.375–0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31–69)	35	1
Vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.375–0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41–69)	35	1
Ziemas mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.375–0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 31–59)	35	1
Vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.375–0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz vārpošanas beigām (AS 41–59)	35	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.375–0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31–69)	35	1
Vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.375–0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41–69)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.375–0.750		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31–69)	35	1

36. Elektis 75 d.g.

Reģ. Nr. 0179, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: zoksamīds, 83 g/kg,
mankocebs, 667 g/kg.

Lokāla sistēmas iedarbība.

Gowan Crop Protection Limited

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	1.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma signāla par lakstu puves parādīšanos vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8

1	2	3	4	5	6	7

37. Epox Extra

Reģ. Nr. 0402, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 50 g/l,
folpets, 375 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	42	2

1	2	3	4	5	6	7

38. Epox Top

Reģ. Nr. 0389, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 40 g/l,
fenpropidīns, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēk- plankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tīkl- plankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēk- plankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS 29–59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7

39. Falcon Forte

Reģ. Nr. 0343, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 53 g/l,
spiroksamīns, 224 g/l,
tebukonazols, 148 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu plēkšņu pelēkplankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

40. Fleksiti s.k.

Reģ. Nr. 0265, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metrafenons, 300 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30–65)	35	2

41. Folicur

Reģ. Nr. 0057, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5		Apsmidzināt rudenī, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas	56	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis	Krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>), krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.0		Apsmidzināt pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm līdz ziedēšanas sākumam (AS 60)		
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rapša pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga 4 lapu stadiju līdz ziedēšanas sākumam (AS 14–60)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga 4 lapu stadiju līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rapša pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

42. Gemino

Reģ. Nr. 0490, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 45 g/l,
tebukonazols, 150 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no divu mezglu stadijas līdz ziedēšanas beigām (AS 32–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no divu mezglu stadijas līdz ziedēšanas beigām (AS 32–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

43. Globaztar 250 SC

Reģ. Nr.0626, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: azoksistrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Globachem n.v.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
		0.5+0.5			35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
		0.5+0.5			35	2
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
		0.5+0.5			35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
		0.5+0.5			35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1

44. Imtrex XE

Reģ. Nr. 0406, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluksapiroksāds, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādies slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

45.1. Infinito

Reģ. Nr. 0302, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: propamokarbs, 523.8 g/l (propamokarba hidrochlorīds, 626 g/l),
fluopikolīds, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.2–1.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–12 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi (atklātā laukā)	Gurķu neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumu parādīšanos līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21–89). Atkārtoti pēc 10 dienām	3	3
Gurķi (segtās platībās)	Gurķu neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.14	Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumu parādīšanos līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21–89). Atkārtoti pēc 10 dienām	1	3
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi	Krustziežu neīstā miltrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga trešo īsto lapu līdz kāpostu galviņa sasniesi šķirnei raksturīgo izmēru, formu un stingrību (AS 13–49). Atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	3
Sīpoli	Sīpolu neīstā miltrasa (<i>Peronospora destructor</i>)	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar loku kakliņa pāresnīšanās stadiju līdz, kad 10 % lapas ir atliekušas (AS 41–47). Atkārtoti pēc 14–21 dienas	7	3
Puravi	Puravu neīstā miltrasa (<i>Phytophthora porri</i>)	1.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar lapu pamatnes uzbriešanu un pagarināšanos līdz stadijai, kad stublājs sasniedz 70 % no plānotā garuma un diametra (AS 41–47). Atkārtoti pēc 14–21 dienas	14	2

45.2. Infinito

Reģ. Nr. 0302, reģ. klase 3., iepakojumiem 0.5 l un mazākiem.

Darbīgās vielas: propamokarbs, 523.8 g/l (propamokarba hidrohlorīds, 626 g/l),
fluopikolīds, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, ml/100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc. %	Apstrādes laiks, norādījumi, iezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	12–16		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–12 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4
Gurķi (atklātā laukā)	Gurķu neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	16		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumu parādīšanos līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21–89). Atkārtoti pēc 10 dienām	3	3

1	2	3	4	5	6	7
Gurķi (segtās platībās)	Gurķu neīstā miltresa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		0.14	Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga sānu dzinumu parādīšanos līdz visi augļi pilnīgi gatavi (AS 21–89). Atkārtoti pēc 10 dienām	1	3
Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi	Krustziežu neīstā miltresa (<i>Peronospora parasitica</i>)	16		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga trešo īsto lapu līdz kāpostu galviņa sasniedzusi šķirnei raksturīgo izmēru, formu un stingrību (AS 13–49). Atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	3
Sīpoli	Sīpolu neīstā miltresa (<i>Peronospora destructor</i>)	16		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar loku kakliņa pārsnāšanās stadiju līdz, kad 10 % lapas ir atliekušas (AS 41–47). Atkārtoti pēc 14–21 dienas	7	3
Puravi	Puravu neīstā miltresa (<i>Phytophthora porri</i>)	16		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar lapu pamatnes uzbriešanu un pagarināšanos līdz stadijai, kad stublājs sasniedzis 70 % no plānotā garuma un diametra (AS 41–47). Atkārtoti pēc 14–21 dienas	14	2

1	2	3	4	5	6	7
46. Input						
Reģ. Nr. 0266, reģ. klase 2.						
Darbīgās vielas: protiokonazols, 160 g/l, spiroksamīns, 300 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
Bayer AG						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora</i> <i>herpotrichoides</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainī- ba (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59–61)		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainī- ba (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainī- ba (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		

47. Input Triple

Reģ. Nr. 0651, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: prokvinazīds, 40 g/l,
protiokonazols, 160 g/l,
spiroksamīna, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, spelta kvieši	Stiebru lūšana (<i>Oculi- macula yallundae</i>)	0.75		Apsmidzināt sējumus pro- filaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebro- šanas sākumu līdz divu mez- glu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Kviešu lapu pelēkplan- kumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Pu- ccinia recondita</i>), grau- dzāļu miltresa (<i>Blume- ria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplanku- mainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)			Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)		

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Oculi- macula yallundae</i>)	0.75		Apsmidzināt sējumus pro- filaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebro- šanas sākumu līdz divu mez- glu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Miežu lapu tīklplan- kumainība (<i>Pyrenop- hora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium seca- lis</i>), pundurrūsa (<i>Pucci- nia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)			Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Oculi- macula yallundae</i>)	0.75		Apsmidzināt sējumus pro- filaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebro- šanas sākumu līdz divu mez- glu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Kviešu lapu pelēkplan- kumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Pyre- nophora tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhync- hospodium secalis</i>)			Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)		
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Oculi- macula yallundae</i>)	0.75		Apsmidzināt sējumus pro- filaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebro- šanas sākumu līdz divu mez- glu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium seca- lis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)			Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirma- jām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpa piebrie- šanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)		

1	2	3	4	5	6	7

48. Juventus 90

Reģ. Nr. 0221, reģ. klase 2.
 Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
 Sistēmas iedarbība.
SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:**Artina EC**

Reģ. Nr. 0653, reģ. klase 2.
 Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
 Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Plexeo 90

Reģ. Nr 0677, reģ. klase 2.
 Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
 Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Turret 90

Reģ. Nr 0677, reģ. klase 2.
 Darbīgā viela: metkonazols, 90 g/l.
 Sistēmas iedarbība.
Globachem n.v.

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	1
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšana sākumam (AS 14–60)	56	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad 50–60 % ziedu atvērušies (AS 63–65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās fāzes sākuma līdz ziedēšana sākumam (AS 21–60)	56	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.7		Apsmidzināt sējumus profilaktiski kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad 50–60 % ziedu atvērušies (AS 63–65)		

1	2	3	4	5	6	7

49. Kantik

Reģ. Nr. 0495, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fenpropidīns, 150 g/l,
tebukonazols, 100 g/l,
prohlorazs, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	42	1
	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30–61)		
	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30–61)		
	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30–61)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30–61)	42	1
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30–61)	42	1

1	2	3	4	5	6	7

50. Leander

Reģ. Nr. 0397, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fenpropidīns, 750 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	2

51. Leimay SC

Reģ. Nr. 0346, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: amisulbroms, 200 g/l.

Pieskares iedarbība.

Nissan Chemical Europe S.A.S

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4

1	2	3	4	5	6	7

52. Librax

Reģ. Nr. 0481, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 62.5 g/l,
metkonazols, 45 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.33		<u>1. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40–60)	35	1
		1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0		<u>3. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	1.33		<u>1. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40–60)	35	1
		1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0		<u>3. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Kviešu lapu pelēk-plankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.33		<u>1. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40–60)	35	1
		1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0		<u>3. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)	35	1
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēk-plankumainība (<i>Septoria tritici</i>)	1.33		<u>1. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40–60)	35	1
		1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0		<u>3. lietošanas panēmiens</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)	35	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Auzu lapu brūn-plankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	1.33		<u>1. lietošanas paņēmieni</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40–60)	35	1
		1.0 + 1.0		<u>2. lietošanas paņēmieni</u> Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69). Atkārtoti pēc 14 dienām	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	2.0		<u>3. lietošanas paņēmieni</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)	35	1

53. Manfil 75 WG

Reģ. Nr. 0425, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mankocebs, 75 %.

Pieskares iedarbība.

Indofil Industries Limited

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.13		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
Tomāti (atklātā laukā)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.13		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	3	5
Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	3.2		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par asku sporu izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot ar kultūrauga pumpuru piebriešanas stadiju līdz kraupja sporu izplatīšanās beigām	35	1
Vinogas	Vinogu neistā milttrasa (<i>Plasmopara viticola</i>)	2.13		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti apsmidzināt pēc 21 dienas	63	2

1	2	3	4	5	6	7

54. Manfil 80 WP

Reģ. Nr. 0426, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mankocebs, 80 %.

Pieskares iedarbība.

Indofil Industries Limited

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8
Tomāti (atklātā laukā)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	3	5
Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	3.0		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par asku sporu izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot ar kultūrauga pumpuru piebriešanas stadiju līdz kraupja sporu izplatīšanās beigām	35	1
Vinogas	Vinogu neistā miltresa (<i>Plasmopara viticola</i>)	2.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti apsmidzināt pēc 21 dienas	63	2

55. Maracas

Reģ. Nr. 0484, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 50 g/l,
prohlorazs, 225 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainī- ba (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)	42	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	42	1
Rudzi	Stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)	42	1
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)	42	1

56. Maredo 125 SC

Reģ. Nr. 0373, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: epoksikonazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzel- tenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu planku- mainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplanku- mainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu divu mezglu stadijas līdz ziedēšanas vidum (AS 32–65)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–65)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), plankumainības (<i>Septoria spp.</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stieb- rošanas sākuma līdz ziedē- šanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Cukurbietes	Biešu sarm- plankumainība (<i>Ramularia betae</i>), biešu lapu sīkplankumainība (<i>Cercospora beticola</i>), biešu miltrasa (<i>Erysiphe betae</i>), biešu rūsa (<i>Uromycae betae</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm.	28	2
Galda bietes		0.5–0.75				

1	2	3	4	5	6	7

57. Merpan 80 WG

Reģ. Nr. 0499, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: kaptāns, 800 g/kg.

Pieskares iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	1.8–2.25	0.12–0.15	Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51–85)	28	3 Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 7.0 kg/ha
	Augļu puves (<i>Gleosporium spp.</i> , <i>Botrytis fuckeliana</i>)	1.8	0.15	Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļa briešanas sākumu līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75–85)		
	Augļu koku vēzis (<i>Nectria galigena</i>)	2.5	0.25	Apsmidzināt augļu kokus rudenī, lapu nobīršanas laikā	–	
Tulpes*	(<i>Penicilium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Phytium spp.</i>)	–	0.88	Mērcēt sīpolus darba šķīdumā pirms stādīšanas, līdz 15 minūtēm	–	1
Tulpes* (uzziedināšanai)	(<i>Penicilium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Phytium spp.</i>)	–	0.33	Mērcēt sīpolus darba šķīdumā pirms stādīšanas, līdz 3 minūtēm	–	1
Gladiolas*	(<i>Penicilium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Phytium spp.</i>)	–	0.66	Mērcēt sīpolus darba šķīdumā pirms stādīšanas, līdz 30 minūtēm	–	1
Galdiolas* (<i>Gladiolas nanus</i> , <i>G.colvilii</i>)	(<i>Penicilium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Phytium spp.</i>)	–	1.3	Mērcēt sīpolus darba šķīdumā pirms stādīšanas, līdz 15 minūtēm	–	1
Lilijas*	(<i>Penicilium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Phytium spp.</i>)	–	0.66	Mērcēt sīpolus darba šķīdumā pirms stādīšanas, līdz 15 minūtēm	–	1
Narcises*, hiacintes*, īrisi*, krokusi*	(<i>Penicilium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Phytium spp.</i>)	–	0.66	Mērcēt sīpolus darba šķīdumā pirms stādīšanas, līdz 15 minūtēm	–	1
Narcises* (uzziedināšanai), hiacintes* (uzziedināšanai), īrisi* (uzziedināšanai), krokusi* (uzziedināšanai)	(<i>Penicilium spp.</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> , <i>Phytium spp.</i>)	–	0.66	Mērcēt sīpolus darba šķīdumā pirms stādīšanas, līdz 3 minūtēm	–	1
Apses*, kļavas*, rododendri* (stādaudzētavās atklātā laukā)	Rododendru biezlapainība (<i>Exobasidium vaccinii</i> , <i>E.rhododendri</i> , <i>E.vaccinii</i> var. <i>japonicum</i>), apšu zaru nokalšana (<i>Venturia macularis</i>), kļavu lapu plankumainība (<i>Venturia sp.</i>)	1.5	0.15	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajam pazīmēm	–	3

1	2	3	4	5	6	7
Apses*, kļavas*, rododendri* (stādaudzētavās segtās platībās)	Rododendru biezlapainība (<i>Exobasidium vaccinii</i> , <i>E.rhododendri</i> , <i>E.vaccinii</i> var. <i>japonicum</i>), apšu zaru nokalšana (<i>Venturia macularis</i>), kļavu lapu plankumainība (<i>Venturia sp.</i>)	2.0	0.15–0.2	Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	–	3

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

58. Mirador Forte

Reģ. Nr. 0558, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistriobīns, 60 g/l,
tebukonazols, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria barssicae</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)	56	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

59. Mirador Xtra

Reģ. Nr. 0219, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistriobīns, 200 g/l
ciprokonazols, 80 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.**Analogue augu aizsardzības līdzekļi:****Zakeo Xtra**

Reģ. Nr. 0654, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: azoksistriobīns, 200 g/l,
ciprokonazols, 80 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.75–1.0		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
		0.5+0.5		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Rudzi	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)	35	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobīršanai (AS 65)		

60.1. Mirage

Reģ. Nr. 0130, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prochlorazs, 450 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotricoides</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz 2 mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēk- plankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tīkl- plankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpo- šanas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotricoides</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz 2 mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēk- plankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)		
Auzas	Auzu pelēk- plankumainība (<i>Septoria avenae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30–49)	35	1

60.2. Mirage

Reģ. Nr. 0130, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prochlorazs, 450 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva ml/100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidī- šanas laiks, dienās	Maksi- mālais apstrāžu skaits sezonā
Sēnes* (segtās platības)	Sausā puve (<i>Verticillium</i> spp.), tīklveida pelējums (<i>Dactylium</i> spp.).	100		Apstrādāt substrātu pēc kultūrauga micēlija iejaukšanas substrātā īsi pirms auglķermeņu veidošanās	10	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
61. Mystic						
Reģ. Nr. 0362, reģ. klase 2.						
Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
Nufarm GmbH & Co KG						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Drechslera teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), melnais sodrējums (<i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 30–61)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59–61)		
Rudzi, tritikāle	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Leptosphaeria maculans</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)	56	3
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, rapša ziedēšanas fāzes vidū, kad sāk nobirt ziedlapiņas (AS 65)		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Leptosphaeria maculans</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)	56	2
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, rapša ziedēšanas fāzes vidū, kad sāk nobirt ziedlapiņas (AS 65)		

62. Mystic 250 EW

Reģ. Nr. 0696, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69)		
Ziemas tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>),	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga četrū lapu stadijas līdz astoņu lapu stadijai (AS 14-18)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>),	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 64-65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	56	1
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 64-65)		

63. Nando 500 SC

Reģ. Nr. 0427, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluazinams, 500 g/l.

Pieskares iedarbība.

Nufarm GmbH & Co KG

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma signāla vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	1	8

1	2	3	4	5	6	7

64. Opera N

Reģ. Nr. 0281, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: piraklostrobīns, 85.0 g/l,
epoksikonazols, 62.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas fāzes beigām (AS 30–59)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas fāzes beigām (AS 30–59)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas fāzes beigām (AS 30–59)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas fāzes beigām (AS 30–59)	35	2
Kukurūza	Kukurūzas lapu plankumainība (<i>Helmintosporium turcicum</i>), fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.2		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kukurūzas divu mezglu stadijas līdz skaras veidošanās sākumam (AS 32–51)	51	1

1	2	3	4	5	6	7

65. Opus

Reģ. Nr. 0190, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: epoksikonazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumai- nība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

66. Opus EC

Reģ. Nr. 0367, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: epoksikonazols, 83 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	38	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu brūnsvītrainība (<i>Pyrenophora graminea</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	38	2
Tritikāle	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	38	2
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

67. Orius 250 EW

Reģ. Nr. 0267, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Nufarm GmbH & Co KG**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Syrius**

Reģ. Nr. 0522, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 60–65)		
Rudzi	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>) stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30–69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69)		
Auzas	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30–65)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas	56	1
	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, līdz ziedēšanas sākumam (AS 60)		
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, līdz ziedēšanas beigām (AS 69)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14–60)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas beigām (AS 14–69)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		

68. Orvego

Reģ. Nr. 0368, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: ametoktradīns, 300 g/l,
dimetomorfs, 225 g/l.

Lokāla sistēmas un pieskares iedarbība.

SLA BASF

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.8		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5–10 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	2

1	2	3	4	5	6	7

69. Osiris

Reģ. Nr. 0351, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 37.5 g/l,
metkonazols, 27.5 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30–59)	35	1
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1
Rudzi	Stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	2.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	1

70. Osiris Star

Reģ. Nr. 0456, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 56.25 g/l,
metkonazols, 41.25 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēk- plankumainība (<i>Septoria tritici</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.33		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīkl- plankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo- cygni</i>)	1.33		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 40–59)	35	1
Tritikāle	Kviešu lapu pelēk- plankumainība (<i>Septoria tritici</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzelten- plankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.33		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	1
Rudzi	Stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.33		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	1

71. Penncozeb 75 DG

Reģ. Nr. 0273, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 kg un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: mankocebs, 75 %.

Pieskares iedarbība.

UPL Europe Ltd

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:**Tridex DG**

Reģ. Nr. 0547, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mankocebs, 75 %.

Pieskares iedarbība.

UPL Europe Ltd

Trimanoc DG

Reģ. Nr. 0669, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mankocebs, 75%.

Pieskares iedarbība.

UPL Europe Ltd

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lakstu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības intensitātes	7	8

1	2	3	4	5	6	7

72. Penncozeb 80 WP

Reģ. Nr. 0180, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 kg un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: mankocebs, 80 %.

Pieskares iedarbība.

UPL Europe Ltd

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	8

73. Pictor Active

Reģ. Nr. 0642, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 150 g/l,
piraklostrobīns, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.6-1.0		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	42	1
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)			Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.5+0.5		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus profilaktiski dalītā apstrādē slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)	42	2
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)			Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Ziemas rapsis*, vasaras rapsis*, sinepes*, eļļas rutks*, kaņepes*, lini*	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), sausā puve (<i>Phoma spp.</i>), neistā miltrasa (<i>Hyaloperonospora parasitica</i>)	0.6-1.0		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)	42	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*, sinepes*, eļļas rutks*, kaņepes*, lini*	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), sausplankumainības (<i>Alternaria spp.</i>), sausā puve (<i>Phoma spp.</i>), neīstā miltresa (<i>Hyaloperonospora parasitica</i>)	0.5+0.5		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopas veidošanās fāzes sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)	42	2
Lauka pupas* (graudiem)	Pupu brūnplankumainība (<i>Botrytis fabae</i>), pupu rūsa (<i>Uromyces vicia-fabae</i>), pupu koncentriskā plankumainība (<i>Ascochyta fabae</i>)	0.6-1.0		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)	42	1
		0.5+0.5		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)	42	2
Zirņi* (graudiem)	Zirņu gaišplankumu iedegas (<i>Ascochyta pisi</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), zirņu rūsa (<i>Uromyces pisi</i>), zirņu neīstā miltresa (<i>Peronospora viciae</i>)	0.6-1.0		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)	42	1
		0.5+0.5		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga pirmo ziedpumpuru parādīšanos līdz 50% pākstu sasniegušas šķirnei raksturīgo garumu (AS 51-75)	42	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

74. Previcur Energy

Reģ. Nr. 0224, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l, reģ. klase 3.

Darbīgās vielas: propamokarbs, 530 g/l,
fosetils, 310 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Galviņkāposti, ziedkāposti, lapu kāposti (dēsti segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	3 ml/m ²	0.15	<u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	6 ml/m ²	0.3	<u>vai Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	1



1	2	3	4	5	6	7
Tomāti, gurķi segtās platībās (audzējot augsnē)	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	3 ml/m ²	0.15	<u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	1.apstrāde: 0.1 ml/m ² ; 2.apstrāde: 0.3 ml/m ²		<u>un Lieto pilienu sistēmā</u> Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10–15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 1000–3000 l/ha	3	2
Tomāti, gurķi segtās platībās (audzējot akmens vatē)	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	3 ml/m ²	0.15	<u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	1.apstrāde: 0.1 ml/m ² ; 2.–4.apstrāde: 0.1–0.3 ml/m ²		<u>un Lieto pilienu sistēmā</u> Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10–15 dienas. Trešo apstrādi veic, kad augi sāk ražot. Pēdējā apstrāde pēc 7 dienām. Darba šķidruma patēriņš 1000–3000 l/ha	3	4
Pipari segtās platībās (audzējot augsnē)	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	1.apstrāde 6 ml/m ² 2.apstrāde 3 ml/m ²	0.3 0.15	<u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	1.apstrāde: 0.1 ml/m ² ; 2.apstrāde: 0.3 ml/m ² ;		<u>un Lieto pilienu sistēmā</u> Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10–15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 1000–3000 l/ha	3	2
Pipari segtās platībās (audzējot akmens vatē)	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	1.apstrāde 6 ml/m ² 2.apstrāde 3 ml/m ²	0.3 0.15	<u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	0.1–0.3 ml/m ²		<u>un Lieto pilienu sistēmā</u> Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10–15 dienas. Trešo apstrādi veic, kad augi sāk ražot. Pēdējā apstrāde pēc 7 dienām. Darba šķidruma patēriņš 1000–3000 l/ha	3	4
Salāti segtās platībās	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i>)	3 ml/m ²	0.15	<u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Salātu neistā miltrasa (<i>Bremia lactucae</i>)	2.5 l/ha		<u>un Smidzinot pa augu lapām</u> Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz pilnīgai lapu masas izaugšanai (AS 12–49); intervāls starp apstrādēm 15 dienas. Ūdens patēriņš 400–1000 l/ha	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Redīsi segtās platībās	Krustziežu neīstā milttrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	2.5 l/ha		<u>Smidzinot pa augu lapām</u> Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz pilnīgai saknes izaugšanai (AS 12–49); intervāls starp apstrādēm 7–10 dienas. Ūdens patēriņš 500–1000 l/ha	14	2
Krāšņumaugi segtās platībās	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	3 ml/m ²	0.15	<u>1. lietošanas veids.</u> <u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
Krāšņumaugi segtās platībās	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	3 ml/m ²	0.15	<u>2. lietošanas veids.</u> <u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	0.3 ml/m ²		<u>un Lieto pilienu sistēmā</u> Apstrādi sākt pēc dēstu pārstādīšanas, intervāls 10–15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 1000–3000 l/ha	–	2
Krāšņumaugi segtās platībās	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	3 ml/m ²	0.15	<u>3. lietošanas veids.</u> <u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Neīstās milttrāsas (<i>Peronospora spp.</i>)	2.5 l/ha		<u>un Smidzinot pa augu lapām</u> Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz pilnai ziedēšanai (AS 12–65); intervāls 15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 400–1000 l/ha	–	2
Krāšņumaugi atklātā laukā	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	3 ml/m ²		<u>1. lietojuma veids.</u> <u>Lieto pilienu sistēmā</u> Apstrādi sāc pēc dēstu pārstādīšanas; intervāls 10–15 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 1000–3000 l/ha	–	2

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi atklātā laukā	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	3 ml/m ²	0.15	<u>2. lietojuma veids.</u> <u>Lieto laistīšanas sistēmā</u> Apstrāde pēc sējas līdz kultūraugu sadīgšanai; intervāls 7–10 dienas. Darba šķidruma patēriņš: 2 l/m ² (20000 l/ha)	–	2
	Neīstās miltrasas (<i>Peronospora spp.</i>)	2.5 l/ha		<u>un Smidzinot pa augu lapām</u> Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz pilnai ziedēšanai (AS 12–65); intervāls 15 dienas. Darba šķidruma patēriņš 400–1000 l/ha	–	2
Gurķi atklātā laukā	Gurķu neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2.5 l/ha		<u>Smidzinot pa augu lapām.</u> Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar augu 2 lapu attīstību līdz augļu nogatavošanās fāzes vidum (AS 12–85); intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Ūdens patēriņš: 600 l/ha	3	2

75. Priaxor

Reģ. Nr. 0514, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluksapiroksāds, 75 g/l,
piraklostrobīns, 150 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	0.75–1.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pir- majām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	1
		0.75 + 0.75		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainī- ba (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.75–1.5		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pir- majām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	1
		0.75 + 0.75		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsā (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.75–1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	1
		0.75 + 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>)	0.75–1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	1
		0.75 + 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0.75–1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)	35	1
		0.75 + 0.75		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69). Minimālais intervāls starp apstrādēm 21 diena	35	2

76. Prolectus

Reģ. Nr. 0458, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fenpirizamīns, 500 g/kg.

Pieskares iedarbība.

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S

Tomāti, baklažāni, paprika, gurķi, kabači, cukini (segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.2	0.08–0.12	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma, kad atvērušies 10 % ziedi līdz, kad 70 % augļu ir šķirnei tipiskā krāsa (AS 61–87). Atkārtoti pēc 10–14 dienām	1	3
Zemenes (segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.2	0.08–0.12	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma, kad atvērušies 10 % ziedi līdz, kad lielākā daļa ogu nogatavojušās (AS 61–87). Atkārtoti pēc 7–14 dienām	1	3

1	2	3	4	5	6	7

77. Proline

Reģ. Nr. 0637, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG
Analogie augu aizsardzības līdzekļi:
Curbatur

Reģ. Nr. 0655, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: protiokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, spelta kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)			Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu mitrāsa (<i>Blumeria graminis</i>)			Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsā (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	1
	Brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)			Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)		
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 61–65)		

78. Property 180 SC

Reģ. Nr. 0567, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: piriofenons, 180 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

ISK Biosciences Europe N.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, rudzi, speltas kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus pavasārī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai slimības attīstības sākumā, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 30–65)	35	2
Vasaras mieži, ziemas mieži, auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.5		Apsmidzināt sējumus pavasārī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai slimības attīstības sākumā, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas sākumam (AS 30–50)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

79. Propulse

Reģ. Nr. 0416, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluopirams, 125 g/l,
protiokonazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum (AS 63–65)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria barssicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar rapša ziedpumpuru attīstības fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 57–69)		
	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar rapša ziedpumpuru attīstības fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 57–69)		
Kukurūza	Kukurūzas lapu plankumainības (<i>Setosphaeria turcica</i> , <i>Helminthosporium carbonum</i>), kukurūzas acsveida plankumainība (<i>Kabatiella zaeae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar 3 mezglu stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 33–69)	30	2
Lauka pupas* graudiem	Pupu brūnplankumainība (<i>Botrytis fabae</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), pupu koncentriskā plankumainība (<i>Didymella fabae</i>), pupu rūsa (<i>Uromyces vicia-fabae</i>), sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Zirņi* graudiem	Zirņu gaišplankumu iedegas (<i>Didymella pisi</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), zirņu rūsa (<i>Uromyces pisi</i>), sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
80. Prosaro						
Reģ. Nr. 0276, reģ. klase 2.						
Darbīgās vielas: protiokonazols, 125 g/l,						
tebukonazols, 125 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
Bayer AG						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzeltenplan- kumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzen- plankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Tritikāle	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), labību tumšbrūnā plankumainība (<i>Bipolaris sorokiniana</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Monographella nivalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59–61)		
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz graudaugu ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–60)	56	2
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 13–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65)		
Pupas graudiem* (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)	Pupu koncentriskā plankumainība (<i>Ascochyta fabae</i>) pupu rūsa (<i>Uromyces fabae</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopu veidošanos līdz ziedēšanas beigām (AS 50–69). Intervāls starp apstrādēm 14 dienas	35	2
Zirņi graudiem*	Zirņu gaišplankumu iedegas (<i>Ascochyta pisi</i>), zirņu rūsas (<i>Uromyces pisi</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedkopu veidošanos līdz ziedēšanas beigām (AS 50–69). Intervāls starp apstrādēm 14 dienas	35	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

81. Ranman Top

Reģ. Nr. 0355, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: ciazofamīds, 160 g/l.

Pieskares iedarbība.

ISK Biosciences Europe S.A.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms slimības pazīmju parādīšanās, pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	6

82.1.Revus 250 SC

Reģ. Nr. 0312, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mandipropamīds, 250 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves parādīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos. Atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	6
Tomāti (atklātā laukā un segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	4
Salāti (atklātā laukā)	Salātu neīstās miltrasas (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)	0.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7–10 dienām	7	2
Salāti* (segtais platībās)	Salātu neīstās miltrasas (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora parasitica</i>)	0.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos	7	1
Gurķi*, kabači*, cukini*, patisoni*, ķirbji* (segtais platībās)	Neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0.6		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

82.2. Revus 250 SC

Reģ. Nr. 0312, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: mandipropamīds, 250 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:**Emin dārzam Revus 250 SC**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 26, reģ. klase 3.
Darbīgā viela: mandipropamīds, 250 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
SIA "Emin dārzam"

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva ml /10 l	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	12		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves parādīšanos vai slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos. Atkārtoti pēc 7–10 dienām. 10 litri darba šķidruma jāizsmidzina uz ne mazāk kā 200 m ²	3	3
Tomāti (segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7–10 dienām. 10 litri darba šķidruma jāizsmidzina uz ne mazāk kā 100 m ²	3	3
Tomāti (atklātā laukā)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	12		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, atkārtoti pēc 7–10 dienām. 10 litri darba šķidruma jāizsmidzina uz ne mazāk kā 200 m ²	3	3
Gurķi*, kabači*, cukīni*, patisoni*, ķirbji* (segtās platībās)	Neīstā miltrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	6		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7–10 dienām. 10 litri darba šķidruma jāizsmidzina uz ne mazāk kā 100 m ²	3	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

83. Revus Top

Reģ. Nr. 0453, reģ. klase 2. klase.
Darbīgās vielas: mandipropamīds, 250 g/l,
difenokonazols, 250 g/l.
Lokāla sistēmas iedarbība.
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria alternata</i>)	0.6		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	3	3

1	2	3	4	5	6	7

84. Revystar XL

Reģ. Nr. 0707, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: mefentrifukonazols, 100 g/l,
fluksapiroksāds, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7

85. Revytrex

Reģ. Nr. 0708, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: mefentrifukonazols, 66.7 g/l,
fluksapiroksāds, 66.7 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzenplanlumaainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	2
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
Auzas	Auzu lapu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0.75-1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1

1	2	3	4	5	6	7

86. Ridomil Gold MZ 68 WG

Reģ. Nr. 0185, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: mankocebs, 64 %,
metalaksils-M, 4 %.

Sistēmas un pieskares iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	2.5		Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, vai īsi pirms lakstu sakļaušanās rindās. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	2
Tomāti (atklātā laukā un segtās platībās)	Tomātu augļu brūnā puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	3	2
Gurķi (segtais platībās)	Neistā milttrasa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2.5		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	7	2
Sīpoli	Neistā milttrasa (<i>Peronospora parasitica</i>)	2.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām. Lokus pārtikai nelietot	28	2
Krašņumaugi: rozes, lefkojas	Neistās milttrāsas (<i>Peronospora sparsa</i> , <i>Peronospora mathiolae</i>)	2.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2

87. Riza 200 EC

Reģ. Nr. 0507, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz graudu veidošanās sākumam (AS 30–71)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainī- ba (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainī- ba (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sāndzinumu veidošanos līdz ziedēšanas beigām (AS 21–69)	56	2
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga ziedēšanu līdz pirmo ziedlapiņu nobīršanas sākumam (AS 60–65)		

1	2	3	4	5	6	7

88. Riza 250 EW

Reģ. Nr. 0352, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu dzelten- plankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), melnaiss sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 29–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61–69)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), melnaiss sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 29–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61–69)		
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), melnaiss sodrējums (<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 29–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 29–60)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 29–60)	35	2
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc prognozes, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)	56	2
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc prognozes, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, rapša ziedēšanas fāzes vidū, kad sāk nobirt ziedlapiņas (AS 65)		
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>), krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc prognozes, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, vai parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rapša 4 lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)	56	3
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc prognozes, kad slimību attīstībai labvēlīgi apstākļi, rapša ziedēšanas fāzes vidū, kad sāk nobirt ziedlapiņas (AS 65)		

1	2	3	4	5	6	7

89. RUBRIC

Reģ. Nr. 0430, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: epoksikonazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Cheminova A/S

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici- repentis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 29–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 29–65)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 29–69)	35	2
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 29–69)	35	2
Auzas	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no cerošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas vidum (AS 29–65)	35	2
Cukurbietes, lopbarības bietes	Biešu miltrasa (<i>Erysiphe betae</i>), biešu rūsa (<i>Uromyces betae</i>), biešu sarmplankumainība (<i>Ramularia betae</i>), biešu lapu sīkplankumainība (<i>Cercopora beticola</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm un kad vairāk kā 90 % augi rindās ir sakļāvušies (AS 39–49)	28	2

1	2	3	4	5	6	7

90. Scab 80 WG

Reģ. Nr. 0582, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: kaptāns, 800 g/kg.

Pieskares iedarbība.

Sharda Europe b.v.b.a.

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	1.88		Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos, slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51–85)	21	4

91.1.Score 250 EC

Reģ. Nr. 0001, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

*Syngenta Polska Sp. z o.o.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Mavita 250 EC**

Reģ. Nr. 0576, reģ. klase 2,

Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	0.2		Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61–84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām	21	2
Bumbieres	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	0.2		Apsmidzināt profilaktiski kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61–84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām	21	2
	Bumbieru-kadiķu rūsa (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)*	0.2		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos lapu plaukšanas laikā		
Ķirši	Kaulenkoku pelēkā puve (<i>Monilinia laxa</i>), parastā augļu puve (<i>Monolinia fructigena</i>)	0.2		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar atsevišķu ziedpumpuru atdalīšanos, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 56–85), atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	2
Plūmes	Parastā augļu puve (<i>Monolinia fructigena</i>)	0.2		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma, līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 61–85), atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	2
Burkāni*	Burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 14 dienām	21	3

1	2	3	4	5	6	7
Selerijas (sakņu)*	Seleriju lapu gaišplankumainība (<i>Septoria apiicola.</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimību pirmajām pazīmēm	21	1
Sipoli, ķiploki, šalotes*	Sīpolu lapu plankumainība (<i>Alternaria porri</i>), sīpolu rūsa (<i>Puccinia alli</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimību pirmajām pazīmēm	21	1
Galda bietes*	Lapu plankumainības (<i>Cercospora beticola</i> , <i>Ramularia beticola</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimību pirmajām pazīmēm	28	1
Krizantēmas* (atklātā laukā)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski		1
Krizantēmas* (segtās platībās)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	0.4 – augi līdz 50 cm, 0.6 – augi līdz 125 cm augsti		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām		2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

91.2.Score 250 EC

Reģ. Nr. 0001, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Emin dārzam Score 250 EC

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 33, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: difenokonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA "Emin dārzam"

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva ml /10 l ūdens	Ar 10 l darba šķidrumu apstrādājamā platība, m ²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>)	2	100	Apsmidzināt profilaktiski, kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61–84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām	21	2
Bumbieres	Bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	2	100	Apsmidzināt profilaktiski, kraupja sporu lidošanas laikā vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot no ziedēšanas sākuma līdz augļu veidošanās stadijai (AS 61–84). Atkārtoti apsmidzināt pēc 10 dienām	21	2
	Bumbieru-kadiķu rūsa (<i>Gymnosporangium fuscum</i>) *			Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos lapu plaukšanas laikā		



1	2	3	4	5	6	7
Kirši	Kauleņkoku pelēkā puve (<i>Monilinia laxa</i>), parastā augļu puve (<i>Monolinia fructigena</i>)	2	100	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar atsevišķu ziedpumpuru atdalīšanos līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 56–85), atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	2
Plūmes	Parastā augļu puve (<i>Monolinia fructigena</i>)	2	100	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļu krāsojums (AS 61–85), atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	2
Burkāni*	Burkānu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>)	10	250	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Atkārtoti pēc 14 dienām	21	3
Selerijas (sakņu)*	Seleriju lapu gaišplankumainība (<i>Septoria apiicola</i> .)	10	250	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	21	1
Sīpoli*, ķiploki*, šalotes*	Sīpolu lapu plankumainība (<i>Alternaria porri</i>), sīpolu rūsa (<i>Puccinia alli</i>)	10	250	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	21	1
Galda bietes*	Lapu plankumainības (<i>Cercospora beticola</i> , <i>Ramularia beticola</i>)	10	250	Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimību pirmajām pazīmēm	28	1
Krizantēmas* (atklātā laukā)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	10	250	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski		1
Krizantēmas* (segtās platībās)	Krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	10 – augi līdz 50 cm, 15 – augi līdz 125 cm augsti	250	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām		2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbība sīomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

92. Signum

Reģ. Nr. 0269, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalids, 26.7 %,
piraklostrobīns, 6.7 %.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Kartupeļi	Kartupeļu lapu sausplankumainība (<i>Alternaria solani</i>)	0.25		Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7–14 dienām	3	4
Galviņkāposti, Briseles kāposti	Kāpostu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicicola</i> , <i>Alternaria brassicae</i>), krustziežu lapu baltplankumainība (<i>Pseudocercospora capsellae</i>), krustziežu baltkreves (<i>Albugo candida</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pēc 3–4 nedēļām	21	2



1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli	Puves (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis allii</i> , <i>Fusarium oxysporum</i>), sīpolu baltā puve (<i>Sclerotinia cepivorum</i>), melnais sodrējums (<i>Alternaria porri</i> , <i>Cladosporium allii-cepae</i>)	1.5		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, pirmo reizi 6 nedēļas pirms ražas novākšanas, atkārtoti pēc 5–10 dienām	14	2
Burkāni	Čemurziežu melnā puve (<i>Alternaria radicina</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.75		Apsmidzināt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pēc 2 nedēļām	14	2
Zirņi	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), zirņu gaišplankumu iedegas (<i>Ascochyta pisi</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski ziedēšanas sākumā vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti apsmidzināt pākstu veidošanās sākumā	14	2
Plūmes, ķirši	Kaulenķoku pelēkā puve (<i>Monilinia laxa</i>), augļu parastā puve (<i>Monilinia fructigena</i>), rūgtā puve (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), ķiršu lapbire (<i>Blumeriella jaapii</i>)	0.75–1.00		Apsmidzināt stādījumus ziedēšanas sākumā un atkārtoti apsmidzināt pēc 5–10 dienām	–	2
Zemenes	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), zemeņu milttrasa (<i>Sphaerotheca macularis</i>), zemeņu lapu baltplankumainība (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	1.8		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā, atkārtoti pēc 10–14 dienām	3	2
Dzērvenes	Vertikālo dzinumu galu atmiršana (<i>Phomopsis vaccinii</i>), ogu puves (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Botryosphaeria vaccinii</i>)	0.5–1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtoti apsmidzināt pēc 10–14 dienām	–	2
Krūmmellenes	Lapu un dzinumu bojājumi (<i>Phomopsis vaccinii</i> , <i>Botryosphaeria spp.</i>), dzinumu vēzis (<i>Gloeosporium minus</i>), ogu puve (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtoti apsmidzināt ziedēšanas beigās	–	2
Pupas*graudiem (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)	Pupu koncentriskā plankumainība (<i>Ascochyta fabae</i>) un pupu rūsas (<i>Uromyces fabae</i>), pupu brūnplankumainības (<i>Botrytis fabae</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedpumpuru veidošanos līdz ziedēšanas beigām (AS 50–69). Atkārtoti pēc 10–14 dienām	21	2
Ķiploki*	Puves (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis allii</i> , <i>Fusarium oxysporum</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia cepivorum</i>)	1.5		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, pirmo reizi 6 nedēļas pirms ražas novākšanas, atkārtoti pēc 5–10 dienām	14	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
93. Siltra Xpro Reģ. Nr. 0479, reģ. klase 2. Darbīgās vielas: biksafēns, 60 g/l, protiokonazols, 200 g/l. Sistēmas iedarbība. Bayer AG						
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Mycosphaerella graminicola</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Leptosphaeria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sakumam (AS 40–61)	35	2
Tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Mycosphaerella graminicola</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Leptosphaeria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 59–69)		
Auzas	Auzu brūnplankumainība (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 40–61).	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu vārpošanas fāzes beigām līdz ziedēšanas fāzes sākumam (AS 59–61)		

94. Swing Gold

Reģ. Nr. 0356, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: epoksikonazols, 50 g/l,
dimoksistrobīns, 133 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām līdz ziedēšanas beigām (AS 49–69)	35	1
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		

1	2	3	4	5	6	7

95. Switch 62.5 WG

Reģ. Nr. 0244, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: ciprodinils, 375 g/kg,
fludioksonils, 250 g/kg.

Sistēmas un pieskares iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o. o.

Tomāti (segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 7–14 dienām	3	3
Gurķi (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	3
Zemenes (atklātā laukā)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), zemeņu antraknoze (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtota apstrāde nepieciešama, ja ir labvēlīgi apstākļi slimības attīstībai. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	7	3
Zemenes (segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), zemeņu antraknoze (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtota apstrāde nepieciešama, ja ir labvēlīgi apstākļi slimības attīstībai. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	7	3
Avenes, kazenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), aveņu mizas plaisāšana (<i>Didymella applanata</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski ziedēšanas sākumā. Atkārtota apstrāde nepieciešama, ja ir labvēlīgi apstākļi slimības attīstībai. Intervāls starp apstrādēm 10 dienas	7	3
Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	3
Skuju koki*, lapu koki*, dekoratīvie krūmi* (kokaudzētavās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), plankumainības (<i>Cylindrocladium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	2
Baklažāni* (segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 7–14 dienām	3	3
Paprika* (segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	3	3
Kabači*, cukini* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	3
Ķirbji*, melones* (atklātā laukā)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), stublāju iedegas (<i>Didymella bryoniae</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 7–10 dienām	3	3



1	2	3	4	5	6	7
Salāti*, endīvijās* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.6		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10 dienām	7	3
Burkāni*, sakņu pētersīļi*, melnsakne*, pastinaki*, galda bietes*, mārrutki* (atklātā laukā)	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), lapu plakumainība (<i>Alternaria dauci</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmām pazīmēm. Atkārtoti pēc 12 dienām	14	3
Selerijas* (sakņu) (atklātā laukā)	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmām pazīmēm. Atkārtoti pēc 12 dienām	14	2
Sīpoli*, šalotes*, ķiploki* (atklātā laukā)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), kakla puve (<i>Botrytis squamosa</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 14 dienām	14	3
Zirņi*, pupas*, pupiņas* (svaigi, ar un bez pākstīm)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	14	3
Zirņi*, pupas*, pupiņas* (graudi)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1.0		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos. Atkārtoti pēc 10 dienām	28	2
Zāliens* (golfa laukumā)	Sārtais sniega pelējums (<i>Fusarium nivale</i>), pelēkais sniega pelējums (<i>Typhula incarnata</i>), sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt zālienu profilaktiski rudenī (oktobrī–novembrī) vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Atkārtoti pēc 10–14 dienām	–	3

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

96. Syllit 544 SC

Reģ. Nr. 0477, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dodīns, 544 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia pyrina</i>)	1.25		Apsmidzināt profilaktiski, iestājoties labvēlīgiem apstākļiem slimības attīstībai vai 24–48 stundu laikā pēc iespējamās inficēšanās, sākot ar lapu pumpuru briešanas sākumu līdz augli sasnieguši 70 % no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 01–77). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	60	2
Ķirši	Ķiršu lapbire (<i>Blumeriella jaapii</i>)	1.25		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz augļu attīstības fāzes beigām (AS 60–79) un/vai pēc ražas novākšanas. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	14	2

1	2	3	4	5	6	7

97. Talius

Reģ. Nr. 0535, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prokvinazīds, 200 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

DuPont Danmark ApS

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, rudzi	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.125– 0.250		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.125		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpo- šanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25–49)	35	2
		0.250		2. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpo- šanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 25–49)	35	1

98. Tango Flex

Reģ. Nr. 0359, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metrafenons, 100 g/l,
epoksikonazols, 83 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici- repentis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādīties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7
Tritikāle	Graudzāļu milt-rasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsā (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsā (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu milt-rasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Auzas	Auzu vainagrūsā (<i>Puccinia coronata</i>), graudzāļu milt-rasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.75–1.5		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

99. Tebusha 25 EW

Reģ. Nr. 0432, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Sharda Europe b.v.b.a.**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Dominic**

Reģ. Nr. 0538, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Sharda Europe b.v.b.a.**Tebuplius**

Reģ. Nr. 0539, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tebukonazols, 250 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Sharda Europe b.v.b.a.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), brūnā rūsā (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu milt-rasa (<i>Blumeria graminis</i>), vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsā (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu milt-rasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2

1	2	3	4	5	6	7

100. Tilmor

Reģ. Nr. 0353, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: protiokonazols, 80 g/l,
tebukonazols, 160 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus rudeni, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas (AS 14)	56	2
		1.0		Apsmidzināt sējumus pavasārī atkārtoti, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša stublāja veidošanas fāzes beigām līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 39–55)		
	Krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14–60)		
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus rapša ziedēšanas sākumā – pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 62–65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedpumpuru attīstības fāzes vidum (AS 14–55)	56	2
	Krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14–60)		
	Krustziežu sausplankumainība (<i>Alternaria brassicae</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no rapša četru lapu stadijas līdz ziedlapiņu nobiršanas sākumam (AS 14–65)		
	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0		Apsmidzināt sējumus rapša ziedēšanas sākumā – pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 62–65)		

1	2	3	4	5	6	7
101. Topas 100 EC						
Reģ. Nr. 0009, reģ. klase 2.						
Darbīgā viela: penkonazols, 100 g/l.						
Sistēmas iedarbība.						
<i>Syngenta Polska Sp. z o.o.</i>						
Gurķi (atklātā laukā)	Īstā miltresa (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 8 dienām	3	2
Gurķi, cukini, melones (segtās platībās)	Īstā miltresa (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 8 dienām	3	2
Tomāti, paprika (segtās platībās)	Īstā miltresa (<i>Leveillula taurica</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10 dienām	3	2
Ābeles	Ābeļu miltresa (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	14	1
Bumbieres	Ābeļu miltresa (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	14	1
	Bumbieru-kadiķu rūsa (<i>Gymnosporangium fuscum</i>)*	0.5		Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, pumpuru plaukšanas laikā		
Upenes, ērkšķogas	Ērkšķogu Amerikas miltresa (<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>)	0.5		Apsmidzināt stādījumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7 dienām vai, ja nepieciešams, pēc ražas novākšanas	20	2
	Ogulāju stabīnrūsa (<i>Cronartium ribicola</i>)*, ogu krūmu kausīnrūsa (<i>Puccinia rebesii-caricis</i>)*	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7 dienām		
Vīnogas	Īstā miltresa (<i>Uncinula necator</i>)	0.3		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 8 dienām	28	3
Zemenes (atklātā laukā)	Zemeņu miltresa (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	3	1
Zemenes (segtās platībās)	Zemeņu miltresa (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 10 dienām	3	2
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Īstās miltresas (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca pannosa</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Uncinula necator</i>), rūsas (<i>Puccinia spp.</i>), lapu plankumainības (<i>Marssonina panattoniana</i> , <i>Guignardia spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	–	1
Krāšņumaugi (segtās platībās)	Īstās miltresas (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca pannosa</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Uncinula necator</i>), rūsas (<i>Puccinia spp.</i> , <i>Uromyces dianthi</i>), lapu plankumainības (<i>Marssonina panattoniana</i> , <i>Guignardia spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādotes slimības pirmajām pazīmēm	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Jānogas*	Ogulāju stabiņrūsa (<i>Cronartium ribicola</i>), ogu krūmu kausiņrūsa (<i>Puccinia rebesii-caricis</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 7 dienām	20	2
Ķirši*	Ķiršu lapbire (<i>Blumeriella jaapii</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm pēc ražas novākšanas	–	1
Lapu koki kokaudzētavās*	Īstās miltrasas (<i>Uncinula bicornis</i> , <i>Microsphaera alphitoides</i>), rūsas (<i>Melampsora populnea</i> , <i>Melampsoridium betulinum</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	1
Dekoratīvie kokaugi*	Īstās miltrasas (<i>Uncinula bicornis</i> , <i>Microsphaera alphioides</i> , <i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	1
Ķirbji, cukini, melones, arbūzi* (atklātā laukā)	Īstā miltrasa (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, atkārtoti pēc 8 dienām	3	2
Krizantēmas* (atklātā laukā un segtās platībās)	Krizantēmu rūsa (<i>Puccinia tanacetii</i>), krizantēmu baltā rūsa (<i>Puccinia horiana</i>)	0.5		Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

102. Toprex 375 SC

Reģ. Nr. 0400, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: difenokonazols, 250 g/l,
paklobutrazols, 125 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve (<i>Phoma lingam</i>), krustziežu sausplan- kumainība (<i>Alternaria brassicae</i>), krustziežu gaišplankumainība (<i>Pyrenopeziza brassicae</i>)	0.3		Apsmidzināt sējumus rudenī rapša četru lapu līdz sešu lapu stadijā (AS 14–16)	–	1
		0.5		Apsmidzināt sējumus pava- sarī, sākot no pirmā starp- mezglu posma attīstības līdz stadijai, kad starp lapām redzami ziedpumpuri (AS 31–50)	100	1

1	2	3	4	5	6	7

103. Variano Xpro

Reģ. Nr. 0455, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: biksafēns, 40 g/l,
fluoksastrobīns, 50 g/l,
protiokonazols, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Fungicīdi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Mycosphaerella graminicola</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Leptosphaeria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61)	35	2
Ziemas mieži, vasaras mieži	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no vārpošanas beigām līdz ziedēšanas sākumam (AS 59–61)		
Tritikāle	Graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Mycosphaerella graminicola</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Leptosphaeria nodorum</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), graudzāļu milttrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69)	35	2
	Vārpu fuzarioze (<i>Fusarium spp.</i>)	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69)		

104. Viverda

Reģ. Nr. 0384, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: boskalīds, 140 g/l,
piraklostrobīns, 60 g/l,
epoksikonazols, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	49	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām (AS 25–69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	35	2
	Graudzāļu milttrasa (<i>Erysiphe graminis</i>), miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)		

1	2	3	4	5	6	7
Rudzi	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no graudaugu cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)	49	2
	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)		
Auzas	Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>), auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)	1.25–2.5		Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām (AS 25–59)	35	2

105. Zorvec Enicade

Reģ. Nr. 0673, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: oksatiapirolīns, 100 g/l.

Lokāla sistēmas iedarbība.

SIA BASF

Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.15		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes	7	4

HERBICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. 2.4-D Nufarm

Reg. Nr. 0095, reg. klase 2.

Darbīgā viela: 2.4-D, 600 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6–1.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz divu mezglu stadijai (AS 32)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6–1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32)	–	1
Ļāvu lapsaste*, bezakotu lāčauza*, kamolzāle* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29)	–	1
Augstā dižauza* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2–4 lapu stadijā (AS 12–14)	–	1
Timotiņš* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2–3 lapu stadijā (AS 12–13)	–	1
Ļāvas skarene* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus kultūrauga 1–2 lapu stadijā (AS 11–12)	–	1
Ļāvas auzene* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29)	–	1
Ļāvas auzene, kas pasēta zem miežiem	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29)	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

2. Accurate 200 WG

Reg. Nr. 0342, reg. klase 2.

Darbīgā viela: metil-metsulfurons, 200 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.01		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29)	–	1
		0.02		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)		

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.01–0.02		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32)	–	1
Lini*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz 30 cm augstumam vai pirms ziedpumpuri kļūst redzami, atkarībā no tā, kas notiek agrāk	–	1
Ceļa malas*, mežmalas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvediem*	Latvāņi	0.03		Apsmidzina: <u>1. lietošanas veids</u> Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, latvāņiem dīgstot, dīgļlapu veidošanas stadijā <u>2. lietošanas veids</u> Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad lielāko pārziemojušo latvāņu rozešu diametrs – 20 cm <u>3. lietošanas veids</u> Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to rozetes ir diametrā ap 20–25 cm <u>4. lietošanas veids</u> Latvāņu centrālo dzinumu tā ziedēšanas laikā, kamēr vēl nav izveidojušas sēkla <u>5. lietošanas veids</u> Atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Kontakts 100 ml uz 200 l ūdens uz ha	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

3. Agil 100 EC

Reģ. Nr. 0003, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: propakvizafops, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Zetrola

Reģ. Nr. 0578, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: propakvizafops, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ADAMA Registrations B.V.

Ābeles, bumbieres, kartupeļi, burkāni, sīpoli, ķiploki, brokoļi, galviņkāposti	Labības – sārņaugi	0.5–0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	30	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5–1.0				
	Parastā rudzus- milga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0–1.5				
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia re- pens</i>), daudzga- dīgā airene (<i>Lo- lium perenne</i>)	1.0–1.5				
Zemenes, avenas, ērķšķogas, upenes, jānogas	Labības – sārņaugi	0.5–0.75		Apsmidzināt kultūraugu stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	35	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5–1.0				
	Parastā rudzus- milga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0–1.5				
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia re- pens</i>), daudzga- dīgā airene (<i>Lo- lium perenne</i>)	1.0–1.5				

1	2	3	4	5	6	7
Sinepes (sēklai), lini, ziemas rapsis, vasaras rapsis	Labības – sārņaugi	0.5–0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām.	90	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5–1.0				
	Parastā rudzus- milga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0–1.5				
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia re- pens</i>), daudzga- dīgā airene (<i>Lo- lium perenne</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4–6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Zirņi (svaigam patēriņam), zirņi (graudiem), pupas (graudiem), āboliņš (sēklai), sarkanā auzene (sēklai)	Labības – sārņaugi	0.5–0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	45	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5–1.0				
	Parastā rudzus- milga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0–1.5				
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia re- pens</i>), daudzga- dīgā airene (<i>Lo- lium perenne</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4–6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Labības – sārņaugi	0.5–0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	60	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5–1.0				
	Parastā rudzus- milga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0–1.5				
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia repens</i>) daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>),	1.0–1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4–6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Divdīgļlapju krāšņumaugi, divdīgļlapju krāšņumaugu stādi stādaudzētavās	Labība – sārņaugi	0.5–0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	–	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5–1.0				
	Parastā rudzus- milga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0–1.5				
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia re- pens</i>), daudzga- dīgā airene (<i>Lo- lium perenne</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4–6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
Ķīmenes* (sējas gadā)	Labības – sārņaugi	0.5–0.75		Apsmidzināt ķīmenes sējas gadā, pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	–	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5–1.0				
	Parastā rudzus- milga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0–1.5				
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia re- pens</i>), daudzga- dīgā airene (<i>Lo- lium perenne</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt ķīmeņu sējumu sējas gadā, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4–6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Meža kultūru stādi, augļu koku un ogulāju stādi stādaudzētavās	Labības – sārņaugi	0.5–0.75		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus pa sadīgušām nezālēm, sākot ar nezāļu 3 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām	–	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.5–1.0				
	Parastā rudzuskailga (<i>Apera spica-venti</i>)	1.0–1.5				
	Ložņu vārpata (<i>Elytrigia repens</i>), daudzgadīgā airene (<i>Lolium perenne</i>)	1.0–1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4–6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām		

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

4. Agroksons 75 š.k.

Reģ. Nr. 0048, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju un vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3–2.0		Apsmidzināt sējumus, ziemājos – atjaunojoties veģetācijai, vasarājos – kad graudaugiem 3–4 lapas, līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad graudaugiem 3–4 lapas (āboliņam 1–2 lapas), līdz stiebrošanai	–	1
Vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tūruma usne, tūruma mīkstpiene	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mīkstpienei izveidojusies lapu rozete (spēcīgākie augi 15–25 cm augsti), līdz graudaugu stiebrošanai	–	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8–1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad lini 3–8 cm gari	–	1
Āboliņš	Divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1–2 īstās lapas	–	1
Ganības un pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt laukus pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	20	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu dīgšanas, kad stiebrzāles ir attīstījušas 3–4 lapas	–	1

5. Ariane S

Reģ. Nr. 0188, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: fluroksipirs, 40 g/l,

klopīralīds, 20 g/l,

MCPA, 200 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, ziemas tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)	-	1
Stiebrzāles (sēklai)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)	-	1



1	2	3	4	5	6	7
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	2.0-2.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)	28	1

6. Arrat

Reģ. Nr. 0249, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tritosulfurons, 250 g/kg,
dikamba, 500 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

SIA BASF

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu cerošanas fāzes beigām (AS 29). Darba šķidrumam ieteicams pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.15–0.20		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu trīs lapu stadijas līdz cerošanas fāzes vidum (AS 13–25). Darba šķidrumam ieteicams pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot no kukurūzas trīs lapu stadijas līdz piecu lapu stadijai (AS 13–15). Darba šķidrumam ieteicams pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

7. Attribut

Reģ. Nr. 0191, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: Na-propoksikarbazons, 700 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi	Viendiġļlapju un īsmūža divdiġļlapju nezāles	0.06–0.10		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32)	–	1
Vasaras kvieši	Viendiġļlapju un īsmūža divdiġļlapju nezāles	0.06		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz divu mezglu stadijai (AS 13–32)	–	1

8. Avoxa

Reģ. Nr. 0525, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: pinoksadēns, 33.3 g/l,
piroksulams, 8.33 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža viendiġļlapju un īsmūža divdiġļlapju nezāles	1.35–1.80		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga diviem sāndzinumiem līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 22–32)	–	1
Vasaras kvieši	Īsmūža viendiġļlapju un īsmūža divdiġļlapju nezāles	1.35–1.80		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga diviem sāndzinumiem līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 22–32)	–	1

1	2	3	4	5	6	7

9. Axial 50 EC

Reģ. Nr. 0304, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pinoksadēns, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas mieži	Parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>)	0.8–0.9 (rudnī) 0.8–1.0 (pavasārī)		Apsmidzināt sējumus rudnī vai pavasārī, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), nezāļu pirmās lapas stadijā līdz divu mezglu stadijai	–	1
	Vējauza (<i>Avena fatua</i>)	0.6–0.9		Apsmidzināt sējumus pavasarī, līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39), nezāļu pirmās lapas stadijā līdz attīstītas karoglapas stadijai		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Vējauza (<i>Avena fatua</i>)	0.6–0.9		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas, līdz attī- stītas karoglapas stadijai (AS 12–39), nezāļu pirmās lapas stadijā līdz attīstītas karoglapas stadijai	–	1
	Parastā rudzusmilga (<i>Apera spica-venti</i>), parastā gaiļšāre (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), nezāļu pirmās lapas stadijā līdz divu mezglu stadijai		

10. Banvel 4S

Reģ. Nr. 0038, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dikamba, 480 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumu pavasarī, atsākoties veģetācijai, graudaugu cerošanas fāzē (AS 21–29)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15–0.2		Apsmidzināt sējumus graudaugu cerošanas fāzē (AS 21–29)	–	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.3–0.6		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3 līdz 8 lapu stadijā (AS 13–18)	–	1
Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, dzelzceļi	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt platības nezāļu aktīvas augšanas laikā	–	1
Zālāji, ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.3–1.0		Apsmidzināt platības pavasarī, īsmūža nezāļu 2–4 lapu stadijā, daudzgadīgajām nezālēm, kad rozetes diametrs 5 cm	14	1

1	2	3	4	5	6	7

11. Barbarian Biograde 360 š.k.

Reģ. Nr. 0299, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:**Barbarian Super 360**

Reģ. Nr. 0503, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Clinic Up

Reģ. Nr. 0554, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Nufarm GmbH & Co KG

Gallup Super 360

Reģ. Nr. 0502, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Landmaster 360 TF

Reģ. Nr. 0640, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Albaugh TKI d.o.o.

Monosate G

Reģ. Nr. 0527, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Rosate 360 TF

Reģ. Nr. 0639, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Albaugh TKI d.o.o.

Varvar

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 35, reģ. klase 2.
Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.
Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.
Synergy Generics Limited

Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, eļļas līni, sinepes, zirņi graudiem, lauka pupas, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sipoli, puravi pirms sadīgšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietajiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas	–	1
Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt sējumus pirms ražas novākšanas, pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapsis, eļļas līni pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās, un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Zirņi (graudiem), lauka pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	1.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm, un divdīgļlapju nezālēm ir divas istās lapas	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas		

1	2	3	4	5	6	7
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas	–	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	–	1
Koku jaunaudzes, pēc ierīkošanas mežā	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus	–	1
	Divdīgļlapju kokaugi – sārņaugi, ērgļpapardes	3.0		Apsmidzināt kokaugus – sārņaugus no jūnija līdz augustam pēc jauno dzinumu nobriešanas un pirms lapu novecošanas. Ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanās, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
	Virši	4.0–6.0		Apsmidzināt viršus augusta beigās līdz septembra beigām, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
Celmu apstrāde	Lapu koku celmi		10	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāgēšanu ar speciālu zāga sliedi no novembra līdz martam. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	–	1
Celmu apstrāde	Skuju koku celmi		20	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāgēšanu ar speciālu zāga sliedi no novembra līdz martam	–	1
Koku retināšana mežā, injicējot stumbrā	Lapu koki, skuju koki	2 ml vienā cirtiena reizē		Injicējot koku stumbrā, apstrādāt jebkurā laika periodā, izņemot sulu tecēšanas laikā no marta līdz maijam. Kokiem ar diametru virs 10 cm tiek veikti 2 līdz 3 cirtieni atkarībā no koka lieluma un injicēti 2 ml katrā reizē	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Nevietā augoši koki un krūmi	4.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām, mauriņiem, krāšņumaugiem vai apstādījumiem	–	1

1	2	3	4	5	6	7

12. Barbarian Hi-Aktiv š.k.

Reģ. Nr. 0289, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 490 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

*Barclay Chemicals (R&D) Ltd.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Vagta**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 36, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 490 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

Synergy Generics Limited

Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši, rapsis, eļļas lini, sinepes, zirņi graudiem, lauka pupas, cukurbietes, kāļi, rāceņi, sīpoli, puravi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.1		Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas	–	1
Kvieši, mieži, auzas, cietie kvieši	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–2.9		Apsmidzināt sējumus pirms plaušanas pilngatavības stadijā, kad graudu mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapsis, eļļas lini	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–2.9		Apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Zirņi (graudiem), lauka pupas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–2.9		Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.1		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm un divdīgļlapju nezālēm divas īstās lapas	–	1
Tirumi pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–2.9		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir vismaz 6 lapas	–	1
Zālāji	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.2–4.4		Apsmidzināt zālāju pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.1–4.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas un līdz nezāļu ziedēšanas sākumam	–	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.7		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai rudenī pēc lapu nobiršanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem	–	1
Mežā, pirms koku jaunaudzēs ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.7		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Mežā, pēc koku jaunaudzes ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.9		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus	–	1
	Divdīgļlapju kokaugi – sārņaugi, ērgļpapardes	2.2		Apsmidzināt kokaugus–sārņaugus no jūnija līdz augustam pēc jauno dzinumu nobriešanas un pirms lapu novecošanas, ērgļpapardes apsmidzināt pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanas, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
	Virši	2.9–4.4		Apsmidzināt viršus augusta beigās līdz septembra beigām, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus		
Celmu apstrāde	Lapu koku celmi		7.5	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam. Nelietot sulu cirkulācijas laikā	–	1
Celmu apstrāde	Skuju koku celmi		15	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam	–	1
Koku retināšana mežā, injicējot stumbrā	Lapu koki, skuju koki	1.5 ml vienā cirtiena reizē		Injicējot koku stumbrā, apstrādāt jebkurā laika periodā, izņemot sulu tecēšanas laikā no marta līdz maijam. Kokiem ar diametru virs 10 cm tiek veikti 2 līdz 3 cirtieni atkarībā no koka lieluma un injicēti 1.5 ml katrā reizē	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.9–4.4		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām, mauriņiem, krāšņmaugiem vai apstādījumiem	–	1

13. Barca 334 SL

Reģ. Nr. 0560, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: klopīralīds, 267 g/l,
piklorams, 67 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Pestila II Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ziemas rapsis	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.25–0.35		Apsmidzināt sējumus pavasarī, pēc veģetācijas atjaunošanās, sākot no kultūrauga rozetes izveidošanās, līdz ir labi saskatāms pirmais stublāja posms (AS 19–31)	–	1
Vasaras rapsis	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.25–0.35		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga rozetes izveidošanās, līdz ir labi saskatāms pirmais stublāja posms (AS 19–31)	–	1

14. Basagran 480

Reģ. Nr. 0024, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: bentazons, 480 g/l.

Selektīvs, pieskares iedarbība.

SIA BASF

Graudaugi ar āboliņa, lucernas vai daudzgadīgo stiebrzāļu pasēju	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12–29). Tauriņziežiem un stiebrzālēm jābūt ar 3 lapām, vai arī pasēju veic pēc sējumu apsmidzināšanas	–	1



1	2	3	4	5	6	7
Zirņi, zirņu un graudaugu mistri	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	2.5–4.0		Apsmidzināt sējumus zirņu 3–6 lapu stadijā (3–8 cm augsti)	40	1
Dārza pupas, dārza pupiņas	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	1.5 + 1.5 vai 2.0 + 1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar pupu pirmo īsto lapu stadiju līdz 3 īsto lapu stadijai (līdz 15 cm augstas): <u>1. lietošanas variants</u> Dalītā apstrādē pirmo apstrādi veikt nezāļu diġļlapu stadijā līdz divām īstajām lapām, atkārtoti pēc jaunu nezāļu diġšanas pēc 7–10 dienām	49	2
		3.0		<u>2. lietošanas variants</u> Vienā paņēmienā apstrādi veikt, ja nezāles sasniegušas 4–6 lapu stadiju		1
Lauka pupas	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	1.5 + 1.5 vai 2.0 + 1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar pupu 1–2 īsto lapu stadiju līdz 3 īsto lapu stadijai (līdz 15 cm augstas): <u>1. lietošanas variants</u> Dalītā apstrādē pirmo apstrādi veikt nezāļu diġļlapu stadijā līdz divām īstajām lapām, atkārtoti pēc jaunu nezāļu diġšanas pēc 7–10 dienām	49	2
		3.0		<u>2. lietošanas variants</u> Vienā paņēmienā apstrādi veikt, ja nezāles sasniegušas 4–6 lapu stadiju		1
Āboliņš, lucerna	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	2.0–3.0		Sējas gadā sējumus apsmidzināt kultūraugu 3 īsto lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti	40	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt sējumus linu “eglītes” fāzē (3–10 cm gari)	–	1

15. Belkar

Reġ. Nr. 0598, reġ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 10 g/l,
piklorams, 48 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža divdiġļlapju nezāles	0.25		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz 5 lapu stadijai (AS 12–15)	–	1
		0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās beigām (AS 16–19)		
		0.25		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalīti, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12–15) un atkārtoti, ja nepieciešams, sākot ar sešu lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās beigām (AS 16–19)	–	2

1	2	3	4	5	6	7

16. Betanal

Reģ. Nr. 0291, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: fenmedifams, 160 g/l.

Selektīvs, pieskares iedarbība.

Bayer AG

Zemenes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	2.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pavasarī, kad sadīgušas pirmās nezāles, līdz zemeņu ziedēšanas sākumam, nezāļu dīgļlapu stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5–14 dienām	–	3
Zemenes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	3.0		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus pavasarī, kad sadīgušas pirmās nezāles, līdz zemeņu ziedēšanas sākumam, nezāļu pirmo īsto lapu stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5–14 dienām	–	2
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju un dažas viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus nezāļu dīgļlapu stadijā neatkarīgi no biešu attīstības stadijas, ne vēlāk kā biešu 8 lapu attīstības stadijā. Atkārtoti pēc jaunu nezāļu sadīgšanas pēc 5–14 dienām	–	3

17. Biathlon 4D

Reģ. Nr. 0450, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tritosulfurons, 714 g/kg,

florasulams, 54 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

SIA BASF

Ziema kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.04–0.07		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūraugu attīstības karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.04–0.07		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstības karoglapas stadijai (AS 13–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

18. Boxer 800 EC

Reģ. Nr. 0271, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinum.

Syngenta Crop Protection AG

Ziema kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00–10)	–	1
		3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus rudenī pēc sadīgšanas līdz cerošanas sākumam (AS 11–21)		
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumus pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00–10)	42	1
Ķīmenes	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	–	1



1	2	3	4	5	6	7
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	75	1
Lupīna* (graudiem)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	–	1
Pupas, lauka*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	75	1
Burkāni*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus burkānu 2 īsto lapu stadijā (AS 12)	90	1
Sīpoli* (sēti, stādīti no sīksīpoliem), ķiploki*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad sētajiem (sīpoliem) pirmā lapa karodziņa formā un stādītajiem sīpoliem, ķiplokiem pirmā lapa 3–4 cm (AS 11–13)	90	1
Selerijas* (sakņu)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas	90	1
Selerijas* (kātu)	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumu 7 dienas pēc pārstādīšanas	60	1
Saulespuķes*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

19. Brasan 540 EC

Reģ. Nr. 0320, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetahlor, 500 g/l,
klomazons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas – pirms nezāļu un kultūrauga sadīgšanas (AS 00–09). Pielaujamais maksimālais darbīgās vielas dimetahlor daudzums ir 1 kg /ha reizi trijos gados tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir dimetahlor	–	1

1	2	3	4	5	6	7

20. Broadway Star

Reģ. Nr. 0571, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 14.2 g/kg,
piroksulams, 70.8 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Dow AgroSciences Denmark A/S

Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi	Viendīgļlapju nezāles un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.160–0.265		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
	Neauglīgā juntauza (<i>Bromus sterilis</i>)	0.105		<u>2. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32). Atkārtotu apstrādi veikt pēc 10–14 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	2
Vasaras kvieši	Viendīgļlapju nezāles un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.150		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

21. Butisan 400

Reģ. Nr. 0037, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metazahlor, 400 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

*SIA BASF***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Rapsan 400 SC**

Reģ. Nr. 0617, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metazahlor, 400 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Globachem n.v.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ripsis, sinepes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.875		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00–09) vai pēc rapša sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10–18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapju stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	–	1
Galviņkāposti, ziedkāposti, Briseles kāposti, brokoļi, lopbarības kāposti, Pekinas kāposti*, Ķīnas kāposti*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.875		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas vai stādījumu 8–10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas, līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS 16)	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

22. Butisan Avant

Reģ. Nr. 0497, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor, 300 g/l,
dimetēnamīds-P, 100 g/l,
kvinmeraks, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis,	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0–2.5		1. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00–09)	–	1
				2. lietošanas veids Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 4 lapu stadijai (AS 10–14)		

23. Butisan Kombi

Reģ. Nr. 0470, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor, 200 g/l,
dimetēnamīds-P, 200 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00–09) vai pēc rapša sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10–18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	–	1

24. Butisan Star

Reģ. Nr. 0258, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor, 333 g/l,
kvinmeraks, 83 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un saknēm.

SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Rapsan Plus SC

Reģ. Nr. 0618, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor, 333 g/l,
kvinmeraks, 83 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un saknēm.

Globachem n.v.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0–2.25		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00–09) vai pēc rapša sadīgšanas līdz 4 lapu stadijai (AS 10–14) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	–	1

25. Butoxone

Reģ. Nr. 0138, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPB, 400 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Zirņi, pupas*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz 6 lapu stadijai (AS 13–16)	–	1
Baltais āboliņš*, sarkanais āboliņš*, galega*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 istajām lapām	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

26. Calibre 50 SX

Reģ. Nr. 0301, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-tifensulfurons, 333 g/kg,
metil-tribenurons, 167 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.0225– 0.0300		Apsmidzināt sējumus pavasarī veģetācijai atjaunojoties līdz graudaugu attīstības karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.015–0.030		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz attīstības karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu, 50 ml uz 100 l darba šķidruma	–	1

27. Callisto 100 SC

Reģ. Nr. 0700, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un lapām.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt kultūrauga sējumu, sākot ar vienas lapas attīstības stadiju līdz 8 lapu attīstības stadijai (AS 11-18) 1.lietošanas veids Apstākļos, kad nav iespējams veikt dalīto apstrādi, nezāļu 3-4 lapu stadijā	90	1
		0.75		<u>2.lietošanas veids</u> Dalītā apstrādē, kad nezāles ir 1-2 lapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt, sadīgstot jaunām nezālēm, pēc 8-12 dienām	90	2
		0.5		<u>3.lietošanas veids</u> Dalītā apstrādē, kad nezāles ir 1-2 lapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt, sadīgstot jaunām nezālēm, pēc 8-12 dienām	90	3

28. CDQ SX

Reģ. Nr. 0589, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-metsulfurons, 111g/kg,
metil-tribenurons, 222 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

DuPont Finland Ltd.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.018–0.034		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasari, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz attīstības karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.018–0.034		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasari, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20–30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.018–0.034		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstības karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidru- mam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.018		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20–30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

29. Centurion Plus

Reģ. Nr. 0509, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: kletodims, 120 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Arysta LifeScience S.A.S.

Zemenes	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt zemeņu stādījumus, sākot ar 2 lapu stadiju līdz ziedkopu attīstības fāzes beigām (AS 12–59) vai pēc ražas novākšanas	30	1
Kartupeļi	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt kartupeļu stādījumus pēc kartupeļu sadīgšanas līdz lakstu saskaršanās vagās sākumam (AS 12–31)	56	1
Burkāni	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz burkāni sasnieguši 50 % no sakņu raksturīgā diametra (AS 12–45)	40	1
Sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sīpoli sasnieguši 50 % no bumbuļu raksturīgā diametra (AS 12–45)	56	1
Galviņkāposti, Briseles kāposti, Savoņas kāposti	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz kultūraugu galviņu attīstības sākumam (AS 12–41)	28	1
Pupas (svaigam patēriņam un graudiem)	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19)	30	1
Zirņi (graudiem)	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sāndzinumu attīstības beigām (AS 12–29)	56	1
Ziema rapsis, vasara rapsis	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 12–50)	90	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz lapas nosedz 30 % no augsnes virskārtas rindās (AS 12–33)	56	1
Lini	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus sākot ar otro lapu pāri, līdz augi sasnieguši 20 cm garumu	70	1

1	2	3	4	5	6	7

30. Chwastox 750 SL

Reģ. Nr. 0376, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

*CIECH Sarzyna S.A.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****MCPA Classic 750 SL**

Reģ. Nr. 0531, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

*CIECH Sarzyna S.A.***Profi MCPA 750 SL**

Reģ. Nr. 0531, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

CIECH Sarzyna S.A.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 20–29)		

31. Clamox

Reģ. Nr. 0496, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor, 375 g/l,

imazamokss, 17.5 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

SIA BASF

Ziemas rapsis*, vasaras rapsis*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz 8 lapu stadijai (AS 10–18)	–	1

* Clearfield ziemas rapsis un vasaras rapsis

32. Clap Forte

Reģ. Nr. 0643, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klopīralīds, 720 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Sharda Europe b.v.b.a.

Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanās sākumu līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 30–51)	–	1
Vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz zaļo pumpuru stadijai (AS 12–51)	–	1

1	2	3	4	5	6	7

33. Cleave

Reģ. Nr. 0542, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 2.5 g/l,
fluroksipirs, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

*ADAMA Registrations B.V.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Mixin**

Reģ. Nr. 0658, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 2.5 g/l,
fluroksipirs, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras tritikāle, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 20–45)	–	1
Stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.5–1.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	7	1

34. Cleravo

Reģ. Nr. 0572, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: imazamokss, 35 g/l,
kvinmeraks, 250 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

SIA BASF

Ziemas rapsis*	Īsmūža divdīgļ- lapju nezāles, labības – sārņ- augi, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
		0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar stublāja pagarināšanās sākumu līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30–50). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Vasaras rapsis*, vasaras rapsis*	Īsmūža divdīgļ- lapju nezāles, labības – sārņ- augi, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

* Clearfield ziemas rapsis, vasaras rapsis un vasaras rapsis

35. Cliophar 600 SL

Reģ. Nr. 0665, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klopīralīds, 600 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15)	-	1
Galviņkāposti, Savojas kāposti*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga iesakņošanās, tā divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15)	-	1



1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi ziemas mieži	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15)	-	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 12-55)	-	1
Stiebrzāles (sēklu lauki)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1
Vasaras rapsis, vasaras ripsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 12-55)	-	1
Ziemas rapsis, ziemas ripsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga pirmo starpmezglu posmu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31-55)	-	1
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt ganības pavasarī, sākot ar stiebrzāļu cerošanas sākumu līdz to attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-37)	7	1
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas	-	1
Egles (kokaudzētavās)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies	-	1

36. Devrinols s.k.

Reģ. Nr. 0252, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: napropamīds, 450 g/l.

Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm.

UPL Europe Ltd.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga sējas. Iestrādāt augsni 2–3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas	–	1
Galviņkāposti*, ziedkāposti*, brokoļi*, Briseles kāposti*, Ķīnas kāposti*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga izstādīšanas. Iestrādāt augsni 2–3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas	–	1
Upenes*, jāņogas*, ērkšķogas*, avenes*, krūmmellenes*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	5.0–7.0		Apsmidzināt apdobses agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas	–	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Ābeles*, bumbieres*, plūmes*, ķirši*	Īsmūža divdīgļ- lapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	5.0–7.0		Apsmidzināt apdobs agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas	–	1
Zemenes*	Īsmūža divdīgļ- lapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt agri pavasarī pirms nezāļu dīgšanas	–	1
Zirņi*, pupas*	Īsmūža divdīgļ- lapju nezāles, dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga sējas. Iestrādāt augsnē 2–3 cm dziļumā 30 minūšu laikā pēc izsmidzināšanas	–	1

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

37. Dicash

Reģ. Nr. 0597, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dikamba, 480 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Sharda Europe b.v.b.a.

Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 13–15)	–	1

38. Dicoherb Super 750 SL

Reģ. Nr. 0390, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: MCPA, 660 g/l,

dikamba, 90 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūr- augu cerošanas fāzes beigām (AS 29)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0–1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13–29)	–	1

39. Diflanil 500 SC

Reģ. Nr. 0530, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: diflufenikans, 500 g/l.

Selektīvs, pieskares iedarbības un augsnes herbicīds.

Globachem n.v.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi, speltas kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.125–0.25		Apsmidzināt sējumus rudenī pēc kultūrauga sadīgšanas vai pavasarī atsākoties veģetācijai līdz graudaugu cerošanas beigām (AS 11–29)	–	1

40. DMA 600

Reģ. Nr. 0559, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: 2.4-D 600 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5–0.75		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29)	–	1
		1.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)		

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29)	–	1
		0.75–1.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32)		

41. Duplozāns Super š.k.

Reģ. Nr. 0084, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dihlorprops-P, 310 g/l,
mekoprops-P, 130 g/l,
MCPA, 160 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, nezāļu dīgļlapu līdz 2–4 īsto lapu stadijai	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus nezāļu dīgļlapu līdz 2–4 īsto lapu stadijai	–	1

42. Elegant 2FD

Reģ. Nr. 0478, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 6.25 g/l,
2.4-D, 300 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļ- lapju un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5–0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu 2 mezglu stadijai (AS 32)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļ- lapju un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.4		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu divu lapu stadiju līdz 2 mezglu stadijai (AS 12–32)	–	1

43. Elumis 105 OD

Reģ. Nr. 0573, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: mezotrions, 75 g/l,
nikosulfurons, 30 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kukurūza	Viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12–18)	–	1

44. Ergon

Reģ. Nr. 0357, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-metsulfurons, 68 g/kg,
metil-tifensulfurons, 682 g/kg.

Sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Rotam Agrochemical Europe Limited

Ziemas kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 31). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1



1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdiģļlapju nezāles	0.010		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3 lapu stadiju līdz pirmā mezgla stadijai (AS 13–31). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

45. Estets 600 e.k.

Reģ. Nr. 0305, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: 2.4-D, 600 g/l, (905 g/l 2.4-D 2-etilheksil estera formā).

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdiģļlapju nezāles	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, veģetācijai atjaunojoties līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdiģļlapju nezāles	0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 4 lapu stadijas līdz divu mezglu stadijai (AS 14–32)	–	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdiģļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus, sākot no kukurūzas 2 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS 12–16)	–	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža un daudzgadīgās divdiģļlapju nezāles	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz karoglapas maksts paplašināšanās stadijai (AS 21–41)	–	1
Ganības, pļavas (bez tauriņziežiem)	Īsmūža un daudzgadīgās divdiģļlapju nezāles	1.0–2.0		Pavasarī, no kultūraugu cerošanas līdz karoglapas maksts paplašināšanās stadijai (AS 21–41), daudzgadīgās nezāles agrīnā attīstības stadijā vai kad tām izveidojusies lapu rozete	28	1

46. Fenix

Reģ. Nr. 0283, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: aklonifēns, 600 g/l.

Selektīvs, pieskares iedarbība, augi dīgstot uzņem caur hipokotilu, koleoptili un diģļlapām.

Bayer AG

Kartupeļi	Īsmūža divdiģļlapju nezāles	2.5–3.0		Apsmidzināt stādījumu vismaz vienu nedēļu pirms kartupeļu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
Zirņi, lauka pupas (graudiem)	Īsmūža divdiģļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt sējumu vismaz vienu nedēļu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	75	1
Burkāni, sakņu pētersīļi, pastinaki	Īsmūža divdiģļlapju nezāles	2.5		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	70	1
Burkāni, sakņu pētersīļi, pastinaki	Īsmūža divdiģļlapju nezāles	1.5 + 1.0		<u>2. lietošanas veids</u> 1. reizi apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai; 2. reizi – kultūrauga 2 lapu stadijā, dīgstot jaunām nezālēm	70	2



1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt stādījumu pirms sīpolu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	90	1
		1.5 + 1.0		<u>2. lietošanas veids</u> 1. reizi apsmidzināt stādījumu pirms sīpolu sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai; 2. reizi – sīpolu 1–2 lapu stadijā, dīgstot jaunām nezālēm	90	2
Ķiploki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		<u>1. lietošanas veids</u> Apsmidzināt stādījumu pirms ķiploku sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	130	1
		1.5 + 1.0		<u>2. lietošanas veids</u> 1. reizi apsmidzināt stādījumu pirms ķiploku sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai; 2. reizi – ķiploku 1–2 lapu stadijā, dīgstot jaunām nezālēm	130	2
Ķīmenes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
Dilles	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	50	1
Saulespuķes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumu vismaz vienu nedēļu pirms kultūrauga sadīgšanas, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
Egles, priedes, Ziemeļvētku eglītes, lapegles (kokaudzētavās)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus agri pavasarī, kad vēl nav sākusies jauno dzinumu augšana, nezāļu dīgšanas laikā un ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai	–	1
Kārkli (stādījumi)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5–2.5		Apsmidzināt pēc iestādīšanas, pirms sākusies jauno dzinumu augšana	–	1

47. Flight Forte

Reģ. Nr. 0293, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: pendimetalīns, 320 g/l,
pikolinafēns, 16 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

SLA BASF

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–2.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, kultūrauga 1–3 lapu stadijā (AS 11–13), kad nezāles ir dīgļlapu līdz pirmo īsto lapu stadijā	–	1

1	2	3	4	5	6	7

48. Flurostar 180

Reģ. Nr. 0644, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluroksipirs, 180 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Globachem n.v.

Ziņas kvieši, ziņas mieži, ziņas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndzinumu stadiju, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 23–45)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.46–0.60		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39)	–	1
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles), zāliens	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndzinumu stadiju, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 23–45)	7	1
Stiebrzāles sēklai (sējas gadā), ganības (sējas gadā, zelmenī stiebrzāles), zāliens	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.46–0.60		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39)	7	1

49. Focus Ultra

Reģ. Nr. 0065, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: cikloksidims, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

SIA BASF

Ziņas rapsis, vasaras rapsis, vasaras rapsis*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie divi starpmezglu posmi (AS 12–32), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	–	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie divi starpmezglu posmi (AS 12–32), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes, mārrutki*, pastinaki*, selerijas* (sakņu), kāļi*, rāceņi*, turnepši*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz lapas sedz 30 % no augsnes starp- rindās (AS 12–33), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	35	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz lapas sedz 30 % no augsnes starprindās (AS 12–33), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Zirņi (graudi), pupas (graudi)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12–39), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	56	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušie deviņi stublāju posmi (AS 12–39), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		

1	2	3	4	5	6	7
Zirņi (zaļi, ar vai bez pākstīm)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12–39), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	35	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12–39), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Pupas (zaļas, ar vai bez pākstīm)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12–39), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz izveidojušies deviņi stublāju posmi (AS 12–39), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Ziedkāposti, galviņkāposti, Savoņas kāposti,	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz sāk veidoties galviņa (AS 13–41), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņa (AS 13–41), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Briseles kāposti	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņas (AS 12–41), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	56	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sāk veidoties galviņas (AS 12–41), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Burkāni	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sakne sasniegusi 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12–45), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	35	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sakne sasniegusi 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12–45), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		

1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli, ķiploki*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sīpols sasniedzis 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12–45), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz sīpols sasniedzis 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12–45), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Puravi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stublājs sasniedzis 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12–45), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	42	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju, līdz stublājs sasniedzis 50 % no raksturīgā lieluma (AS 12–45), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Āboliņš, lucerna (sēklai)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz ziedpumpuru attīstībai (AS 12–51), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	–	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz ziedpumpuru attīstībai (AS 12–51), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Sarkanā auzene (sēklai)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz piecu mezglu attīstībai (AS 14–35), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	–	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga četru lapu stadiju līdz piecu mezglu attīstībai (AS 14–35), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Lini	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12–31), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	–	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12–31), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		

1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz augu saskaršanās vagā sākumam (AS 11–31), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	56	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga sadīgšanu līdz augu saskaršanās vagā sākumam (AS 11–31), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Zemenes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11–16), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	42	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11–16), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Ķīnas kāposti, lapu kāposti	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju, līdz lapu rozete sasniegusi 30 % šķirnei raksturīgā diametra (AS 13–33), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	42	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju, līdz lapu rozete sasniegusi 30 % šķirnei raksturīgā diametra (AS 13–33), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Dekoratīvie koki, krūmi, (stādaudzētavā, stādījumos), krāšņumaugi*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	–	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Pētersīļi* (lapu), selerijas* (kātu, lapu)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 13–19), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 13–19), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		

1	2	3	4	5	6	7
Salāti*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju, līdz izveidojusies lapu masa 50 % no sagaidāmās lapu masas lieluma (AS 12–45), kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju, līdz izveidojusies lapu masa 50 % no sagaidāmās lapu masas lieluma (AS 12–45), kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Ābeles, bumbieres	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumu apdobses veģetācijas periodā, kad nezāles un labības – sārņaugi ir 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	28	1
	Ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	2.0–5.0		Apsmidzināt stādījumu apdobses veģetācijas periodā, kad vārpatai ir 3–5 lapas (15–20 cm)		
Ūpenes*, jānogas*, ērkšķogas*, avenes*, krūmmellenes*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, pa sadīgušām nezālēm, to 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	–	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata (<i>Elymus repens</i>)	1.5–3.0		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 3–5 lapu stadiju. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha		
		1.0–1.5		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 3–5 lapu stadiju, atkārtoti, kad nezāles ataugušas. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu Dash 0.5–1.0 l/ha	–	2

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

50. Fox 480 SC

Reģ. Nr. 0375, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: bifenokss, 480 g/l.

Pieskares iedarbības herbicīds.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75–1.0		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 3 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS 13–16)	–	1
		0.5		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus, sākot no rapša 3 lapu stadijas līdz 6 lapu stadijai (AS 13–16), nezāļu dīgļlapu līdz divu īsto lapu stadijā. Atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6	7

51. Foxtrot 69 EW

Reģ. Nr. 0408, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 69 g/l.

Selektīvs pieskares un sistēmas iedarbības herbicīds.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Parastā rudzuzmilga, vējauza un citas ismūža viendīgļlapju nezāles	1.0–1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	–	1
Ziemas mieži	Parastā rudzuzmilga, vējauza un citas ismūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Parastā rudzuzmilga, vējauza un citas ismūža viendīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu divu lapu stadijas līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 12–32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz cerošanas fāzes beigām	–	1

52. Frequent

Reģ. Nr. 0691, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: butil-fluazifops-P, 125 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Sharda Cropchem España S.L.

Ziemas rapsis	Labības- sārņaugi, ismūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12-30)	90	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	3.0				
Pupas, zirņi (graudiem)	Labības- sārņaugi, ismūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 11-30)	90	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5				
Pupas (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm), zirņi (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm)	Labības- sārņaugi, ismūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 11-30)	45	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.5				

1	2	3	4	5	6	7

53. Fusilade Forte 150 EC

Reģ. Nr. 0182, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: butil-fluazifops-P, 150 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt apdobses veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	28	1
Krūmciņonijas*, smiltsērķšķi*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt apdobses pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Upenes, jānogas, ērkšķogas, krūmmellenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt apdobses pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	90	1
Dzērvenes*	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.25		Apsmidzināt apdobses pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	90	1
Avenes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt apdobses pirms ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	56	1
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt stādījumus pirms zemeņu ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	42	1
Kartupeļi	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.6		Apsmidzināt stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, līdz augu sakļaušanās vagās sākumam (AS 08–31)	90	1
Burkāni, galda bietes, mārutki, rāceņi, kāļi, rutki, selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.6		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz saknes veidošanās sākumam, (AS 12–41)	49	1
Cigoriņi* (sakņu)	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.6		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz saknes veidošanās sākumam (AS 12–41)	56	1
Sīpoli, ķiploki, Šalotes sīpoli	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz sīpola veidošanās sākumam (AS 12–41)	28	1
Salāti, selerijas (kātu), pētersīļi (lapu)	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.25		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12–18)	42	1

1	2	3	4	5	6	7
Pupas (graudiem)	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.25		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12–30)	90	1
Zirņi (svaigam patēriņam ar pākstīm), pupas (svaigam patēriņam ar pākstīm)	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.0		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12–30)	28	1
Spargeļi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.25		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis,	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz stublāja pagarināšanās fāzes sākumam (AS 12–30)	90	1
Zirņi (graudiem), lupīna (graudiem), soja*	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.0		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 stublāja pagarināšanās sākumam (AS 12–30)	90	1
Lini	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.0		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga otrā lapu pāra stadiju līdz stiebra veidošanās sākumam (AS 12–31)	90	1
Cukurbietes, lopbarības bietes	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz augu sakļaušanās vagās sākumam (AS 12–31)	56	1
Lapu koki, skuju koki kokaudzētavās un jaunaudzēs	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt apdobses veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi, krāšņumaugi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Sarkanais āboliņš*, baltais āboliņš*, bastarda āboliņš*, sarkanā auzene* (sēklai)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.5		Apsmidzināt veģetācijas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Griķi*	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.6		Apsmidzināt sējumus, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas, sākot ar kultūrauga 2–4 lapu stadijā (AS 12–14)	90	1
Ķimenes* (sējas gadā)	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–1.6		Apsmidzināt sējumus sējas gadā, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	0.6–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad īsmūža nezālēm ir 2–3 lapas un daudzgadīgajām nezālēm 2–4 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

54. Galera š.k.

Reģ. Nr. 0313, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: klopīralīds, 267 g/l,
piklorams, 67 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.3		Apsmidzināt sējumus pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās, līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nesepti ar lapām (AS 50)	–	1
Vasaras rapsis, vasaras ripsis	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.3		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas līdz 4 lapu stadijai (AS 12–14)	–	1

55. Glifomaks Plus š.k.

Reģ. Nr. 0316, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Albaugh UK Ltd.

Tirumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Tirumu apstrāde pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	2.0		Apsmidzināt nezāles/labības – sārņaugus pavasarī 1–10 dienas pirms pirmssējas augsnes apstrādes vai kultūrauga sējas vai stādīšanas	–	1
Tirumu apstrāde pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt vārpatu un citas daudzgadīgās nezāles pavasarī. Augsnes apstrādi un sēju vai stādīšanu veikt 10 dienas pēc smidzināšanas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumu apstrāde pirms kultūraugu dīgšanas/ pēc sējas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	2.0		Apsmidzināt augošas nezāles/ labības – sārņaugus vienu dienu pēc kultūrauga sējas. Kultūraugu sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, rudzu, tritikāles, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Rapsis pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt rapša sējumus 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Zirņi pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apsmidzināt sējumus aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75 % no pākstīm ir brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Augļu dārzi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–4.0		Apstrāde veicama rudenī pēc ražas novākšanas. Apsmidzināt augošas nezāles, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apstrāde veicama rudenī. Apsmidzināt augošas nezāles, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Celmi	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

56. Glyphomax 480

Reģ. Nr. 0386, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 480 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Albaugh UK Ltd.

Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–2.25		Apsmidzināt kviešu, miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumus pilngatavības stadijā aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–3.0		Apsmidzināt sējumus 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Zirņi pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75 % no pākstīm ir brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–2.25		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 2/3–3/4 no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Tirumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.125–1.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–3.0				
Tirumu apstrāde pēc zālāju sēklu lauku novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–4.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Tirumu apstrāde pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Labības – sārņaugi, īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75–1.5		Apsmidzināt vārpātu un citas daudzgadīgās nezāles pavasarī. Vārpatai vēlamas 3–4 lapas apstrādes brīdī. Augsnes apstrādi un sēju vai stādīšanu veikt 10 dienas pēc smidzināšanas	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–3.0				
Tirumu apstrāde pēc sējas, bet pirms kultūraugu dīgšanas, lietojot minimālo apstrādi vai tiešo sēju	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.125		Apsmidzināt augošanas nezāles/ labības – sārņaugus vienu dienu pēc kultūrauga sējas. Kultūraugu sēklām jābūt pilnībā nosegtām ar augsni	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–3.0				
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Plūmes, ķirši	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–4.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms plūmju un ķiršu ziedpumpuru atvēršanās vai rudenī pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu atvases	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–4.5		Apstrāde veicama rudenī, kad koku pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši. Apsmidzināt augošanas nezāles, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas. Apstrāde ir veicama laikā, kad koku sulas kustība ir virzienā uz saknēm, parasti no oktobra līdz februāra beigām	–	1

1	2	3	4	5	6	7

57. Goltix 700 SC

Reģ. Nr. 0155, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metamitrons, 700 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

ADAMA Registrations B.V.

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.25		Apsmidzināt biešu sējumus pēc sējas līdz to sadīgšanai (AS 00–09) pa nezālēm dīgļlapu stadijā. Atkārtoti apsmidzināt, pēc jaunu nezāļu sadīgšanas, līdz biešu 8 lapu stadijai (AS 10–18), nezāļu dīgļlapu stadijā. Nepieciešamības gadījumā lieto maisījumā ar piemērotu preparātu	–	4

58. Granstar Premia 50 SX

Reģ. Nr. 0255, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un saknēm.*Cheminova A/S***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Trimmer 50 SG**

Reģ. Nr. 0321, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un saknēm.*Cheminova A/S*

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Divdīgļlapju nezāles	0.015–0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.0150– 0.0225		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airesnes pasēju	Divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), kad stiebrzāles ir 2–3 lapu stadijā (AS 12–13). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 25 ml uz 100 l darba šķidruma	60	1

59. Grodyl

Reģ. Nr. 0028, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: amidosulfurons, 75 %.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Ķeraiņu madara un citas īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02–0.04		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 49)	56	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Ķeraiņu madara un citas īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02–0.04		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 13–49)	56	1
Lini	Ķeraiņu madara un citas īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02–0.04		Apsmidzināt sējumus, kad lini ir 3–12 cm gari	90	1
Daudzgadīgās stiebrzāles	Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.06		Apsmidzināt nezāļu lapu rozetes stadijā	21	1

1	2	3	4	5	6	7

60. Herbos 110 EC

Reģ. Nr. 0680, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 110 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle	Parastā rudzuzmilga, vējauza un citas viendīgļlapju nezāles	0.7		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 20-31)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Parastā rudzuzmilga, vējauza un citas viendīgļlapju nezāles	0.7		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 20-31)	-	1

61. Hurler

Reģ. Nr. 0601, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:**Frazer**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 38, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

ProEuro Sp. z o.o.

Galistop 200

Reģ. Nr. 0602, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Ziemas kvieši, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstības karoglapas stadijai (AS 20-39)	-	1

62. Hussar Activ Plus OD

Reģ. Nr. 0588, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: 2,4-D 2-etilheksil esteris, 300 g/l,
nātrijs metil-jodosulfurons, 10 g/l,
metil-tiēnkarbazons, 7.5 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām, nedaudz ar saknēm.

Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle	Parastā rudzuzmilga, īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu stadiju līdz viena mezgla stadijai (AS 23-31)	-	1
Rudzi	Parastā rudzuzmilga, īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 23-29)	-	1
Vasaras kvieši	Vējauza, īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

63. Kalif 360 CS

Reģ. Nr. 0409, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klomazons, 360 g/l.

Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.

ADAMA Registrations B.V.**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Regent**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 41, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klomazons, 360 g/l.

Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.

Top Crop Chem Ltd

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25–0.33		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša un nezāļu sadīgšanas	–	1
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša un nezāļu sadīgšanas	–	1
Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt stādījumus ne vēlāk kā 5 dienas pirms kartupeļu un nezāļu sadīgšanas	–	1

64. Kalif Mega

Reģ. Nr. 0410, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor, 250 g/l,

klomazons, 33 g/l.

Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dīgstiem.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša sadīgšanas	–	1
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sējas, pirms rapša sadīgšanas	–	1

65. Kinvara

Reģ. Nr. 0672, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: MCPA, 233 g/l,

fluroksipirs, 50 g/l,

klopīralīds, 28 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Arrva**

Reģ. Nr. 0695, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: MCPA, 233 g/l,

fluroksipirs, 50 g/l,

klopīralīds, 28 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Barclay Chemicals (R&D) Ltd.

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi, ziemas mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	1
Stiebrzāles (sēklai sējas gadā), zāliens* (sējas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	



1	2	3	4	5	6	7
Stiebrzāles (lopbarībai sējas gadā un vecākas), ganības (sējas gadā un vecākas)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	7	1
Stiebrzāles (sēklu lauki), zāliens*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-39)	-	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

66. Komplet

Reģ. Nr. 0393, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: flufenacets, 280 g/l,
diflufenikans, 280 g/l.

Pieskares un augsnes iedarbības herbicīds.

Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.4–0.5		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no kultūrauga vienas lapas stadijas līdz triju lapu stadijai (AS 11–13)	–	1

67. Korvetto

Reģ. Nr. 0663, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-halauksifens, 5 g/l,
klopīralīds, 120 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanos līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50)	-	1

68. Kyleo

Reģ. Nr. 0423, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: glifosāts, 240 g/l,
2,4-D, 160 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

Nufarm GmbH & Co KG

Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	3.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
	Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	4.0–5.0				
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	4.0–5.0				
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	5.0				

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumi pēc ražas novākšanas (rugāji)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pēc ražas novākšanas	–	1
	Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0				
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	3.0				
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	4.0				
Papuve, atmata	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	–	1
	Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0–5.0				
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	3.0				
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	5.0				
Tīrumi pirms graudaugu un kukurūzas sējas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	–	1
	Daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	3.0–5.0				
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	3.0				
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	5.0				
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības (zem elektrības un gāzes pārvades līnijām, ap dzelzceļu uzbūrumiem, gar automaģistrālēm, parkos un sporta laukumos)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	4.0–5.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	–	1

Herbicīdi

69. Lancelot

Reģ. Nr. 0524, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: aminopiralīds, 300 g/kg,
florasulams, 150 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015–0.025		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 23–29). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela	–	1
		0.033		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela		



1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.010		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz lapu attīstības fāzes beigām (AS 13–19)	–	1
		0.015–0.025		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas fāzes beigām (AS 20–29). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela		
		0.033		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32). Darba šķidrumam jāpievieno virsmas aktīvā viela		

70. Legacy 500 SC

Reģ. Nr. 0411, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: diflufenikans, 500 g/l.

Selektīvs pieskares iedarbības un augsnes herbicīds.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15–0.20		Apsmidzināt sējumus rudenī, pirms graudaugu sadīgšanas līdz graudaugu 4 lapu stadijai (AS 00–14)	60	1
		0.20		Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 31)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus pirms graudaugu sadīgšanas, līdz graudaugu pirmā mezgla stadijai (AS 00–31)	60	1

71. Legacy Pro

Reģ. Nr. 0415, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: diflufenikans, 40 g/l,
pendimetalīns, 300 g/l,
hlortolurons, 250 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc graudaugu sadīgšanas līdz 3 lapu stadijai (AS 10–13)	–	1

72. Lentagran WP

Reģ. Nr. 0330, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: piridāts, 450 g/kg.

Pieskares iedarbība.

Belchim Crop Protection NV

Galviņkāposti, Briseles kāposti, Savoja kāposti, lapu kāposti, lopbarības kāposti	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četrus līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	42	2
Ziedkāposti, brokoļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četrus līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	42	2



1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli (sētie, stādītie), šalotes sīpoli	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūraugu sadīgšanas, tā vienas līdz četru lapu stadijā (AS 11-14). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	56	3
Vasaras sīpoli (lokiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūraugu sadīgšanas, kad pilnībā attīstījušās trīs lapas (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	28	2
Puravi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt pēc kultūrauga izstādīšanas un izeaugšanās, kad kultūraugam ir attīstījušies 3 lapa (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	28	2
Ķiploki*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt stādījumus, kad kultūraugam attīstījušies 3 lapa (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	56	2
Kolrābji*	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt sējumus, kad kultūraugam attīstījušās četras līdz sešas lapas (AS 14-16). Ja augs pārstādīts, apstrādi veikt pēc 2-4 nedēļām. Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	42	2
Kukurūza*, saldā	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0-2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	42	2
Sparģeļi* (neražojoši stādījumi, 1-2 gadi veci)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-1.0		Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga attīstības stadiju, kad redzami 1-5 sānu dzinumi (AS 21). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	-	2
Sparģeļi* (stādījumi vecāki par 2 gadiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5-2.0		Apsmidzināt stādījumus pirms kultūrauga sadīgšanas un/vai pēc ražas novākšanas. Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā	-	2
Zirņi (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem)	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75-1.0		1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 13-16)	-	1
		0.5		2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo īsto lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 11-16). Atkārtoti smidzina pēc 7-10 dienām	-	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

73. Leopard

Reģ. Nr. 0424, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12–15)	100	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus, kad nezālēm ir 4–6 lapas (10–15 cm gara)		
Burkāni, kartupeļi,	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12–15)	30	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus, kad nezālēm ir 4–6 lapas (10–15 cm gara)		
Zirņi, pupas	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12–15)	40	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus, kad nezālēm ir 4–6 lapas (10–15 cm gara)		

74. Lontrel 600 SL

Reģ. Nr. 0666, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klopīralīds, 600 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15)	-	1
Galviņkāposti, Savojas kāposti*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga iesakņošanās, tā divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15)	-	1
Ziemas kvieši, ziemas tritikāle, rudzi, ziemas mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī atjaunojoties veģetācijai sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15)	-	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 12-55)	-	1
Stiebrzāles (sēklu lauki)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1
Vasaras rapsis, vasaras rapsis*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 12-55)	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis, ziemas rapsis*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga pirmo starpmezglu posmu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31-55)	-	1
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt ganības pavasarī, sākot ar stiebrzāļu cerošanas sākumu līdz to attīstītas karoglapas stadijai (AS 21-37)	7	1
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas	-	1
Egles, baltegles (kokaudzētavās)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2		Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies	-	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

75. Lontrel 72 SG

Reģ. Nr. 0388, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: klopīralīds, 720 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt sējumus pavasarī no rapša stublāja veidošanās sākuma līdz ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 31–55)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu cerošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai. AS (21–37)	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz karoglapas parādīšanās stadijai. AS (37)	–	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 3–6 lapu stadijā, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā	–	1
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad usne ir 15–20 cm augsta (rozetes stadijā), arī maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1
Galviņkāposti	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt stādījumu 2–3 nedēļas pēc kultūrauga iesakņošanās, kad daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā	–	1
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas, kad usnes ir 15–20 cm augstas. Neapstrādāt zemeņu stādījumus pavasarī	–	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.110–0.165		Apsmidzināt sējumus līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 55)	–	1
Egles un baltegles kokaudzētavās	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.165		Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies un ierobežojamās nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt sējumus no stiebrzāļu cerošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21–37), arī maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.125–0.165		Apsmidzināt ganības nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad ierobežojamās nezāles sasniegušas 15–20 cm (rozetes stadija)	7	1

76. Maister Power OD

Reģ. Nr. 0543, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: foramsulfurons, 30 g/l,
nātrijs metil-jodosulfurons, 1 g/l,
metil-tiēnkarbazons, 10 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Bayer AG

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu līdz 6 lapu stadijai (AS 12–16)	–	1

77. Mateno Duo

Reģ. Nr. 0704, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: aklonifēns, 500 g/l,
diflufenikans, 100 g/l.

Selektīvs, pieskates iedarbība un augnes herbicīds, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.

Bayer AG

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.35		Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga vienas lapas stadiju līdz trīs lapu stadijai (AS 10-13)	-	1

78. MCPA 750

Reģ. Nr. 0135, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30)	–	1
	Tīruma usne	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31–39)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0–1.3		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3–4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13–30)	–	1
	Tīruma usne, tīruma mīkstpiene	2.5–3.0		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mīkstpienei izveidojusies lapu rozete, līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30)		
	Tīruma usne	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31–39)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3–4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13–30), kad āboliņam ir 1–2 istās lapas	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8–1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, kad lini ir 3–8 cm gari	–	1
Āboliņš	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1–2 īstās lapas	–	1
Ganības, pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt pēc nezāļu sadīgšanas, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	20 (ganīt un pļaut zāli)	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus, kad stiebrzālēm attīstījušās 3–4 lapas	–	1

79. MCPA Super 500 š.k.

Reģ. Nr. 0119, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, vasaras kvieši, mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3–4 lapu stadijas līdz stiebrošanas fāzes sākumam	–	1
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju		0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3–4 lapu stadijas līdz stiebrošanas fāzes sākumam (āboliņam 1–2 īstās lapas)	–	1
Sarkanais un baltais āboliņš sējas gadā		0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam 1–2 īstās lapas	–	1
Sarkanais āboliņš sēklu laukos		0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus 2–3 nedēļu laikā pēc veģetācijas perioda atsākšanās, sēklu novākšanas gadā	45 (lopbarībai)	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus sējas gadā no stiebrzāļu 1–2 lapu stadijas līdz stiebrošanas sākumam	–	1
Ganības un pļavas		1.0–1.5		Apsmidzināt nezāļu aktīvas augšanas laikā, daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	20 (ganīt un pļaut zāli)	1
Lini		1.0–1.2		Apsmidzināt sējumus, kad lini ir 3–8 cm gari	–	1

80. Metazamix™

Reģ. Nr. 0500, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahloris, 500 g/l,
aminopirālids, 5.3 g/l,
piklorams, 13.3 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Dow Agro Sciences Danmark A/S

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz četru lapu stadijai (AS 10–14)	–	1
Vasaras rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz dīgļsaknes parādīšanās stadijai (AS 00–05)	–	1
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz četru lapu stadijai (AS 10–14). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		

1	2	3	4	5	6	7

81. Metric ZC

Reģ. Nr. 0344, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: klomazons, 60 g/l,
mertibuzīns, 233 g/l.

Selektīvs, augi uzņem caur saknēm un dīgšiem, augsnes iedarbība.

Belchim Crop Protection NV

Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt kartupeļu stādījumu pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas	–	1

88. Mezzo WG

Reģ. Nr. 0322, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-metsulfurons, 200 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu	–	1
		0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.01–0.02		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu	–	1

Herbicīdi

83. Milagro 4 OD

Reģ. Nr. 0223, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ISK Biosciences Europe N.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Fornet 4 OD

Reģ. Nr. 0436, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ISK Biosciences Europe N.V.

Niklos 40 OD

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 14, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ProEuro Sp. z o.o.

Samson 4 OD

Reģ. Nr. 0437, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ISK Biosciences Europe N.V.

Kukurūza	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.1		Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–8 lapu stadijā (AS 12–18)	40	1

1	2	3	4	5	6	7

84. Milagro Extra 6 OD

Reģ. Nr. 0361, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

*ISK Biosciences Europe N.V.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Fornet Max 6 OD**

Reģ. Nr. 0433, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

*ISK Biosciences Europe N.V.***Samson Max 6 OD**

Reģ. Nr. 0434, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ISK Biosciences Europe N.V.

Kukurūza	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.75		1.lietošanas variants Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–8 lapu stadijā (AS 12–18)	40	1
		0.5+0.25		2.lietošanas variants Pirmo reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–3 lapu stadijā (AS 12–13), otro reizi pēc 10–14 dienām, kukurūzas 5–8 lapu stadijā (AS 15–18)	40	2

85. Mistral 700 WG

Reģ. Nr. 0259, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metribuzīns, 700 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

ADAMA Registrations B.V.

Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–0.7		1. lietošanas variants Apsmidzināt stādījumus pirms kartupeļu sadīgšanas pa tikko sadīgušām nezālēm	42	1
		0.3–0.5		2. lietošanas variants Apsmidzināt stādījumus pēc kartupeļu sadīgšanas nezāļu dīgļlapu vai pirmo īsto lapu stadijā, kad kartupeļu dīgsti ir 8–10 cm gari	42	1
		0.3–0.4 + 0.2–0.3		3. lietošanas variants Apsmidzināt pa tikko sadīgušām nezālēm: 1. reizi pirms kartupeļu sadīgšanas; 2. reizi, kad kartupeļi sasnieguši 8 cm	42	2
Burkāni*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.085		Apsmidzināt pirms un pēc burkānu sadīgšanas, līdz burkāni 5–7 cm lieli (BBCH 00–16)	60	3
Soja*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.4		Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas pa tikko sadīgušām nezālēm	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

86. Monitor

Reģ. Nr. 0145, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: sulfosulfurons, 75 %.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Ziemas kvieši, tritikāle, vasaras kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga	0.01		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, parastā rudzusmilga	0.01		Apsmidzināt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

87. Mustangs Forte s.e.

Reģ. Nr. 0334, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 5 g/l,
aminopirāls, 10 g/l,
2.4-D, 180 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, veģetācijai atsākoties, līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.6–0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21–32)	–	1

88. Mustangs s.e.

Reģ. Nr. 0184, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 6.25 g/l,
2.4-D, 300 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.4–0.6		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no cerošanas stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 25–32), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	–	1
Vasaras mieži, vasaras kvieši, auzas		0.4–0.6		Apsmidzināt, sākot no vasarāju graudaugu 2–3 lapu stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 13–32), iespējami maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu	–	1

1	2	3	4	5	6	7

89. Nicogan

Reģ. Nr. 0413, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: nikosulfurons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ADAMA Registrations B.V.

Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		1. lietošanas variants Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 2–8 lapu stadijā (AS 12–18)	40	1
		1.0 + 0.5		2. lietošanas variants Pirmo reizi apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–3 lapu stadijā (AS 13–14), otro reizi, pēc 10–14 dienām, kukurūzas 5–8 lapu stadijā (AS 15–18)	40	2

90. Nimbus Gold

Reģ. Nr. 0523, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlori, 200 g/l,

dimetēnamīds-P, 200 g/l,

klomazons, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.

SIA BASF

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju un īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00–09)	–	1

91. Nimbus SE

Reģ. Nr. 0328, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlori, 250 g/l,

klomazons, 33.3 g/l.

Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.

SIA BASF

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00–09)	–	1

92. Nozomi p.s.

Reģ. Nr. 0323, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: flumioksazīns, 500 g/kg.

Vispārējs pieskares iedarbības herbicīds.

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Dzelzceļa sliežu ceļi un to apmales	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.2		Apsmidzināt nezāles agrās attīstības stadijās. Nepieciešamības gadījumā veidot tvertnes maisījumu ar piemērotu preparātu	–	1

93. Nuance 75 WG

Reģ. Nr. 0403, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 750 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Divdīgļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūraugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	60	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Divdīgļlapju nezāles	0.012–0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39)	60	1
Ceļa malas*, mežmalas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīnu pārvadiem*	Latvāņi	0.015		Apsmidzina: 1. <u>lietošanas veids</u> Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, latvāņiem dīgstot, dīgļlapu veidošanās stadijā. 2. <u>lietošanas veids</u> Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad lielāko pārziemojušo latvāņu rozešu diametrs – 20 cm. 3. <u>lietošanas veids</u> Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to rozetes ir diametrā ap 20–25 cm. 4. <u>lietošanas veids</u> Latvāņa centrālo dzinumā tā ziedēšanas laikā, kamēr vēl nav izveidojušās sēklas. 5. <u>lietošanas veids</u> Atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Kontakts 100 ml uz 200 l ūdens uz 1 ha	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

94. Nufarm MCPA 750 š.k.

Reģ. Nr. 0045, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: MCPA, 750 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3–2.0		Apsmidzināt sējumus, ziemājus atjaunojoties veģetācijai, līdz stiebrošanas sākumam (AS 30)	–	1
	Tiruma usne	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31–39)		
Vasarāju graudaugi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.3–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3–4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13–30)	–	1
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tiruma usne, tiruma mīkstpiene	2.0–2.5		Apsmidzināt sējumus, kad usnei un mīkstpienei izveidojusies lapu rozete, līdz graudaugu stiebrošanas fāzes sākumam (AS 30)		
	Tiruma usne	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad usne ir rozetes stadijā, sākot ar kultūraugu pirmo mezglu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31–39)		
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 3–4 lapu stadiju līdz stiebrošanas fāzes sākumam (AS 13–30), kad āboliņam ir 1–2 istās lapas	–	1
Lini	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8–1.3		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, kad lini ir 3–8 cm gari	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Āboliņš	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.8		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņam ir 1–2 īstās lapas	–	1
Ganības, pļavas	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt pēc nezāļu sadīgšanas, kad daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete	20 (ganīt un pļaut zāli)	1
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.2–1.8		Apsmidzināt sējumus, kad stiebrzālēm attīstījušās 3–4 lapas	–	1
Zāliens	Divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt zālienu pēc nezāļu dīgšanas (daudzgadīgajām nezālēm izveidojusies lapu rozete)	–	1

95. Onyx

Reģ. Nr. 0657, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: piridāts, 600 g/l.

Pieskares iedarbība.

Belchim Crop Protection NV

Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.75		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12–16)	–	1
	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5+0.5		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12–16), atkārtoti pēc 7 dienām	–	2

96. Optika Trio š.k.

Reģ. Nr. 0248, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dihlorprops-P, 310 g/l,

mekoprops-P, 130 g/l,

MCPA, 160 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	2.0–2.5		Apsmidzināt pavasarī līdz graudaugu cerošanas stadijas beigām (AS 30)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži		1.5–2.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar graudaugu 5 lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 15–30)	–	1

1	2	3	4	5	6	7

97. Ouragan System 4

Reģ. Nr. 0209, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–6.0	2		–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas, rapsis pirms plaujas		2.0–3.0	2	Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā, 7 dienas pirms plaujas, rapša sējumus, kad sēklu mitrums ir zem 30 %, 14 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	–	1
Augļu dārzi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi		2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1

98. Pantera 4 EC

Reģ. Nr. 0171, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tefuril-kvizalofops-P, 40 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.

Ziemas rapsis	Labības – sārņaugi	0.6		Apsmidzināt kultūrauga sējumus, sākot no labību – sārņaugu 2 lapu stadijas līdz to cerošanas sākumam (AS 12–20)	60	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, kartupeļi, cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes, burkāni, lini, zirņi (graudiem), pupas (graudiem)	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības – sārņaugi	1.0		Apsmidzināt kultūraugu sējumus vai stādījumus, sākot ar īsmūža nezāļu 2 lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12–29), un labības-sārņaugus, sākot ar cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21–29)		
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt kultūraugu sējumus vai stādījumus nezāļu 4–6 lapu stadijā, kad nezāles 10–15 cm garas		

99. Pico 750 WG

Reģ. Nr. 0671, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pikolinafēns, 750 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

BASF SIA

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.133		Apsmidzināt sējumus rudenī kultūrauga vienas līdz divu lapu stadijā (AS 11-12)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

100. Pixxaro EC

Reģ. Nr. 0545, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 12.5 g/l,
fluroksipirs, 280 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.25		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndziņumiem līdz cerošanas beigām (AS 23–29)	–	1
		0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)		
		0.5		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar karoglapas maksts paplašināšanos līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 40–45)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.125		Apsmidzināt sējumus, sākot ar trīs lapu stadiju līdz lapu attīstības fāzes beigām (AS 13–19)	–	1
		0.25		Apsmidzināt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29)		
		0.35		Apsmidzināt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30–45)		

101. Primus

Reģ. Nr. 0172, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un nedaudz caur saknēm.*Dow AgroSciences Danmark A/S***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Pro**

Reģ. Nr. 0585, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un nedaudz caur saknēm.*Dow AgroSciences Danmark A/S***SuPrim**

Reģ. Nr. 0528, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un nedaudz caur saknēm.*Dow AgroSciences Danmark A/S*

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.06–0.075		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29)	–	1
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.075–0.1		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.05–0.075		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20–29)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.075–0.1		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)		



1	2	3	4	5	6	7
Ganības (ierīkošanas gadā), stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.075		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20–29)	–	1
	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.075–0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39)		
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.075– 0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	7	1
Stiebrzāles (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.075–0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1

102. Primus 250 WG

Reģ. Nr. 0590, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: florasulams, 250 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.015–0.020	2	Apsmidzināt sējumus pavasarī sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39) Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20–29) Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.015–0.020		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Ganības (ierīkošanas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	7	1
Stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.015		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.015–0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	7	1
Stiebrzāles (sēklai, 2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġļlapju nezāles	0.015– 0.030		Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

1	2	3	4	5	6	7

103. Primus XL

Reģ. Nr. 0387, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 5 g/l,
fluroksipirs, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1
Ganības (ierīkošanas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	7	1
Stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1
Stiebrzāles (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.75–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1

104. Proman

Reģ. Nr. 0656, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metobromurons, 500 g/l.

Selektīvs, augsnes iedarbība, augi uzņem caur saknēm.

Belchim Crop Protection NV

Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt stādījumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas (AS 00–09)	–	1

105. Puma Universal

Reģ. Nr. 0131, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-fenoksaprops-P, 69 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Bayer AG

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0–1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām	–	1
Ziemas mieži	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu stiebrošanas sākumam (AS 30), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām	–	1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3 lapu stadijas līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 13–32), nezāļu 2 lapu stadijā līdz to cerošanas fāzes beigām	–	1

106. Quelex

Reģ. Nr. 0641, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 100 g/kg,

metil-halauksifēns, 104.2 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025–0.050		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumiem līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 23–45). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.0250–0.0375		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 13–29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
		0.025–0.050		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30–45). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

107. Quick 50 EC

Reģ. Nr. 0429, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

*Sharda Europe b.v.b.a.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Gepard 50 EC**

Reģ. Nr. 0607, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

*Sharda Europe b.v.b.a.***Supero**

Reģ. Nr. 0587, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

*Sharda Europe b.v.b.a.***Graminis**

Reģ. Nr. 0592, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Sharda Europe b.v.b.a.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Labības – sārņaugi	0.75–1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar labību – sārņaugu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12–29)	–	1
	Īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12–29)		
	Daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpata (<i>Elytrigia repens</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu 4–6 lapu stadiju		

1	2	3	4	5	6	7

108. Rapsan 500 SC

Reģ. Nr. 0546, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metazahlors, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Globachem n.v.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00–09) vai pēc rapša sadīgšanas, līdz 8 lapu stadijai (AS 11–18) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu	–	1

109. Rapsan Plus

Reģ. Nr.0636, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlors, 333 g/l,

kvinmeraks, 83 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Globachem n.v.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	2.0–2.25		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00–09) vai pēc rapša sadīgšanas līdz 4 lapu stadijai (AS 10–14) nezāļu dīgšanas laikā vai vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	–	1

110. Roundup 60

Reģ. Nr. 0583, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 60 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Aizaugušu platību sagatavošana dārzeņu, augļu koku un ogu krūmu, puķu, dekoratīvo koku un krūmu stādīšanai, nezāļu ierobežošanas sakņu dārzā pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	40 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²		Apsmidzināt aktīvi augošanas nezāles. Vārpatai ir vismaz 3–6 lapas	–	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	60 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²				
Zāliena atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	60 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²		Apsmidzināt atjaunošanai paredzēto zālienu, kad nezāles ir aktīvi augošanas. Vārpatai vēlams vismaz 3–6 lapas	–	1

111. Roundup B

Reģ. Nr. 0516, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Aizaugušu platību sagatavošana dārzeņu, augļu koku un krūmu, puķu dekoratīvo koku un krūmu stādīšanai, nezāļu ierobežošanas sakņu dārzā pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	6 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²		Apsmidzināt aktīvi augošanas nezāles. Vārpatai ir vismaz 3–6 lapas	–	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	10 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²				



1	2	3	4	5	6	7
Zāliena atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	10 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²		Apsmidzināt atjaunošanai paredzēto zālienu, kad nezāles ir aktīvi augošas. Vārpatai vēlams vismaz 3–6 lapas	–	1
Celmi (koki), celmiņi (krūmi)		20 ml 80 ml ūdens	20 %	Apstrādāt ar darba šķidrumu koku celmu un krūmu celmiņu griezumā/ cirtuma vietu tūlīt pēc koku un krūmu nogriešanas/nociršanas	–	1
Platības, kuras piesārņotas ar Japānas sūreni	Japānas sūrene (<i>Fallopia japonica</i>)	20 ml 80 ml ūdens	20 %	Nogriezt augu apmēram 20 cm virs zemes. Tūlīt pēc nogriešanas ar pipetes palīdzību iepilināt tukšajā stumbrā 10 ml darba šķidruma	–	1

112. Roundup Flex

Reģ. Nr. 0462, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 480 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–3.00		Apsmidzināt kviešu, miežu, rudzu un tritikāles sējumus pirms pļaujas graudu pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–3.0		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Zirņi pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–3.00		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75 % no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Tirumi pēc ražas novākšanas	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25–3.00		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas. Augsnes apstrādi var sākt 10 dienas pēc smidzināšanas	–	1
Papuve	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas. Augsnes apstrādi var sākt 10 dienas pēc smidzināšanas	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.75		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām ir 3 lapas, vārpatai 3–6 lapas. Augsnes apstrādi var sākt 10 dienas pēc smidzināšanas		
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.25		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Smidzināt drīkst ne jaunākas, kā 2 gadus iestādītu augļu koku apdobs	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.75				
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.75		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Vārpatai vēlams 3–6 lapas apstrādes brīdī	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles, rudenī, kad skuju koku pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši un kokiem iestājies miera periods. Apsmidzināt, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus	–	1
	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.5				
Kokaudzētavas, mežs, pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā	–	1

113. Roundup Flick

Reģ. Nr. 0515, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Pirms kultūraugu sēšanas vai stādīšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–4.0		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles. Vārpatai jābūt vismaz 3–6 lapas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumus pirms plaušanas, graudu pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklīs ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Zirņi, pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75 % no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Tīrumi pēc ražas novākšanas	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Papuve	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām ir 3 lapas, vārpatai 3–6 lapas. Augsnes apstrādi var sākt 10 dienas pēc smidzināšanas	–	1
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Smidzināt drīkst apdobs augļu koki, kuri nav jaunāki par 2 gadiem. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	–	1–3

1	2	3	4	5	6	7
Ganību, pļavu atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	4.0–6.0		Apsmidzināt nezāles aktīvas augšanas perioda, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības (elektropārvides līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāls, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Vārpatai vēlamas 3–6 lapas apstrādes brīdī. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	–	1–3
Skuju koku jaunie stādījumi, Ziemassvētku eglītes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0		Apsmidzināt stādījumus veģetācijas periodā aktīvi augošanas nezāles. Apsmidzināt, aizsargājot jauno kociņu skuju un stumbrus. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	–	1–3
Ziemassvētku eglītes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.5		Apsmidzināt vienlaidus smidzinājumā rudenī, kad eglīšu pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši (pārkoksņējušies) un kociņiem iestāties miera periods. Kociņiem jābūt ne jaunākiem par 2 gadiem	–	1
Kokaudzētavas, mežs, pirms stādījumu ierīkošanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 6.0 l/ha	–	1–3
Celmu apstrāde	Koku celmi	–	20	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas, no novembra līdz martam	–	1

114. Roundup G

Reģ. Nr. 0517, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 120 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Aizaugušu platību sagatavošana dārzu, augļu koku un krūmu, puķu dekoratīvo koku un krūmu stādīšanai, nezāļu ierobežošanas sakņu dārzā pēc ražas novākšanas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	18 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²		Apsmidzināt aktīvi augošanas nezāles. Vārpatai ir vismaz 3–6 lapas	–	1
	Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²				
Zāliena atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30 ml/1 l ūdens, kuru izlieto uz 20 m ²		Apsmidzināt atjaunošanai paredzēto zālienu, kad nezāles ir aktīvi augošanas. Vārpatai vēlams vismaz 3–6 lapas	–	1
Celmi (koki), celmiņi (krūmi)		60 ml 40 ml ūdens	60 %	Apstrādāt ar darba šķidrumu koku celmu un krūmu celmiņu griezumā/ cirtuma vietu tūlīt pēc koku un krūmu nogriešanas/nociršanas	–	1
Platības, kuras piesārņotas ar Japānas sūreni	Japānas sūrene (<i>Fallopia japonica</i>)	60 ml 40 ml ūdens	60 %	Nogrieziet augu apmēram 20 cm virs zemes. Tūlīt pēc nogriešanas ar pipetes palīdzību iepilināt tukšajā stumbrā 10 ml darba šķidruma	–	1

1	2	3	4	5	6	7

115. Roundup Gel

Reģ. Nr. 0501, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 7.2 g/kg.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Platības, kur augi netiek audzēti lietošanai pārtikā (iebraucamie ceļi, gājēju celiņi, zāliens, dekoratīvo augu stādījumi)	Īsmūža nezāles	0.3 ml/ 0.3 m ²		Veikt atsevišķu augu apstrādi, nepieļaujot preparāta nokļuvi uz augiem, kurus nav paredzēts iznīcināt	–	3
	Daudzgadīgās nezāles	0.6 ml/ 0.3 m ²				

116. Roundup Gel Max

Reģ. Nr. 0625, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 72 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Platības, kur augi netiek audzēti lietošanai pārtikā (dekoratīvo augu stādījumi, sētmalas, žogmalas, neapstrādātas platības)	Grūti iznīcināmās daudzgadīgās nezāles, piem.: skābenes, nātres, dadži, usnes	0.3 ml/ 0.1200 cm ²		Veikt atsevišķu aktīvi augošu augu apstrādi, nepieļaujot preparāta nokļuvi uz augiem, kurus nav paredzēts iznīcināt. Jāapstrādā vismaz 30 % auga lapu virsmas	–	1
	Kokaugi – sārņaugi, kazenājs	0.6 ml/ 0.1200 cm ²				
Koku celmi, krūmu celmiņi	Novērst atvašu augšanu	0.3 ml/ 2–4 cm diametra celma		Pēc koku un krūmu nociršanas uzklāt preparātu visai celma virsmai	–	1

117. Roundup PowerMax

Reģ. Nr. 0519, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 720 g/kg.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Pirms kultūraugu sēšanas vai stādīšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–2.0		Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles. Vārpatai jābūt vismaz 3–6 lapas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt kviešu, miežu, tritikāles un auzu sējumus pirms plaušanas, graudu pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, sinepes, līni pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Zirņi, pupas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0–1.5		Apsmidzināt sējumus aptuveni 2 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75 % no pākstīm brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1



1	2	3	4	5	6	7
Tirumi pēc ražas novākšanas	Labības – sārņaugi, īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–2.5		Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas	–	1
Papuve	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, kad tām ir 3 lapas, vārpatai 3–6 lapas. Augsnes apstrādi var sākt 10 dienas pēc smidzināšanas	–	1
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Smidzināt drīkst apdabes augļu kokiem, kuri nav jaunāki par 2 gadiem. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 2.5 kg/ha	–	1–3
Ganību, pļavu atjaunošana	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5–3.0		Apsmidzināt nezāles aktīvās augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības (elektropārvides līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāls, ceļmalas, dzelzceļi)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–3.0		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā. Vārpatai vēlamas 3–6 lapas apstrādes brīdī. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 3.0 kg/ha	–	1–3
Skuju koku jaunie stādījumi, Ziemassvētku eglītes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–2.5		Apsmidzināt stādījumus veģetācijas periodā aktīvi augošās nezāles. Apsmidzināt, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Ziemassvētku eglītes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.75		Apsmidzināt vienlaidus smidzinājumā rudenī, kad eglīšu pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši (pārkoksņējušies) un kociņiem iestāties miera periods. Kociņiem jābūt ne jaunākiem par 2 gadiem	–	1
Kokaudzētavas, mežs (pirms stādījumu ierīkošanas)	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5–2.5		Apsmidzināt nezāles to aktīvās augšanas periodā. Maksimālais preparāta daudzums sezonā 2.5 kg/ha	–	1–3
Celmu apstrāde	Koku celmi	–	10	Apstrādāt tūlīt pēc nociršanas, no novembra līdz martam	–	1

118. Roundup Quick

Reģ. Nr. 0370, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 7.2 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.

Lietošanas vieta	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ 100 m ²	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Zem dekoratīvajiem kokiem un krūmiem, zem augļu kokiem, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, neapstrādātās platībās, l/s produkcijas ražošanai neizmantojamās platībās, kā arī veģetācijas ierobežošanai starp plātnēm uz taciņām un piebraucamiem ceļiem	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.33		Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas. Zem augļu kokiem neveikt smidzināšanu ražas nogatavošanās un novākšanas laikā	–	1

119. Roundup Ultra

Reģ. Nr. 0173, reģ. klase 2., iepakojumiem 1.0 l un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Nav selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un mizu.

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S

Tirumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 3–6 lapas un tās ir 10–15 cm garas	–	1
Papuves	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas	–	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0		Apsmidzināt kviešu, miežu un auzu sējumus pilngatavības stadijā 7 dienas pirms plaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Rapsis pirms plaujas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–3.0	2	Apsmidzināt rapša sējumus 14 dienas pirms plaujas, kad sēklu mitrums ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Ābeles, bumbieres	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Neapstrādāt augļu nogatavošanās un novākšanas laikā	–	1
Ķirši, plūmes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt pēc ražas novākšanas, kad nezāles ir aktīvi augošas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus	–	1
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles. Nevietā augoši koki un krūmi	3.0–6.0	2	Apsmidzināt nezāles, nevietā augošus krūmus un kokus aktīvas augšanas periodā	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Celmu apstrāde	Lietošanas mērķis – atvašu augšanas novēršana pēc nociršanas		20	Apstrādāt celmus tūlīt pēc krūmu vai koku nociršanas	–	1

120. Roxy 800 EC

Reģ. Nr. 0518, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: prosulfokarbs, 800 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un dzinum.

Globachem n.v.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	1.5–4.0		Apsmidzināt sējumus rudenī pirms nezāļu sadīgšanas, tūlīt pēc kultūrauga sējas līdz 3 lapu stadijai (AS 00–13)	–	1
Kartupeļi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles	4.0		Apsmidzināt stādījumu pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu sadīgšanas (AS 00–08)	42	1

121. Saracen

Reģ. Nr. 0471, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

*Nufarm GmbH & Co KG***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Mollo**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr.34, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: florasulams, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Synergy Generics Limited

Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas mieži,	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075–0.100		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075–0.100		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39)	–	1
Daudzgadīgās stiebrzāles sēklai	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075–0.150		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1
Ganības	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075–0.150		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	7	1

1	2	3	4	5	6	7

122. Saracen Delta

Reģ. Nr. 0493, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 50 g/l,
diflufenikans, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas mieži,	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20–29)	–	1
		0.100		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12–29)	–	1
		0.100		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32)		
Daudzgadīgās stiebrzāles sēklai	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.075–0.100		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32)	–	1

123. Sekator OD

Reģ. Nr. 0260, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: amidosulfurons, 100 g/l,
nātrija metil-jodosulfurons, 25 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles, tīruma usne	0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graud- augu karoglapas parādīšanās stadijai (AS 37)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži		0.10–0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot no graudaugu 3 lapu stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 13–37)	–	1

124. Starane 333 HL

Reģ. Nr. 0605, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluroksipirs, 333 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Dow AgroSciences Danmark A/S**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Spitfire 333 HL**

Reģ. Nr. 0606, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluroksipirs, 333 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.25–0.4		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sandzinumu stadiju līdz līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.1–0.3		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 13–45)	–	1
Kukurūza	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 13–16)	–	1

1	2	3	4	5	6	7

125. Starane XL

Reģ. Nr. 0277, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: florasulams, 2.5 g/l,
fluroksipirs, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġllapju nezāles	0.8–1.2		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġllapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20–45)	–	1
Auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġllapju nezāles	0.8–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39)	–	1
Ganības (ierīkošanas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġllapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20–45)	–	1
Ganības (2. gada un vecākas)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġllapju nezāles	1.5–1.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20–45)	7	1
Stiebrzāles* (sēklai, sējas gadā)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġllapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20–45)	–	1
Stiebrzāles* (sēklai)	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdiġllapju nezāles	1.5–1.8		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20–45)	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

126. Starship

Reģ. Nr. 0520, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Nufarm GmbH & Co KG

Kukurūza	Īsmūža divdiġllapju nezāles	0.75–1.0		<u>1.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus, sākot ar divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12–16)	–	1
	Parastā gaiļšāre (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	1.0–1.5				
	Īsmūža divdiġllapju nezāles, parastā gaiļšāre (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	0.75+0.75		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē: 1.reizi – kukurūzas 2–4 lapu stadijā (AS 12–14); 2.reizi – kukurūzas 4–8 lapu stadijā (AS 14–18). Intervāls starp apstrādēm 7–14 dienas	–	2

1	2	3	4	5	6	7

127. Stomp CS

Reģ. Nr. 0431, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: pendimetalīns, 455 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur saknēm un lapām.

SIA BASF

Vasaras kvieši, vasaras mieži ar āboliņa vai lucernas pasēju	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.73–0.88		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas līdz kultūrauga 1–2 lapu stadijai, kad āboliņš vai lucerna ir 1–2 lapu stadijā, maisījumā ar piemērotu preparātu	–	1
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18–4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži maisījumā ar zirņiem	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18–4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai	–	1
Sīpoli, ķiploki	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18–4.35		Apsmidzināt pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) vai izstādīšanas pirms kultūrauga dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4.35 l/ha	–	2
Burkāni, sakņu pētersīļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18–4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga dīgšanas	–	1
Kukurūza	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18–4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 5 cm) pirms kultūrauga dīgšanas	–	1
Lauka pupas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18–4.35		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga dīgšanas	–	1
Tulpes, narcises	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.63		Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas	–	1

128. Sultan 500 SC

Reģ. Nr. 0245, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metazahlors, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz rapša trīs lapu stadijai (AS 00–13), nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju	–	1

1	2	3	4	5	6	7

129. Sultan Super

Reģ. Nr. 0457, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor 375 g/l,
kvinmeraks, 125 g/l.Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un augsni.*ADAMA Registrations B.V.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Fuego Top**

Reģ. Nr. 0483, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metazahlor 375 g/l,
kvinmeraks, 125 g/l.Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur
lapām un augsni.*ADAMA Registrations B.V.*

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.75–2.0		Apsmidzināt sējumus pēc sējas līdz rapša 3 lapu stadijai (AS 00–13)	–	1

130.1. Taifun B

Reģ. Nr. 0027, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0		Apsmidzināt graudaugu sējumus pirms plaujas pilngatavības stadijā, kad mitruma saturs graudos ir zem 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	7	1
Zirņi (graudiem) pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	10	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini pirms ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	3.0–4.0		Apsmidzināt sējumus, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma saturs sēklās ir zemāks par 30 %. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus	14	1
Tirumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0–5.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām labi izveidota lapu virsma, ir 4–5 lapas un nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības		3.0–5.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām labi izveidota lapu virsma, ir 4–5 lapas un nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi		3.0–5.0	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām labi izveidota lapu virsma, ir 4–5 lapas un nezāles ir 10–20 cm garas	–	1
Augļu dārzi		3.0–5.0	2	Apsmidzināt rudenī pēc lapu nobiršanas vai veģetācijas laikā, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus	–	1

130.2. Taifun B

Reģ. Nr. 0027, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Vispārējs, sistēmas iedarbības herbicīds.

*ADAMA Registrations B.V.***Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Emin dārzam Taifun B**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 30, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: glifosāts, 360 g/l.

Vispārējs, sistēmas iedarbības herbicīds.

SIA "Emin dārzam"

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva ml/100 m ²	Ietei- camā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidī- šanas laiks, dienās	Maksimā- lais apstrā- žu skaits sezonā
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	20–50	2	Novākt augu atliekas pēc ražas novākšanas. Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad tām ir vismaz 4–5 lapas un tās ir sasnējušas 10–15 cm garumu	–	1
Papuves un lauksaimniecība neizmantojamās zemes	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30–50	2	Apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir izveidota lapu virsma un tās ir 10–20 cm garas	–	1
Skuju koku jaunie stādījumi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30–50	2	Apsmidzināt nezāles augustā, kad beidzas skuju koku augšanas fāze, aizsargājot jauno kociņu stumbrus	–	1
Augļu dārzi	Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	30–50	2	Apsmidzināt nezāles rindstarpās vai zem augļu kokiem veģetācijas periodā, kad nezāles aktīvi aug, kad tām ir izveidota lapu virsma un tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus. Augļu koku stādījumos smidzināšanu neveikt ražas nogatavošanās un novākšanas laikā	–	1

131. Tanaris

Reģ. Nr. 0579, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetēnamīds-P, 333 g/l, kvinmeraks, 167 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

SIA BASF**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Butisan Pro**

Reģ. Nr. 0629, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetēnamīds-P, 333 g/l, kvinmeraks, 167 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

SIA BASF

Ziemas rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5	1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00–09)	–	1
			2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18)		
Vasaras rapsis	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5	Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18)	–	1

132. Targa Super

Reģ. Nr. 0383, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P, 50 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība augi uzņem caur lapām.

Bayer AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25	Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	75	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.5-2.0	Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Cukurbietes, lopbarības bietes	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25	Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	-	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.5-2.0	Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	49	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.5-2.0		Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Burkāni	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	42	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		
Pupas*, zirņi*	Īsmūža viendīgļlapju nezāles, labības sārņaugi	0.75-1.25		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, sākot ar nezāļu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29)	45	1
	Ložņu vārpata (<i>Agropyron repens</i>)	1.5-2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad vārpata 15-20 cm augsta		

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

133. TBM 75 WG

Reģ. Nr. 0581, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 750 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Sharda Europe b.v.b.a.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Buster

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 40, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 750 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

ProEuro Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz trīs mezglu stadijai (AS 20–33)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.02		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz trīs mezglu stadijai (AS 12–33)	–	1

134. Temsa SC

Reģ. Nr. 0563, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm.

Globachem n.v.

Kukurūza	Parastā gaiļsāre, īsmūža divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12–18)	–	1

1	2	3	4	5	6	7

135. Teridox 500 EC

Reģ. Nr. 0051, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: dimetahlor, 500 g/l.

Selektīvs, sistēmas un augsnes iedarbība, augi uzņem caur dīgstiem un saknēm.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas – pirms nezāļu un kultūrauga sadiģšanas (AS 00–09). Pieļaujamais maksimālais darbīgās vielas dimetahlor daudzums ir 1 kg /ha reizi trijos gados tajā pašā laukā, neatkarīgi no lietotā preparāta, kura sastāvā ir dimetahlor.	–	1

136. Titus 25 d.g.

Reģ. Nr. 0059, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

DuPont Danmark ApS

Kartupeļi	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.03–0.05		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķīduma	–	1
		0.03 + 0.02		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2–4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7–10 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķīduma	–	2
Kukurūza	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.03–0.05		<u>1. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2–4 lapu stadijā. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķīduma	–	1
Kukurūza	Divdīgļlapju nezāles un ložņu vārpata	0.03 + 0.02		<u>2. lietošanas variants</u> Apsmidzināt sējumus kukurūzas 2–6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu – 2 īsto lapu stadijā, vārpata 2–4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7–10 dienām. Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l darba šķīduma	–	2

137. Tomahawk 200 EC

Reģ. Nr. 0536, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: fluroksipirs, 200 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ADAMA Registrations B.V.

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.5–0.7		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas (arī ar stiebrzāļu pasēju)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.45–0.60		Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga 2 lapu stadiju līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 12–45)	–	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles), zāliens, zāliens golfa laukumā	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.8		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, sākot ar stiebrzāļu 3 lapu stadiju līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 13–45)	7	1
Stiebrzāles sēklai (sējas gadā)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.45–0.6		Apsmidzināt sējumus pēc nezāļu sadīgšanas, sākot ar stiebrzāļu 2 lapu stadiju līdz 5 lapu stadijai (AS 12–15)	–	1

138. Tombo WG

Reg. Nr. 0335, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: piroksulams, 50 g/kg,
florasulams, 25 g/kg,
aminopirals, 50 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziema kvieši, tritikāle, rudzi	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.15		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21–29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
		0.20		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu		
Vasaras kvieši	Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.10–0.15		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21–32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

139. Tooler

Reg. Nr. 0284, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tritosulfurons, 714 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

SIA BASF

Ziema kvieši, ziema mieži, rudzi, tritikāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.07		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot no kultūrauga cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 21–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.05–0.07		Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

140. Trimmer 500 WG

Reg. Nr. 0469, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

ADAMA Registrations B.V.

Ziema kvieši, ziema mieži, ziema tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015–0.0225		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tītīkāle, auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.015– 0.0225		Apsmidzināt sējumus sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

141. Tripali

Reģ. Nr. 0551, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-metsulfurons, 83 g/kg,
metil-tribenurons, 83 g/kg,
florasulams, 105 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Cheminova A/S

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tītīkāle	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025–0.035		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasārī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Ziemas mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025–0.035		Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasārī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20–30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025–0.035		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Darba šķidr- umam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1
Auzas	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.025		Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20–30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu	–	1

142. Tristar 50 SG

Reģ. Nr. 0652, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām un saknēm.

Innvigo Sp. zo.o.

Ziemas kvieši, ziemas tītīkāle	Divdīgļlapju nezāles	0.03-0.04		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32)	-	1
Vasaras mieži	Divdīgļlapju nezāles	0.025-0.030		Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz viena mezgla stadijai (AS 20-31)	-	1

1	2	3	4	5	6	7

143. Zypar

Reģ. Nr. 0555, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 6.254 g/l,
florasulams, 5 g/l.

Selektīvs, sistēmas iedarbība, augi uzņem caur lapām.

Dow AgroSciences Danmark A/S

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5–0.75		Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar trīs sāndzinumiem līdz cerošanas beigām (AS 23–29)	–	1
		0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30–45)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Īsmūža divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus sākot ar trīs lapu stadiju līdz cerošanas fāzes beigām (AS 13–29)	–	1
		0.5–1.0		Apsmidzināt sējumus, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30–45)		
Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*	Latvāņi	1.0–2.0		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad latvāņi ataug un ir 20–30 cm augstumā (parasti aprīlis – maijs)	–	1
Ceļa malas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, mežmalas*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*	Latvāņi	2.0		Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Rozetes diametrs ir ap 20–25 cm	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

INSEKTIČĪDI UN AKARICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7

1. Actellic 50 EC

Reģ. Nr. 0170, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metilpirimifoss, 50 %.

Pieskares, elpošanas un zarnu indes iedarbība.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Tukšas noliktavu telpas, graudu pārstrādes uzņēmumu telpas un iekārtas	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis furinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plankis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), miltu ērce (<i>Tyroglyphus farinae</i>)	0.4 ml/m ²		Apsmidzināt, vienmērīgi nokļādot apstrādājamo virsmu. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš līdz 50 ml/m ²	3	1
Kviešu, miežu, tritikāles, auzu graudi lopbarībai un sēklai	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyralis furinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plankis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), ērces (<i>Acari</i>)	8 ml/t		Vienmērīgi apstrādāt graudu vai sēklu masu ar darba šķidrumu. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš līdz 5 l/t	–	1
Rudzu graudi sēklai, zālāju sēklas materiāls						

2. Avaunt

Reģ. Nr. 0418, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: indoksakarbis, 150 g/l.

Pieskares iedarbības insekticīds.

Cheminova A/S

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.17		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties, rapša ziedkopas attīstības laikā, sākot ar zaļo pumpuru stadiju līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 51–59)	56	1

3. Biscaya OD

Reģ. Nr. 0459, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tiakloprīds, 240 g/l.

Sistēmas iedarbība.

Bayer AG

Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>)	0.3		Apsmidzināt sējumus, parādoties kaitēkļiem, sākot ar zaļo pumpuru stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 51–69)	28	1
Zemenes* (atklātā laukā un sēgtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>)	0.3		Apsmidzināt, parādoties kaitēkļiem	3	1

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

4. Bulldock 025 EC

Reģ. Nr. 0090, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: beta-ciflutrīns, 25 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Nufarm GmbH & Co KG**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Baythroid**

Reģ. Nr. 0537, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: beta-ciflutrīns, 25 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Nufarm GmbH & Co KG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Ievu-auzu laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>), rožu-graudzāļu laputs (<i>Metopolophium dirhodum</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	21	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	28	2
Kāposti, puķukāposti u.c. krustziežu dzimtas dārzeņi	Kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), kāpostu pūcīte (<i>Barathra barassicae</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	7	2
Rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.2		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	56	2
	Krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasyneura brassicae</i>), krustziežu stublāju smecernieks (<i>Ceutorhynchus quadridens</i>), rapša stublāju smecernieks (<i>Ceutorhynchus napi</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties		
Cukurbietes	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	28	1
Ābeles	Ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	0.3		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	20	1

1	2	3	4	5	6	7

5. Ciperkils 500 e.k.

Reģ. Nr. 0385, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: cipermetrīns, 500 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Arysta LifeScience Benelux Sprl**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Syper**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 37, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: cipermetrīns, 500 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Synergy Generics Limited**Wizard 500 EC**

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 17, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: cipermetrīns, 500 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

ProEuro Sp. z o.o.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši, vasaras tritikāle, auzas	Labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphon padi</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), melnās stiebrmušas (<i>Oscinella spp.</i>), kviešu dzeltenā zāglapsene (<i>Pachynematus citellatus</i>)	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	28	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Svītrainais spradzis (<i>Phyllotreta nemorum</i>), rapša stublāju spradzis (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) smecernieki (<i>Ceutorhynchus napi</i> , <i>Ceutorhynchus quadridens</i>), krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia rosae</i>),	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	49	2
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), zirņu tinējs (<i>Cydia nigricana</i>)	0.05		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Galviņkāposti, ziedkāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia rosae</i>)	0.05		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	7	2
Sīpoli, puravi, ķiploki	Sīpolu lakstu puskode (<i>Acrolepiopsis assetcella</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.05		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, kaitēklim parādoties	7	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphis frangulae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0.05		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	7	2
Krāšņumaugi (līdz 50 cm augsti)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.1		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, kaitēklim parādoties	–	2

1	2	3	4	5	6	7
6. Decis Forte Reģ. Nr 0703, reģ. klase 2. Darbīgā viela: deltametrīns, 100 g/l. Pieskares un zarnu inde. Bayer AG						
Ziemas kvieši, ziemas mieži	Laputis (Aphididae), tripši (<i>Thysanoptera</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), kviešu dzeltenā zāglapsene (<i>Pachynematus clitellatus</i>)	0.0625		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	30	3
Ziemas tritikāle, rudzi, ziemas cietie kvieši	Laputis (Aphididae), tripši (<i>Thysanoptera</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), kviešu dzeltenā zāglapsene (<i>Pachynematus clitellatus</i>)	0.060		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	30	2
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Laputis (Aphididae), tripši (<i>Thysanoptera</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), kviešu dzeltenā zāglapsene (<i>Pachynematus clitellatus</i>)	0.0625		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	30	2
Vasaras rapsis, vasaras sinepes	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), krustziežu stublāju smecernieks (<i>Ceuthorhynchus quadridens</i>), krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.075		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	45	3
Ziemas rapsis, ziemas sinepes	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), krustziežu stublāju smecernieks (<i>Ceuthorhynchus quadridens</i>), krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.075		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	45	4*
Zirņi, lauka pupas, kāršu pupas	Pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), zirņu tinējs (<i>Cydia nigricana.</i>), zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), zirņu pangodiņš (<i>Contarinia pisi</i>)	0.075		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	7	2
Cukurbietes	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (Aphididae)	0.075		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	30	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Ziedkāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>)	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	7	3
Galviņkāposti, Briseles kāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>)	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	7	2
Burkāni, pastinaki, mārutki	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>), pūcītes (<i>Noctuidae</i>)	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	21	3
Sīpoli lokiem	Alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>)	0.06		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	3	3
Puravi	Alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>), pūcītes (<i>Noctuidae</i>)	0.06		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	3	3
Kāļi, rāceņi	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>)	0.075		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	30	1
Salāti (atklātā laukā)	Ipsilona pūcīte (<i>Agrotis ipsilon</i>)	0.0625		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	7	3
Tomāti, gurķi (segtās platības)	Laputis (<i>Aphididae</i>), vaboles (<i>Coleoptera</i>), lapu blusīņas (<i>Psyllidae</i>), siltumnīcu baltblusīņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	17.5 ml/100 l ūdens		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	7	3
Paprika (segtās platības)	Laputis (<i>Aphididae</i>), vaboles (<i>Coleoptera</i>), lapu blusīņas (<i>Psyllidae</i>), siltumnīcu baltblusīņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	12.5 ml/100 l ūdens		Apsmidzināt kaitēklim parādotes	7	3
Ābeles, bumbieres	Laputis (<i>Aphididae</i>), lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Tmetocera ocellana</i> , <i>Argyroplote variegana</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>), ābolu zāglapsene (<i>Hoplocampa testudinea</i>)	0.0875 vai augstajiem kokiem 5 ml/100 l ūdens		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	7	1
Avenes	Avenāju vabole (<i>Byturus tomentosus</i>)	0.125		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	7	3
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi (atklātā laukā un segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), vaboles (<i>Coleoptera</i>), lapu blusīņas (<i>Psyllidae</i>), siltumnīcu baltblusīņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	17.5 ml/100 l ūdens		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	-	3

* viena reize rudenī un 3 reizes pavasarī /vasarā

1	2	3	4	5	6	7
7. Decis Mega Reģ. Nr. 0310, reģ. klase 2. Darbīgā viela: deltametrīns, 50 g/l. Pieskares un zarnu inde. Bayer AG						
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Tripši (<i>Thysanoptera</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), kviešu stiebru pangodiņš (<i>Haplodiplosis equestris</i>), kviešu dzeltenā zāglapsene (<i>Pachynematus clitellatus</i>) Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.125–0.150 0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), zirņu tinēji (<i>Laspeyresia spp.</i>), zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus spp.</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.125–0.150		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.10–0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	20	2
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, kāļi	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididea</i>)	0.125–0.150		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	14	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	30	2
Krāšņumaugi (atklātā laukā)	Cikādes (<i>Eupteryx collina</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	–	2
	Laputis (<i>Ahididae</i>)	0.25		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	–	
Ābeles, bumbieres	Laputis (<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis devector</i> , <i>Anuraphis subterranea</i>), lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Tmetocera ocellana</i> , <i>Argyroplote variegana</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>), ābolu zāglapsene (<i>Hoplocampa testudinea</i>)	0.15–0.25		Apsmidzināt, kaitēklim parādotes	30	2

1	2	3	4	5	6	7

8. Delmetros 100 SC

Reģ. Nr. 0675, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: deltametrīns, 100 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

Innvigo Sp. z o.o.

Ziemas kvieši	Labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>)	0.05		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	30	1
Vasaras mieži	Labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>)	0.05		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	30	1
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.05		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	7	1
Ziemas rapsis	Rapša stublāju spradzis (<i>Psylliodes chrysocephala</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceuthorrhynchus assimilis</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.05		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	45	41
Galviņkāposti*	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.05		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	14	1

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

9. Envidor

Reģ. Nr. 0550, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: spiroidiklofēns, 240 g/l.

Insekticīds, akaricīds.

Pieskares iedarbība.

Bayer AG

Ābeles	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>), sarkanā augļu koku tīklērcē (<i>Panonychus ulmi</i>), ābeļu rūsērcē (<i>Aculus schlechtendali</i>), komatveida bruņuts (<i>Lepidosaphes ulmi</i>)*	0.2–0.6		Apsmidzināt stādījumus, parādotes kaitēklīm, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 51–57) vai sākot ar ziedēšanas beigām līdz laikam, kad augļiem izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 69–85)	14	1
Bumbieres	Bumbieru lapu blusiņa (<i>Cacopsylla pyri</i>), parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>), sarkanā augļu koku tīklērcē (<i>Panonychus ulmi</i>), ābeļu rūsērcē (<i>Aculus schlechtendali</i>), komatveida bruņuts (<i>Lepidosaphes ulmi</i>)*, bumbieru lapu pangērcē (<i>Eriophyes pyri</i>)*	0.2–0.6		Apsmidzināt stādījumus, parādotes kaitēklīm, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 51–57) vai sākot ar ziedēšanas beigām līdz laikam, kad augļiem izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 69–85)	14	1



1	2	3	4	5	6	7
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>), zemeņu ērce (<i>Phytonemus pallidus</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumus, parādoties kaitēkļiem, pavasari līdz redzami atsevišķi zaļie pumpuri (AS 57) vai pēc ražas novākšanas: 1) kad jaunstādi no cera apsakņojušies un gatavi stādīšanai (AS 49) vai 2) kad sāk veidoties jaunās lapas līdz veco lapu atmiršanas sākumam (AS 91–93)	–	1
Dekoratīvie augi*, izņemot rozes (atklātā laukā un segtais platībās, ieskaitot stād- audzētavas)	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties kaitēkļiem. Kopējais pieļaujamais maksimālais preparāta daudzums sezonā 0.6 l/ha	–	2
Augļu koku* stādi, ogulāju* stādi, stādaudzētavās (atklātā laukā un segtās platībās)	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus un stādījumus, parādoties kaitēkļiem. Kopējais pieļaujamais maksimālais preparāta daudzums sezonā 0.6 l/ha	–	2
Krūm- cidonijas*	Parastā tīklērcē (<i>Teranychus urticae</i>), ābeļu rūsērcē (<i>Aculus schlechtendali</i>)	0.2–0.6		Apsmidzināt stādījumu, parādoties kaitēkļiem, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 51–57) vai sākot ar ziedēšanas beigām līdz augļiem izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 69–85)	14	1
Ķirši*	Parastā tīklērcē (<i>Teranychus urticae</i>),	0.4–0.6		Apsmidzināt stādījumu, parādoties kaitēkļiem, sākot ar ziedēšanas beigām līdz augļiem izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 69–85)	14	1
Plūmes*, aprikozes*, persiki*	Parastā tīklērcē (<i>Teranychus urticae</i>), sarkanā augļu koku tīklērcē (<i>Panonychus ulmi</i>), plūmju lapu pangērcē (<i>Aculus fockeui</i>)	0.2–0.6		Apsmidzināt stādījumu, parādoties kaitēkļiem, sākot ar ziedēšanas beigām līdz augļiem izveidojies raksturīgais augļa krāsojums (AS 69–85)	14	1
Jānogas*, upenes*	Parastā tīklērcē (<i>Teranychus urticae</i>), upeņu pumpurērcē (<i>Cecidophypsis ribis</i>), komatveida bruņuts (<i>Lepidosaphes ulmi</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumu, parādoties kaitēkļiem, sākot ar ziedēšanas beigām līdz ogu nogatavošanās vidum (AS 69–85)	14	1
Krūm- mellenes*	Parastā tīklērcē (<i>Teranychus urticae</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumu, parādoties kaitēkļiem, sākot ar ziedēšanas beigām līdz ogu gatavošanās sākumam (AS 69–81)	14	1
Avenes*, kazesnes*	Parastā tīklērcē (<i>Teranychus urticae</i>)	0.4		Apsmidzināt stādījumu, parādoties kaitēkļiem, pēc ražas novākšanas.	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Tomāti*, gurķi*, paprika* (segtās platībās)	Parastā tīklēce (<i>Teranychus urticae</i>)	0.24–0.48		Apsmidzināt stādījumu, parādotes kaitēkļiem	3	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

10. Fastac 50

Reģ. Nr. 0250, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: alfa-cipermetrīns, 50 g/l.

Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.

SIA BASF

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Kestac 50

Reģ. Nr. 0251, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: alfa-cipermetrīns, 50 g/l.

Pieskares un zarnu inde, repelenta iedarbība.

SIA BASF

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Spradži (<i>Phyllotreta</i> <i>spp.</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), laputis (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādotes	14	
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Tripši (<i>Limothrips</i> <i>denticornis</i> , <i>Anaplothrips</i> <i>aculeatus</i>)	0.2–0.4		Pret tripšiem lietot graudaugu stiebrošanas stadijā, pirms vārpošanas	14	2
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella</i> <i>frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Pret melno stiebrmušu apsmidzināt sējumus labības 1.5–2 lapu stadijā	14	
Rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta</i> <i>spp.</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus</i> <i>rapae</i> , <i>Ceutorhynchus</i> <i>sulcicollis</i> , <i>Ceutorhynchus</i> <i>assimilis</i>), krustziežu spidulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādotes	14	2
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphis frangulae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i>)	0.2–0.4			14	2
Lucerna	Lucernas smecernieks (<i>Phytonomus</i> <i>transsylvanicus</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona</i> <i>lineatus</i>), laputis (<i>Aphis</i> <i>fabae</i> , <i>Acyrtosiphon</i> <i>pisum</i>), lucernas blakts (<i>Adelphocoris lineolatus</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādotes	14	3
Cukurbietes, lopbarības bietes	Biešu spradzis (<i>Chaetocnema concina</i>), biešu mušas (<i>Pegomya betae</i> , <i>P. hyoscyami</i>), laputis (<i>Aphis</i> <i>fabae</i>)	0.2–0.4			14	3
Āboliņa sēklu lauki	Smecernieki (<i>Apium</i> <i>spp.</i> , <i>Sitona</i> <i>spp.</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādotes	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	Graudzāļu ērce (<i>Siteroptes graminum</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus pavasarī, tikko stiebrzāles sadīgušas	–	1
	Timotiņa muša (<i>Amaurosome flavipes</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	–	1
	Melnā stiebrmuša (<i>Oscinella frit</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 1.5–2 lapu stadijā	–	1
Lini	Tripsis (<i>Frankliniella intonsa</i>), melnais linu spradzis (<i>Longitarsus parvulus</i>), zilais linu spradzis (<i>Aphthona euphorbiae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	3
Kukurūza	Melnās stiebrmušas (<i>Oscinella frit</i> , <i>Oscinella pusilla</i>)	0.4		Apsmidzināt sējumus, kukurūzas 1.5–2 lapu fāzē	14	1
Kāposti, ziedkāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcite (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>), laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	14	2
Zirņi, pupas	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>)	0.2–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	21	2
Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	0.3–0.4			14	2
Burkāni, ķīmenes	Burkānu lapu blusiņa (<i>Trioza viridula</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kultūrauga pirmā īsto lapu pāra stadijā	14	1
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	Lapu tinēji (<i>Archips rosana</i> , <i>Olethreutes variegana</i> , <i>Spilonota ocellana</i>), laputis (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), ābeļu lapu blusiņa (<i>Psylla mali</i>), ābeļu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus pomorum</i>), ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	0.4–0.5		Apsmidzināt augļu kokus, kaitēklim parādoties	14	2
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (atklātā laukā)	Tripsi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>)	0.4–0.6		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	14	3
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi (segtās platībās)	Tripsi (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Thrips flavus</i>), laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aulacorthum circumflexum</i>), alotājmuša (<i>Liriomyza bryoniae</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4.0–6.0 ml/100m ²		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	3	3
Avenes, zemenes, jānogas	Aveņu ziedu smecernieks (<i>Anthonomus rubi</i>), laputis (<i>Cryptomyzus ribis</i> , <i>Aphis grossulariae</i> , <i>Aphis schneideri</i>), avenāju vabole (<i>Byturus tomentosus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Sīpoli, puravi, ķiploki	Sīpolu lakstu kode (<i>Acrolepia assectella</i>), sīpolu ziedmuša (<i>Eumerus strigatus</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	14	2
Sakņu dārzeni	Pūcītes (<i>Autographa gamma</i> , <i>Mamestra oleracea</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i> , <i>Chaetocnema concinna</i>), biešu muša (<i>Pegomya betae</i>), krustziežu zāglapsene (<i>Athalia colibri</i>)	0.3–0.4		Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14	2
Dilles sēklai	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4			–	1
Sakņu pētersīļi	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.2–0.4			14	1
Zāliens golfa laukumā	Maijvabole (<i>Melolontha melolontha</i>), jūnijvabole (<i>Amphimallon solstitialis</i>), jūlijvabole (<i>Anomala aenea</i>), dārza vabole (<i>Phyllopertha horticola</i>), sprakšķi (<i>Agriotes spp.</i>), skudras (<i>Lasiu sp.</i> , <i>Myrmica sp.</i>)	0.4		Apsmidzināt zālienu, kaitēklim parādoties	–	3
Noliktavu telpu dezinfekcija	Smecernieki (<i>Sitophilus spp.</i>), miltu sviļņi (<i>Ephestia kuehniella</i> , <i>Pyrallis farinalis</i>), mazais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), zobkakla plankanis (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	0.4 ml/m ²		Darba šķidruma patēriņš 200 ml/m ²	20	1
Skuju koki kokaudzētavās	Priežu smecernieks (<i>Hylobius abietis</i> , <i>Hylobius pinastri</i>)		2.5–3.5 (0.25–0.35 l uz 10 l ūdens)	Iemērt stādus darba šķidrumā pirms stādīšanas	–	1
Skuju koki kokaudzētavās	Priežu vērpējs (<i>Dendrolimus pini</i>), egļu mūķene (<i>Lymantria monacha</i>), rūsganā priežu zāglapsene (<i>Neodiprion sertifer</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	–	1
Lapu koki kokaudzētavās	Mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>), ozolu tinējs (<i>Tortrix viridana</i>)	0.2–0.3			–	1
Koksne	Egļu astonzobu mizgrauzis (<i>Ips typographus</i>)		1–3 (0.1–0.3 l uz 10 l ūdens)	Apsmidzināt koksni krautuvēs, rūpīgi noklājot virsmu. Darba šķidruma patēriņš 250 ml/m ²	–	1

11. Fibro

Reģ. Nr. 0460, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: parafinēļļa, 797 g/l.

Fizikāla iedarbība.

Belchim Crop Protection NV

Kartupeļi	Kartupeļu vīruss (PVY) (vīrusu pārnēsā laputis (<i>Aphidodea</i>))	10		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, sākot no to sadīgšanas līdz vienu nedēļu pirms lakstu desikācijas. Atkārtoti pēc 7 dienām	–	8
Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	Sarkanā augļu koku tīklēce (<i>Panonychus ulmi</i>)	20–30	2	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, ja atrastas ziemojošas kaitēkļa olas, sākot no zaļā konusa stadijas līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 09–57) sēkļiem un no pumpuru plaukšanas līdz kauslapu atvēršanās stadijai kauleņaugiem (AS 53–57)	–	1

1	2	3	4	5	6	7
Bumbieres	Bumbieru lapu blusiņa (<i>Cacopsylla pyri</i>)	20–30	2	1. lietošanas variants Apsmidzināt stādījumus, kad konstatētas kaitēkļa olas, sākot no pumpuru plaukšanas līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 53–57)	–	1
		20	2	2. lietošanas variants Apsmidzināt stādījumus, kad konstatētas kaitēkļa olas, sākot no pumpuru plaukšanas līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 53–57). Ja nepieciešams, veikt otru smidzinājumu ar 2 dienu atstarpi	–	2

12. Fury 100 EW

Reģ. Nr. 0256, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: zeta-cipermetrīns, 100 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

FMC Chemical, sprl**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Satel 100 EW**

Reģ. Nr. 0613, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: zeta-cipermetrīns, 100 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

FMC Chemical, sprl

Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, tritikāle, rudzi, auzas	Ievu-labību laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>), labību laputs (<i>Macrosiphum avenae</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema melanopus</i> , <i>Oulema lichenis</i>)	0.10		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	28	2
	Vārpu pangodiņi (<i>Sitodiplosis mesellana</i> , <i>Contarinia tritici</i>)	0.15				
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i> , <i>Psylliodes chrysocephala</i>), krustziežu spidulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.10		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	42	2
Karupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.10		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	7	2
Cukurbietes	Pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.10		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14	2

13. Granprotec

Reģ. Nr. 0664, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: deltametrīns, 25 g/l.

Pieskares un zarnu iedarbība.

Sharda Cropchem España S.L.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksi - mālais apstrāžu skaits sezonā
Mieži, rudzi, auzas, sorgo, prosa, kukurūza	Graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), miltu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>), Austrālijas kviešu smecernieks (<i>Rhyzopertha dominica</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Ephesia kuehniella</i>)	10-20 ml/t		Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar darba šķidrumu profilaktiski, ievietojot noliktavā vai parādies kaitēkļiem. Darba šķidruma patēriņš 1 l/t.	-	1

1	2	3	4	5	6	7

14. Kaiso 50 EG

Reģ. Nr. 0381, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: lambda-cihalotrīns, 50 g/kg.

Pieskares un zarnu inde.

Nufarm GmbH & Co KG

Kartupeļi	Laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis nasturtii</i> , <i>Aphis frangulae</i>), kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	14	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle	Laputis (<i>Aphididae</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema melanopus</i> , <i>Oulema lichenis</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Smecernieki (<i>Ceutorhynchus assimilis</i> , <i>C. napi</i> , <i>C. quadridens</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasyneura brassicae</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), rapša stublāju spradzis (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	49	1

15. Karate Zeon 5 CS

Reģ. Nr. 0207, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: lambda-cihalotrīns, 50 g/l.

Insekticīds.

Pieskares un zarnu inde.

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)	0.1		Apsmidzināt, kaitēklīm parādoties	28	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Laputis (<i>Aphididae</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema spp.</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), melnās stiebrmušas (<i>Oscinella spp.</i>)	0.15–0.20			35	1
Cukurbietes	Biešu muša (<i>Pegomya betae</i>), biešu spradzis (<i>Chaetocnema concinna</i>), biešu kapracis (<i>Blitophaga opaca</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.15			28	1
Zirņi	Tumšais zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), smecernieki (<i>Sitona spp.</i>)	0.15			28	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus spp.</i>)	0.10–0.15		Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	28	2
	Krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.15				

1	2	3	4	5	6	7
Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti	Krustziežu spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	0.15		Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	14	1
Ābeles, bumbieres	Smecernieki (<i>Anthonomus pomorum</i> , <i>Phyllobius spp.</i>), tinēji (<i>Tortricidae</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), ābeļu lapu blusiņa (<i>Psylla mali</i>), mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>)	0.4–0.5			28	2
Plūmes, ķirši	Smecernieki (<i>Phyllobius spp.</i>), plūmju augļu tinējs (<i>Cydia funebrana</i>), zāglapsenes (<i>Hoplocampa spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), mazais salnas sprīžmetis (<i>Operophtera brumata</i>)	0.4			28	1
Lucernas un āboliņa sēklu lauki	Laputis (<i>Aphididae</i>), smecernieki (<i>Apion spp.</i> , <i>Sitona spp.</i> , <i>Phytonomus spp.</i>)	0.15			28	1
Rozes, krizantēmas, gerberas, primulas, lilijas, petūnijas, atraitnītes	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)		0.05	Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklim parādoties	–	2
Skuju koki kokaudzētavās un jaunaudzēs (ne vecākās par 1–3 gadiem)	Sprīžmeši (<i>Geometridae</i>), tinēji (<i>Tortricidae</i>), priežu pūcīte (<i>Panolis flammea</i>), priežu sprīžotājs (<i>Bupalus piniarius</i>), egļu mūķene (<i>Lymantria monacha</i>), lielais priežu smecernieks (<i>Hylobius abietis</i>)	0.1			–	1
Lapu koki kokaudzētavās un jaunaudzēs (ne vecākās par 1–3 gadiem)	Sprīžmeši (<i>Geometridae</i>), tinēji (<i>Tortricidae</i>)	0.1		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	–	1
Koksne	Egļu astoņzobu mizgrauzis (<i>Ips typographus</i>)	2.5–5.0 ml/m ²		Apsmidzināt koksni krautuvēs. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 250 ml/m ² koksnes	–	1
Noliktavas	Maizes ķermis (<i>Stegobium panicea</i>), miltu melnulis (<i>Tenebrio molitor</i>), graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), miltu raibais svilnis (<i>Pyrallis farinalis</i>)	0.4 ml/m ²		Apstrādāt tukšas noliktavu telpas. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 200 ml/m ²	2	1
Noliktavu teritorija	Maizes ķermis (<i>Stegobium panicea</i>), miltu melnulis (<i>Tenebrio molitor</i>), graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), miltu raibais svilnis (<i>Pyrallis farinalis</i>)	0.8 ml/m ²		Apstrādāt teritoriju ap noliktavām līdz 5 m platumā tīlīt pēc noliktavu apstrādes. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš 400 ml/m ²	2	1

1	2	3	4	5	6	7

16. K-Obiol

Reģ. Nr. 0394, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: deltametrīns, 25 g/l.

Pieskares un zarnu iedarbība.

Bayer A/S

Graudi	Graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), miltu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>), Austrālijas kviešu smecernieks (<i>Rhyzopertha dominica</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephylus surinamensis</i>), pupu smecernieks (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)	10–20 ml/t		Apstrādāt graudu masu vienmērīgi ar darba šķidrumu profilaktiski, ievietojot noliktavā vai parādoties kaitēkļiem. Darba šķidruma patēriņš 0.5–1.5 l/t	42	1
Tukšas noliktavu telpas	Graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), miltu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>), Austrālijas kviešu smecernieks (<i>Rhyzopertha dominica</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephylus surinamensis</i>), pupu smecernieks (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), svilnis (<i>Ephesia cautella</i>)	60 ml/100 m ²		Apsmidzināt, vienmērīgi nokļājot apstrādājamo virsmu. Darba šķidruma patēriņš gludas virsmas apstrādei – 5 l/100m ² , nelīdzenas virsmas apstrādei – 10 l/100m ²	–	1

17. MAGTOXIN TABLET

Reģ. Nr. 0111, reģ. klase 1.

Darbīgā viela: magnija fosfids, 66 %.

Insekticīds, akaricīds.

Elpošanas inde.

Detia Degesch GmbH

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena, t.sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Produkcija, krava, kravas raksturojums	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Minimālais ekspozīcijas ilgums, dienas	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, pupas*, zirņi*, lupīna*, soja*, linsēklas*, kukurūza*, saulespuķu sēklas*, rapsis*, (pārtikai, lopbarībai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sīkais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāvēto augļu svilnis (<i>Plochia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sīkais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	5 g/PH ₃ /m ³ (5 tabletes/m ³)	Iedarbības laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas, temperatūras, mitruma. Zem 5 °C – neveikt fumigāciju 5–12 °C – 10 d; 13–15 °C – 5 d; 16–20 °C – 4 d; 21–25 °C – 3 d; virs 25 °C – 2 d.	Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas.	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Nepieļaut tablešu un to pēc lietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar produkciju, kas tiks lietota pārtikā vai lopbarībā. Pārtikā un lopbarībā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas
Dārza pupiņas*, rīsi*, sorgo*, prosa*, griķi*, rieksti*, kakao pupiņas*, kafijas pupiņas*, kaltēti augi*, kaltētas sēnes*, žāvēti dārzeni*, žāvēti augļi*		5 g/PH ₃ /m ³ (5 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Telpas blīvi noslēgt. Nepieļaut tablešu un to pēc lietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar produkciju, kas tiks lietota pārtikā. Pārtikā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas

1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, pupas*, dārza pupiņas*, zirņi*, lupīna*, soja*, linsēklas*, griķi*, kukurūza*, saulespuķu sēklas*, rapsis*, zālaugu sēklas* (sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granarius</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i> , sīkais miltu planknis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāvēto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sīkais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	5 g/PH ₃ /m ³ (5 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes ievadīt produkcijas masā ar speciālām zondēm. Telpas blīvi noslēgt.
Tukšas noliktavu telpas		5 g/PH ₃ /m ³ (5 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpās. Telpas blīvi noslēgt.
Iesaiņoti pārtikas produkti*		2–3 g/PH ₃ /m ³ (2–3 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks 48 h atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt. Nogaidīšanas laiks 7 dienas
Kokvilna* ķīpās un saiņos, tabaka iesaiņota	Noliktavu kaitēkļi un citi kaitēkļi	5 g/PH ₃ /m ³ (5 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt.
Apalīgie kokmateriāli* (zāģbaļķi, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka), zāģmateriāli*, koksnes un kokmateriālu izstrādājumi*, iesaiņojamie materiāli*, starplikas*, šķelda*, mulča* (sasmalcināta koku miza, koksne), kūdra*	Koksnes kaitēkļi*	2–3 g/PH ₃ /m ³ (2–3 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt.

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

18.1. Mavrik

Reģ. Nr. 0526, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 240 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

ADAMA Registrations B.V.**Analogie augu aizsardzības līdzekļi:****Evure**

Reģ. Nr. 0577, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 240 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

ADAMA Registrations B.V.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi	Labību lapgrauzis (<i>Oulema melanopus</i>), labību laputs (<i>Sitobion avenae</i>), kviešu stiebru pangodiņš (<i>Haplodiplosis marginata</i>), kviešu vārpu pangodiņš (<i>Contarinia tritici</i>), kviešu ziedu oranžais pangodiņš (<i>Sitodiplosis mosellana</i>), ievu-labību laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>), rudzu tripsis (<i>Limothrips denticornis</i>), kāpostu tripsis (<i>Thrips angusticeps</i>)	0.15–0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	3; maksimāli 1 reize rudenī un maksimāli 2 reizes pavasarī
Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas	Labību lapgrauzis (<i>Oulema melanopus</i>), labību laputs (<i>Sitobion avenae</i>), kviešu stiebru pangodiņš (<i>Haplodiplosis marginata</i>), kviešu vārpu pangodiņš (<i>Contarinia tritici</i>), kviešu ziedu oranžais pangodiņš (<i>Sitodiplosis mosellana</i>), ievu-labību laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>), rudzu tripsis (<i>Limothrips denticornis</i>), kāpostu tripsis (<i>Thrips angusticeps</i>)	0.15–0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas rapsis, vasaras rapsis	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), kāpostu tripsis (<i>Thrips angusticeps</i>), krustziežu sēklu smecernieks (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), rapšu stublāju smecernieks (<i>Ceutorhynchus napi</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasineura brassicae</i>)	0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	60	2
Zirņi (zaļiem zirņiem)	Zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), tumšais zirņu tinējs (<i>Cydia nigricana</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.15–0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	7	2
Zirņi (graudiem)	Zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), tumšais zirņu tinējs (<i>Cydia nigricana</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.15–0.2		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	2

1	2	3	4	5	6	7
Pupas (graudiem)	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	0.15–0.2		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	14	2
Kartupeļi	Persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>), pabērzu laputs (<i>Aphis nasturtii</i>), kartupeļu laputs (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.15–0.2		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	7	2
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>), kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0.2–0.3		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	7	1
Krāšņumaugi* (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), lapu blusiņas (<i>Psyllidae</i>), vaboles (<i>Coleoptera</i>)	0.15–0.2		Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	–	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

18.2. Mavrik

Reģ. Nr. 0526, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 240 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

ADAMA Registrations B.V.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Emin dārzam Mavrik Vita

Paralēlās tirdzniecības atļauja Nr. 31, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 240 g/l.

Pieskares un zarnu inde.

SIA “Emin dārzam”

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva ml/10 l ūdens	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Zirņi (zaļiem zirņiem)	Zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), tumšais zirņu tinējs (<i>Cydia nigricana</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	6	Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	7	2
Zirņi (graudiem)	Zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), tumšais zirņu tinējs (<i>Cydia nigricana</i>), svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	6	Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	14	2
Pupas (graudiem)	Svītrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>)	6	Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	14	2
Kartupeļi	Persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>), pabērzu laputs (<i>Aphis nasturtii</i>), kartupeļu laputs (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6	Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	7	2
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti	Spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>), kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	8	Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	7	1
Krāšņumaugi* (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), lapu blusiņas (<i>Psyllidae</i>), vaboles (<i>Coleoptera</i>)	6	Apsmidzināt, kaitēklīm parādotes	–	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7
19.1. NeemAzal-T/S						
Reģ. Nr. 0241, reģ. klase 2.						
Darbīgā viela: azadiraktīns-A, 10 g/l.						
Insekticīds, akaricīds.						
Sistēmas un zarnu inde.						
Trifolio-M GmbH						
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	2.5		Apsmidzināt stādījumus, parādotes 1.–2. vecuma kāpuriem	4	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i> , <i>Tuta absoluta</i>), tiklērce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnicu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i> , <i>Tuta absoluta</i>), tiklērce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnicu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	3
Pipari (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tiklērce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnicu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	3
Galviņ- kāposti*, Briseles kāposti*, Savojas kāposti*	Kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), kāpostu pūcite (<i>Barathra brassicae</i>), balteņi (<i>Pieris spp.</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tiklērce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnicu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	14	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tiklērce (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnicu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	14	3
Spināti*, skābenes, portulaki, lapu bietes* (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnicu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	7	2
Ābeles, cidonijas*	Laputis (<i>Aphididae</i>), sprīžmeši (<i>Geometridae</i>), augļu koku sarkanā tiklērce (<i>Panonychus ulmi</i>)*	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus pirms un pēc ziedēšanas, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	14	2
Vinogulāji* (neražojoši stādījumi, dēstu un mātes augu stādījumi)	Laputis (<i>Aphididae</i>), majivaboles (<i>Melolontha spp.</i>)	2.0–3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādotes pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	–	3

1	2	3	4	5	6	7
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi, izņemot skujkokus (atklātā laukā un segtās platībās)	Alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>), šaurspārnu kodes (<i>Gracilaridae</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), tīklērces (<i>Tetranychidae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	3.0		Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	–	2
Ozoli*	Maijvaboles (<i>Melolontha spp.</i>)	3.0		Apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

19.2. NeemAzal-T/S

Reģ. Nr. 0241, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: azadiraktīns-A, 10 g/l.

Insekticīds, akaricīds.

Sistēmas un zarnu inde.

Trifolio-M GmbH

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Darba šķidruma deva: l/100 m ²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.5	5	Apsmidzināt stādījumus, parādoties 1.–2. vecuma kāpuriem	4	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i> , <i>Tuta absoluta</i>), tīklērces (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4–6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	2
Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (segtais platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i> , <i>Tuta absoluta</i>), tīklērces (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4–6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	3
Pipari (segtais platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tīklērces (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4–6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	3
Galviņkāposti*, Briseles kāposti*, Savoņas kāposti*	Kāpostu laputis (<i>Brevicoryne brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>), kāpostu pūcīte (<i>Barathra brassicae</i>), balteņi (<i>Pieris spp.</i>)	0.5	4–6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	3	2
Garšaugi*, izņemot maurlokus (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tīklērces (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4–6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	14	2
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6	7
Garšaugi*, izņemot maurlokus (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4–6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	14	3
Spināti*, skābenes, portulaki, lapu bietes* (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5	4–6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	7	2
Ābeles, cidonijas*	Laputis (<i>Aphididae</i>), sprīžmeši (<i>Geometridae</i>), augļu koku sarkanā tīklērcē (<i>Panonychus ulmi</i>)*	0.3	10	Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	14	2
Vinogulāji* (neražojoši stādījumi, dēstu un mātes augu stādījumi)	Laputis (<i>Aphididae</i>), maiļvaboles (<i>Melolontha spp.</i>)	0.5	4–6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	–	3
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi, izņemot skujkokus (atklātā laukā un segtās platībās)	Alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>), šaurspārnu kodes (<i>Gracilaridae</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), tīklērces (<i>Tetranychidae</i>)*, tripši (<i>Thysanoptera</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.3–0.5	0.3 % – 9; 0.5 % – 6	Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t. i., apsmidzināt 1.–2. vecuma kāpurus	–	2
Ozoli*	Maiļvaboles (<i>Melolontha spp.</i>)	0.3	10	Apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā	–	1

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

1	2	3	4	5	6	7

20. PHOSTOXIN TABLET

Reģ. Nr. 0112, reģ. klase 1.

Darbīgā viela: alumīnija fosfīds, 56 %.

Insekticīds, akaricīds.

Elpošanas inde.

Detia Degesch GmbH

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena t.sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Produkcija, krava, kravas raksturojums	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Minimālais ekspozīcijas ilgums, dienas	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, pupas, zirņi, rapsis, lupīna*, soja*, linsēklas*, kukurūza*, saulespuķu sēklas* (pārtikai, lopbarībai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sikais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāveto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sikais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	5 g – 10 g/PH ₃ /m ³ (5–10 tabletes/m ³)	Iedarbības laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas, temperatūras, mitruma. Zem 5 °C – neveikt fumigāciju 5–12 °C – 10 d; 13–15 °C – 5 d; 16–20 °C – 4 d; 21–25 °C – 3 d; virs 25 °C – 2 d;	Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas.	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Nepieļaut tablešu un to pēc lietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar produkciju, kas tiks lietota pārtikā vai lopbarībā. Pārtikā un lopbarībā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas
Žāvēti dārzeņi, žāvēti augļi, dārza pupiņas*, rīsi*, sorgo*, prosa*, griķi*, rieksti*, kakao pupiņas*, kafijas pupiņas*, kaltēti augi*, kaltētas sēnes*	Žāvēti dārzeņi, žāvēti augļi, dārza pupiņas*, rīsi*, sorgo*, prosa*, griķi*, rieksti*, kakao pupiņas*, kafijas pupiņas*, kaltēti augi*, kaltētas sēnes*	5 g – 10 g/PH ₃ /m ³ (5–10 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabēruma virsotnē. Telpas blīvi noslēgt. Nepieļaut tablešu un to pēc lietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar produkciju, kas tiks lietota pārtikā. Pārtikā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, pupas, rapsis, zirņi, dārza pupiņas*, lupīna*, soja*, linsēklas*, griķi*, kukurūza*, saulespuķu sēklas*, zālaugu sēklas* (sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sikais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāveto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sikais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	5 g – 10 g/PH ₃ /m ³ (5–10 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes ievadīt produkcijas masā ar speciālām zondēm. Telpas blīvi noslēgt
Tukšas noliktavu telpas	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sikais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāveto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sikais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	5 g – 10 g/PH ₃ /m ³ (5–10 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpās. Telpas blīvi noslēgt
Iesaiņoti pārtikas produkti*	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sikais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāveto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sikais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	2 g – 3 g/PH ₃ /m ³ (2–3 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks 48 h atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt. Nogaidīšanas laiks 7 dienas

1	2	3	4	5	6
Kokvilna* ķīpās un saiņos, tabaka iesaiņota	Noliktavu kaitēkļi un citi kaitēkļi	5 g – 10 g/PH ₃ /m ³ (5–10 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt
Apalje kokmateriāli* (zāģbalki, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka), zāģmateriāli*, koksnes un kokmateriālu izstrādājumi*, iesaiņojamie materiāli*, starplikas*, šķelda*, mulča* (sasmalcināta koku miza, koksne), kūdra*	Koksnes kaitēkļi*	2g – 3 g/PH ₃ /m ³ (2–3 tabletes/m ³)		Telpas atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas. Vēdināšanas laiks atkarīgs no apstrādājamās telpas konstrukcijas	Tabletes vienmērīgi izvietot telpā. Telpas blīvi noslēgt
Graudi kuģu tilpnēs (kvieši, mieži, rudzi, auzas, tritikāle, kukurūza)	Noliktavu kaitēkļi	3g – 5 g/PH ₃ /m ³ (3–5 tabletes/m ³)	21 diena	Tilpnes atver un vēdina pēc fumigācijas veikšanas	Tabletes vienmērīgi izvietot kravas virspusē. Tilpnes blīvi noslēgt. Pārtikā un lopbarībā izmantojamajai produkcijai – nogaidīšanas laiks 7 dienas

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

21. Proteus OD

Reģ. Nr. 0275, reģ. klase 2.

Darbīgās vielas: tiakloprīds, 100 g/l,
deltametrīns, 10 g/l.

Pieskares, sistēmas un zarnu inde.

Bayer AG

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Laputis (<i>Aphididae</i>), lapgrauzis (<i>Oulema lichenis</i> , <i>Oulema melanopus</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>)	0.6–0.75		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	1
Kartupeļi	Kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.5–0.75		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	3
	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.6–0.75				
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>), smecernieki (<i>Ceutorhynchus spp.</i> , <i>C. quadridens</i> , <i>C. napi</i> , <i>C. pallidactylus</i> , <i>C. assimilis</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasyneura brassicae</i>), spradži (<i>Phyllotreta spp.</i>), laputis (<i>Aphididae</i>)	0.6–0.75		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	45	2
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Laputis (<i>Aphididae</i>), spradži (<i>Chaetocnema concinna</i> , <i>Phyllotreta spp.</i>), biešu muša (<i>Pegomya hyoscyami</i>)	0.6–0.75		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	2
Kukurūza	Laputis (<i>Aphididae</i>), apiņu svilnis (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	0.6–0.75		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	30	1

1	2	3	4	5	6	7
Pupas*	Laputis (<i>Aphididae</i>), svitrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), pupu sēklgrauzis (<i>Brunchus rufimanus</i>)	0.75		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	7	2
Zirņi*	Tumšais zirņu tinējs (<i>Laspeyresia nigricana</i>), svitrainais zirņu smecernieks (<i>Sitona lineatus</i>), laputis (<i>Aphididae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Brunchus pisorum</i>)	0.75		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	7	2
Galviņ-kāposti*, ziedkāposti*, brokoļi*, Briseles kāposti*	Kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>), persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>), kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcite (<i>Mamestra brassicae</i>), kāpostu cekulkode (<i>Plutella maculipennis</i>)	0.75		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	7	2
Zemenes* (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.75		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	3	2
Zemenes* (atklātā laukā)	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.75		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	7	2
Avenes*	Aveņu lielās laputis (<i>Amphorophora idaei</i> , <i>Amphorophora rubi</i>), aveņu mazā laputs (<i>Aphis idaei</i>), laputis (<i>Aphis ruborum</i> , <i>Sitobium fragariae</i>)	0.75		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādoties	3	2

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

22. Quickphos pellets 56 GE

Reģ. Nr. 0504, reģ. klase 1.

Darbīgā viela: alumīnija fosfīds, 56 %.

Insekticīds.

Elpošanas inde.

UPL Europe Ltd.

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena, t.sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Apstrādājama- mais objekts	Kaitīgais organisms	Deva	Ekspozīcijas laiks	Vēdināšana	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (sabērumā, torņos) (pārtikai, lopbarībai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Brunchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sīkais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāvēto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sīkais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	20–25 granulas/t	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3–8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Novietojiet granulas uz nedegošiem paliktniem sabēruma virsotnē. Nepieļaut granulu un to pēclietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar graudiem, kas tiks lietoti pārtikā vai lopbarībā. Pārtikā un lopbarībā izmantojamiem graudiem – nogaidīšanas laiks 7 dienas

1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (sabērūmā, torņos) (sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), žāgzobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sikais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāvēto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sikais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	20–25 granulas/t	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3–8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Granulas ievadīt graudu masā ar speciālām zondēm vai, ievērojot noteiktu intervālu, ievadīt graudu plūsmā graudu iebēršanas laikā
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (iesaiņoti) (pārtikai, lopbarībai, sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), žāgzobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sikais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāvēto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sikais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	20–25 granulas/m ³	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3–8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Granulas izvieto vienmērīgi un brīvi starp vai gar produkta iepakojumiem, lai nesaskaras ar apstrādājamo produktu. Pārtikā un lopbarībā izmantojamiem graudiem – nogaidīšanas laiks 7 dienas

23. Quickphos tablets 56 GE

Reģ. Nr. 0505, reģ. klase 1.

Darbīgā viela: alumīnija fosfids, 56 %.

Insekticīds.

Elpošanas inde.

UPL Europe Ltd.

Lietošanas veids: gāzēšana pie atmosfēras spiediena t.sk. zem gāzes necaurlaidīgiem segumiem.

Apstrādājama objekts	Kaitīgais organisms	Deva	Ekspozīcijas laiks	Vēdināšana	Piezīmes
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (sabērūmā, torņos) (pārtikai, lopbarībai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), žāgzobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sikais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāvēto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sikais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	4–5 tb/t	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3–8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Novietojiet tabletes uz nedegošiem paliktņiem sabērūmā virsotnē. Nepieļaut tablešu un to pēclietošanas atlieku nonākšanu tiešā kontaktā ar graudiem, kas tiks lietoti pārtikā vai lopbarībā. Pārtikā un lopbarībā izmantojamiem graudiem – nogaidīšanas laiks 7 dienas

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (sabērumā, torņos) (sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sīkais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāvēto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sīkais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	4–5 tb/t	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3–8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Tabletes ievadīt graudu masā ar speciālām zondēm vai, ievērojot noteikto intervālu, ievadīt graudu plūsmā graudu iebēršanas laikā
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, prosa, sorgo, zirņi (iesaiņoti) (pārtikai, lopbarībai, sēklai)	Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks (<i>Sitophilus granaries</i>), rīsu graudu smecernieks (<i>Sitophilus oryzae</i>), zirņu sēklgrauzis (<i>Bruchus pisorum</i>), zāgžobu graudu vabole (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), sīkais miltu plakanis (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), žāvēto augļu svilnis (<i>Plodia interpunctella</i>), pelēkais miltu svilnis (<i>Anagasta kuehniella</i>), sīkais miltu melnulis (<i>Tribolium confusum</i>), graudu vabole (<i>Tribolium castaneum</i>)	4–5 tb/m ³	Iedarbības laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas, temperatūras, mitruma: vismaz 3–8 dienas	Ventilēšanas laiks atkarīgs no ēkas konstrukcijas	Tabletes izvieto vienmērīgi un brīvi starp vai gar produkta iepakojumiem, lai nesaskaras ar apstrādājamo produktu. Pārtikā un lopbarībā izmantojamiem graudiem – nogaidīšanas laiks 7 dienas

24. Teppeki

Reģ. Nr. 0699, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: flonikamīds, 500 g/kg.

Sistēmas iedarbība.

ISK Biosciences Europe N.V.

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši	Labību laputs (<i>Sitobion avenae</i>), rožu -graudzāļu laputs (<i>Metopolophium dihodum</i>), ievu-auzu laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>)	0.10-0.14		Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai piengatavībai (AS 21-77)	28	2
Ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Labību laputs (<i>Sitobion avenae</i>), rožu -graudzāļu laputs (<i>Metopolophium dihodum</i>), ievu-auzu laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>)	0.10-0.14		Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai piengatavībai (AS 21-77)	28	1
Zirņi (zaļie bez pākstīm)	Zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>), persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>)	0.14		Apsmidzināt sējumus, kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga 6 lapu stadiju līdz pākstis sasnējušas 10% no izmēra (AS 16-71)	14	1
Kartupeļi	Persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>), pabērzu laputs (<i>Aphis nasturtii</i>), kartupeļu laputs (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), krūkļu laputs (<i>Aphis frangulae</i>)	0.16		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādoties, sākot ar bumbuļu briešanas sākumu līdz bumbuļu briešanas beigām (AS 40-49)	21	2
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1	2	3	4	5	6
Ābeles, bumbieres	Ābeļu zaļā laputs (<i>Aphis pomi</i>), rožu-ābeļu laputs (<i>Dysaphis plantaginea</i>), bumbieru madaru laputs (<i>Dysaphis pyri</i>)	0.14		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādotes, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augli sasnieguši apmēram pusi no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 51-75)	21 3
Ķirši*	Persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>), ķiršu-madaru laputs (<i>Myzus cerasi</i>)	0.14		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādotes, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz auglaizmetņu attīstības sākumam (AS 51-71)	14 2
Plūmes*	Laputis (<i>Aphididae</i>), plūmjū-niedru laputs (<i>Hyalopterus pruni</i>), plūmju-apiņu laputs (<i>Phorodon humuli</i>)	0.14		Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādotes, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz auglaizmetņu attīstības sākumam (AS 51-71)	21 2
Galviņ - kāposti*, Briseles kāposti*	Kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>), kāpostu baltblusiņa (<i>Aleyrodes proletella</i>)	0.14		Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādotes, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi 50% no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 13-45)	14 2
Krāšņumaugi*	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.14		Apsmidzināt, kaitēkļiem parādotes	- 3

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

25. Vertimec 018 EC

Reģ. Nr. 0296, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: abamektīns, 18 g/l.

Lokāla sistēmas, pieskares un zarnu inde.

Syngenta Crop Protection AG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Gurķi, cukini, tomāti, paprika (segtās platībās)	Parastā tīklēce (<i>Tetranychus urticae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i> , <i>Phytomyza spp.</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>), tabakas tripsis (<i>Thrips tabaci</i>)	1.2		Apsmidzināt augus, parādotes pirmajiem kaitēkļiem, ja nepieciešams, atkārtoti apsmidzina pēc 7 dienām	3	2
Salāti (segtās platībās)	Alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i>), tīklēces (<i>Tetranychus spp.</i>), tripsi (<i>Thrips spp.</i>)	0.5		Apsmidzināt augus, parādotes pirmajiem kaitēkļiem, ja nepieciešams, atkārtoti apsmidzina pēc 7 dienām	12	4
Zemenes (segtās platībās)	Ērces (<i>Acari</i>), parastā tīklēce (<i>Tetranychus urticae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.2		Apsmidzināt augus, parādotes pirmajiem kaitēkļiem, ja nepieciešams, atkārtoti apsmidzina pēc 7 dienām	3	3
Krāšņumaugi (segtās platībās)	Parastā tīklēce (<i>Tetranychus urticae</i>), alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i> , <i>Phytomyza spp.</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>), tabakas tripsis (<i>Thrips tabaci</i>), ērces (<i>Acari</i>)	1.2		Apsmidzināt augus, parādotes pirmajiem kaitēkļiem, ja nepieciešams, atkārtoti apsmidzina pēc 7 dienām	-	2

LIMACĪDI

1. Ferramol

Reģ. Nr. 0395, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 9.9 g/kg.

Limacīds.

W. Neudorff GmbH KG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/m ²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras, zāliens	Milzu kailgliemezis (<i>Limax maximus</i>), raibais mīkstgliemezis (<i>Deroceras reticulatum</i>), tūruma mīkstgliemezis (<i>Deroceras agreste</i>), Spānijas kailgliemezis (<i>Arion vulgaris</i>)	5	Ēsmas granulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājuma pazīmes	–	4

2.1. Gusto

Reģ. Nr. 0489, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metaldehīds, 30 g/kg.

Limacīds.

ADAMA Registrations B.V.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	6.0	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajam bojājuma pazīmēm, pēc graudaugu sējas līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 00–29). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	–	2
Ziemas rapsis, vasaras rapsis, kukurūza, cukurbietes, lopbarības bietes, zirņi (graudiem), pupas (graudiem), sīpoli, šalotes sīpoli, tomāti (atklātā laukā un segtās platībās), baklažāni (atklātā laukā un segtās platībās)	Mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	6.0	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajam bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz tā 9 lapu stadijai (AS 00–19). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	–	2
Kartupeļi	Mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	6.0	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajam bojājumu pazīmēm, pēc kartupeļu stādīšanas līdz kultūrauga stublāju atmiršanas beigām (AS 00–97). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	3	2

1	2	3	4	5	6
Zirņi, pupas (svaigam patēriņam)	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	6.0	Apstrādi veic parādotes kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc zirņu sējas līdz kultūrauga ziedkopas veidošanās fāzes sākumam (AS 00–50). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	28	2
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)		Apstrādi veic, parādotes kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc kultūrauga sējas vai stādīšanas līdz galviņas vai ziedkopas veidošanās sākumam (AS 00–41). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	3	2
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	6.0	Apstrādi veic parādotes kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, no kultūrauga ataugšanas sākuma līdz cera centrā redzams ziedkopas pumpurs (AS 00–55). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	–	2
Dekoratīvo augu un krāšņumaugu sējumi un stādījumi, krāšņumaugu stādi, meža kultūru stādi, augļu koku un ogulāju stādi stādaudzētavās	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	6.0	Apstrādi veic, parādotes kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm visu veģetācijas periodu. Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	–	2

2.2. Gusto

Reģ. Nr. 0489, reģ. klase 3. – 1 kg iepakojumiem un mazākiem.

Darbīgā viela: metaldehīds, 30 g/kg.

Limacīds.

ADAMA Registrations B.V.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/100 m ²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lopbarības bietes, zirņi (graudiem), pupas (graudiem), sīpoli, šalotes sīpoli, tomāti (atklātā laukā un segtās platībās), baklažāni (atklātā laukā un segtās platībās)	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	60	Apstrādi veic, parādotes kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz tā 9 lapu stadijai (AS 00–19). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6
Kartupeļi	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	60	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc kartupeļu stādīšanas līdz kultūrauga stublāju atmiršanas beigām (AS 00–97). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	3	2
Zirņi, pupas (svaigam patēriņam)	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	60	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc zirņu sējas līdz kultūrauga ziedkopas veidošanās fāzes sākumam (AS 00–50). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	28	2
Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	60	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, pēc kultūrauga sējas vai stādīšanas līdz galviņas vai ziedkopas veidošanās sākumam (AS 00–41). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	3	2
Zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	60	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm, no kultūrauga ataugšanas sākuma līdz cera centrā redzams ziedkopas pumpurs (AS 00–55). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	–	2
Dekoratīvo augu un krāšņumaugu sējumi un stādījumi, krāšņumaugu stādi, meža kultūru stādi, augļu koku un ogulāju stādi stādaudzētavās	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	60	Apstrādi veic, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm visu veģetācijas periodu. Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–14 dienām	–	2

3. Ironmax Pro

Reģ. Nr. 0630, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dzelzs fosfāts, 24.2 g/kg.

Līmacīds.

De Sangosse S.A.S.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas, zirņi pupas, pupiņas, rapsis, ripsis, lini, saulespuķes, soja, sinepes, kaņepes, ķirbji	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00–89). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4

1	2	3	4	5	6
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes, kāļi, rāceņi, burkāni, selerijas (sakņu), redīsi	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga četru lapu stadijai (AS 00–14). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4
Sīpoli, ķiploki, ziedkāposti, brokoļi, galviņkāposti, Briseles kāposti	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00–49). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4
Selerijas (lapu, kātu), puravi, vasaras sīpoli	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00–49). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4
Zirņi, pupas, pupiņas (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00–79). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4
Kukurūza (lopbarībai), saldā kukurūza	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00–85). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4
Salāti, spināti, garšaugi (atklātā laukā un segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sēja līdz ražas novākšanai (AS 00–49). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4
Ganības (sējas gadā)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt ganības sējas gadā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ganīšanas sākumam	–	4

1	2	3	4	5	6
Gurķi, kabači, cukini, melones, arbūzi	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz ražas novākšanai (AS 00–89). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4
Tomāti, paprika, baklažāni (segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sēja līdz ražas novākšanai (AS 00–89). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4
Zāliens	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt zālienu, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājumu pazīmēm jebkurā laikā sezonā. Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 5 dienām	–	4

4.1. Lima Oro

Reģ. Nr. 0568, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg.

Limacīds.

Sharda Europe b.v.b.a.

Analogie augu aizsardzības līdzekļi:

Limgol

Reģ. Nr. 0586, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg.

Limacīds.

Sharda Europe b.v.b.a.

Meridian

Reģ. Nr. 0569, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg.

Limacīds.

Sharda Europe b.v.b.a.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksi- mālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc graudaugu sējas līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 00–29). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sāndzinumu veidošanas fāzes beigām (AS 00–29). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2
Kukurūza	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kukurūzas sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00–15). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2
Salāti	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc salātu sējas līdz kultūrauga deviņu lapu stadijai (AS 00–19). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2
Ābeles, bumbieres	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01–69). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2
Jānogas, upenes, ērķšķogas, avenes, kazenes	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mīkstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7.0	Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01–69). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6
Dekoratīvās kultūras, zāliens	<i>Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.)</i>	7.0	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas stādījumā vai sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, kultūrauga veģetācijas periodā (AS 00–99). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2
Ganības (ierīkošanas gadā), zālājs (ierīkošanas gadā)	<i>Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.)</i>	7.0	Apstrādāt sējumu vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00–15). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2

4.2. Lima Oro

Reģ. Nr. 0568, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: metaldehīds, 50 g/kg.

Limacīds.

Sharda Europe b.v.b.a.

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, g/100 m ²	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Salāti	<i>Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.)</i>	70	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas sējumā vai stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc salātu sējas līdz kultūrauga deviņu lapu stadijai (AS 00–19). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2
Kukurūza	<i>Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.)</i>	70	Apstrādāt kultūraugu sējumus vai arī atsevišķas vietas sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, pēc kukurūzas sējas līdz kultūrauga piecu lapu stadijai (AS 00–15). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2
Ābeles, bumbieres	<i>Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.)</i>	70	Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01–69). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2

1	2	3	4	5	6
Jānogas, upenes, ērkšķogas, avenes, kazenes	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	70	Apstrādāt kultūraugu stādījumu vai arī atsevišķas vietas stādījumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, veģetācijai atsākoties līdz kultūrauga ziedēšanas beigām (AS 01–69). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2
Dekoratīvās kultūras, zāliens	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	70	Apstrādāt kultūraugu platības vai arī atsevišķas vietas stādījumā vai sējumā, parādoties kaitīgajam organismam vai pirmajām bojājuma pazīmēm, kultūrauga veģetācijas periodā (AS 00–99). Ja nepieciešams, atkārtotu apstrādi veic pēc 7–10 dienām	–	2

5. SLUXX^{HP}

Reģ. Nr. 0396, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts, 29.7 g/kg.

Limacīds.

W.Neudorff GmbH KG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras (atklātā laukā un segtās platībās)	Kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>), mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>)	7	Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā	–	4

REPELENTI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6

1. Cervacol extra

Reģ. Nr. 0337, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: kvarca smiltis, 251 g/kg.

Repelents.

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Skuju koki, lapu koki	Aļņi, staltbrīži, stirnas	2.0–3.0 kg/1000 kociņiem	Apstrādāt jauno kociņu gala dzinumus jaunaudzēs	–	1

2.1. Detia Wühlmausgas

Reģ. Nr. 0584, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: kalcija karbīds, 800 g/kg.

Repelents.

Detia Freyberg GmbH

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības kultūras, dekoratīvās kultūras, pļavas, ganības	Ūdensšurka (<i>Arvicola terestris</i>)	5 g uz alu/eju	Ievieto nepieciešamo preparāta daudzumu katrā alas vai ejas atverē, kuru pēc tam nekavējoties noslēdz	–	Pēc nepieciešamības
	Kurmīšs (<i>Talpa europaea</i>)	20 g/ uz alu/eju			

2.2. Detia Wühlmausgas

Reģ. Nr. 0584, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: kalcija karbīds, 800 g/kg.

Repelents.

Detia Freyberg GmbH

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības kultūras, dekoratīvās kultūras, pļavas, ganības	Ūdensšurka (<i>Arvicola terestris</i>)	5 g (1 maisiņš) uz alu/eju	Ievieto nepieciešamo preparāta daudzumu katrā alas vai ejas atverē, kuru pēc tam nekavējoties noslēdz.	–	Pēc nepieciešamības
	Kurmīšs (<i>Talpa europaea</i>)	20 g (4 maisiņi) uz alu/eju			

3. Plantskydd

Reģ. Nr. 0274, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: žāvēti asiņu milti, 990 g/kg.

Repelents.

Plantskydd AB

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Skuju koki, jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos	Aļņi, staltbrīži, stirnas, zaķi	0.8–1.6 kg/1000 kociņiem	Apsmidzināt jauno skuju kociņu galotnes ar darba šķidrumu. Darba šķidruma patēriņš 5.0–10.0 litri uz 1000 kociņiem	–	2
Lapu koki jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos	Aļņi, staltbrīži, stirnas, zaķi	0.8–1.6 kg/1000 kociņiem	Apsmidzināt visu jauno kociņu ar darba šķidrumu. Darba šķidruma patēriņš 5.0–10.0 litri uz 1000 kociņiem	–	2

1	2	3	4	5	6

4. Trico

Reģ. Nr. 0435, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: aitu tauki, 65 g/l.

Repelents.

Kwizda Agro GmbH

Ziemas rapsis, vasaras rapsis, kukurūza, saulespuķes	Staltbrieži, stirnas	15	Apsmidzināt sējumus, sākot no divu lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 12–61)	–	4
Lapu koku, skuju koku audzes	Staltbrieži, stirnas, aļņi	10–20	Apsmidzināt stādījumus rudenī, lai aizsargātu koku audzes ziemā	–	1
			Apsmidzināt stādījumus pavasarī, lai aizsargātu koku audzes vasarā		1
Vīnogas (ražojoši stādījumi)	Staltbrieži, stirnas	10–15	Apsmidzināt stādījumus, sākot no vīnogu trīs lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–61)	75	2
Vīnogas (jauni, neražojoši stādījumi)			Apsmidzināt stādījumus, sākot no vīnogu trīslapu stadijas (AS 13)	–	2
Apiņi	Staltbrieži, stirnas	10–15	Apsmidzināt stādījumus, sākot no apiņu trešā lapu pāra stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 13–61)	–	3
Melnais plūškoks	Staltbrieži, stirnas	10–15	Apsmidzināt stādījumus, sākot no jauno dzinumu veidošanās sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 31–61)	–	3

5. WAM extra

Reģ. Nr. 0482, reģ. klase 2., iepakojumiem 2.5 kg un mazākiem, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: kvarca smiltis, 300 g/kg.

Repelents.

Witasek PflazenSchutz GmbH

Skuju koki, lapu koki	Staltbrieži, stirnas	2.5–4.0 kg/1000 kociņiem	Apstrādāt jaunus kociņus jaunaudzēs	–	1

6. Wöbra

Reģ. Nr. 0575, reģ. klase 3.

Darbīgā viela: kvarca smiltis, 480 g/kg.

Repelents.

Flügel GmbH

Apstrādājамie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Skuju koki, lapu koki	Brieži (<i>Cervus spp.</i>), dambrieži (<i>Dama spp.</i>)	180–400 g/koku	Apstrādāt visu koka stumbru noteiktā augstumā ar otu, kā arī citas augu daļas, kuras var būt pakļautas bojājumiem	–	1
	Bebrs (<i>Castor fiber</i>)	180–250 g/koku			
Augļu koki	Brieži (<i>Cervus spp.</i>), dambrieži (<i>Dama spp.</i>)	18–400 g/koku	Apstrādāt visu koka stumbru noteiktā augstumā ar otu, kā arī citas augu daļas, kuras var būt pakļautas bojājumiem	–	1
	Zaķi (<i>Lepus spp.</i>), trusis (<i>Oryctolagus cuniculus</i>), bebrs (<i>Castor fiber</i>)	18–250 g/koku			
Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi	Bebrs (<i>Castor fiber</i>), zaķi (<i>Lepus spp.</i>), trusis (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	18–250 g/koku, krūmu	Apstrādāt visu koka stumbru vai krūmu zarus noteiktā augstumā ar otu, kā arī citas augu daļas, kuras var būt pakļautas bojājumiem	–	1

RODENTICĪDI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6

1. Polytanol

Reģ. Nr. 0363 reģ. klase 2.

Darbīgā viela: kalcijs fosfīds, 18 %.

Rodenticīds.

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Lauksaimniecības kultūras, dekoratīvās kultūras	Ūdensžurka (<i>Arvicola terrestris</i>)	8–10 kg/ha vai 8–10 g uz alu/eju	Ar speciālu iestrādes ierīci ievieto nepieciešamo preparāta daudzumu katrā alas vai ejas atverē, kuru pēc tam nekavējoties noslēdz ar augsni	–	2

MIKROBIOLOĢISKIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšana
1	2	3	4	5

1. Mycostop

Reģ. Nr. 0480, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: mikroorganisms *Streptomyces* strain K61.*Danstar Ferment AG*

Kāposti, sīpoli, puravi, garšaugi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>)	8 g/kg	Sēklu apstrāde, slēgtā traukā rūpīgi sakratīt vai sajaukt ar preparātu. Apstrādātās sēklas izsēt apstrādes dienā vai vēlākais 1 nedēļu pēc apstrādes	1 g preparāta satur 5×10^8 mikroorganisma veidojošo vienību. Uzglabāšana vienu gadu sausā vietā un temperatūrā, kas ir zemāka par $+8^\circ\text{C}$ un istabas temperatūrā viens mēnesis
Salāti, gerberas		2 g/kg		
Lapu dārzeņi, sakņu dārzeņi, tomāti, pipari, gurķi, pākšaugi, krāšņumaugi		5 g/kg		
Augļu dārzeņi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>)	2–10 g/100 m ²	1. <u>lietošanas panēmiens</u> Piesūcināt substrātu pēc pārstādīšanas. Apliet kultūraugus pēc pārstādīšanas. Apsmidzināt substrāta virsmu pēc dēstu izstādīšanas. Atkārtoti pēc 3–6 nedēļām, līdz 4 reizēm veģetācijas periodā	
		5–20 g/1000 augiem	2. <u>lietošanas panēmiens</u> Pēc pārstādīšanas veikt apstrādi, izmantojot pilienlaistīšanu. Atkārtoti pēc 3–6 nedēļām, līdz 4 reizēm veģetācijas periodā	
Lapu dārzeņi, garšaugi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>)	1–10 g/1 m ³	Iestrādāt substrātā pirms kultūrauga sējas	1 g preparāta satur 5×10^8 mikroorganisma veidojošo vienību. Uzglabāšana vienu gadu sausā vietā un temperatūrā, kas ir zemāka par $+8^\circ\text{C}$ un istabas temperatūrā viens mēnesis
		2–10 g/100 m ²	1. <u>lietošanas panēmiens</u> Pēc kultūrauga sadīgšanas/pārstādīšanas veikt substrāta apstrādi. Atkārtoti pēc 3–6 nedēļām, līdz 3 reizēm veģetācijas periodā	
		1 g/1000 augiem	2. <u>lietošanas panēmiens</u> Audzēšana hidroponikā. Apstrādi veic, pievienojot barības vielu šķīdumam pēc pārstādīšanas	
Krāšņumaugi (podos, grieztajiem ziediem)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>)	1–10 g/m ³	Iestrādāt substrātā pirms kultūrauga sējas	1 g preparāta satur 5×10^8 mikroorganisma veidojošo vienību. Uzglabāšana vienu gadu sausā vietā un temperatūrā, kas ir zemāka par $+8^\circ\text{C}$ un istabas temperatūrā viens mēnesis



1	2	3	4	5
Krāšņumaugi (podos, grieztajiem ziediem)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>)	1–10 g/100 m ²	<u>1. lietošanas panēmiens</u> Pēc kultūrauga sadīgšanas /pārstādīšanas veikt substrāta apstrādi. Atkārtoti pēc 3–6 nedēļām, līdz 4 reizēm veģetācijas periodā	1 g preparāta satur 5×10^8 mikroorganisma veidojošo vienību. Uzglabāšana vienu gadu sausā vietā un temperatūrā, kas ir zemāka par +8 °C, un istabas temperatūrā viens mēnesis
Krāšņumaugu spraudēņi	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>)	2–10 g/1000 augiem	<u>2. lietošanas panēmiens</u> Pēc pārstādīšanas veikt apstrādi, izmantojot pilienlaistīšanu. Atkārtoti pēc 3–6 nedēļām, līdz 4 reizēm veģetācijas periodā	
Sīpoli	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>)	0.01 %	Apsakņotu stādu iemērkšana preparāta suspensijā veicot pārstādīšanu/ podošanu. 0.01 % – 1 g /10 l ūdens	
Dārzu, krāšņumaugu dēsti	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>), dēstu melnkāja (<i>Pythium spp.</i>)	0.01 %	Pirms izstādīšanas iemērk uz 15 minūtēm preparāta suspensijā. 0.01 % – 1g/10 l ūdens	
		1–10 g/m ³	Substrāta apstrāde – iestrādāt substrātā pirms kultūrauga sējas	
		2–10 g/100 m ²	Apsmidzināt substrāta virsmu pēc kultūraugu sadīgšanas. Atkārtoti ar 21 dienas intervālu, līdz 2 reizēm veģetācijas periodā	

2. PMV-01

Reģ. Nr. 0701, reģ. klase 2.

Aktīvā sastāvdaļa: *Pepino mosaic* vīruss, celms CH2, izolāts 1906 ($>5 \cdot 10^5$ vīrusa daļiņas/ μ L)

De Ceuster Meststoffen n.v.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Tomāti (segtās platībās)	Pepino mozaikas vīruss (PMV)	4.0-8.0	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, tūlīt pēc izstādīšanas kultūrauga agrā attīstības stadijā, sākot ar 5 lapu stadiju, līdz pirmais ziedu ķekars sāk ziedēt (AS 15-61)	-	1

3. Prestop

Reģ. Nr. 0681, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: *Gliocladium catenulatum* celms J1446, 320 g/kg, ($2 \cdot 10^8$ k.v.v./g)

Pieskares iedarbība.

Danstar Ferment AG

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Gurķi (segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis spp.</i>), stublāju iedegas (<i>Didymella spp.</i>)	1.0-10.0 kg/ha	0.5	Apsmidzināt tūlīt pēc iestādīšanas, pirms pirmās atlapošanas. Apstrādi atkārto ik pēc 3 līdz 4 nedēļām	-	6
Gurķi, tomāti, paprika, dārzeņi, garšaugi, krāšņumaugi (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	200-500 g/m ³		Pirms kultūrauga sējas iestrādāt substrātā	-	1
		50-100 kg/ha vai 5-10 g/m ²	0.5	Apliet vai apsmidzināt stādus kasetēs pirms izstādīšanas	-	1
		8.0-10.0 kg/ha vai 200-250 g/1000 augiem		Apliet pēc pārstādīšanas vai izmantot pilienlaistīšanu	-	6
Tomāti, paprika (segtās platībās), dārzeņi, garšaugi (segtās platībās un atklātā laukā)	Pelēkā puve (<i>Botrytis spp.</i>)	1-10 kg/ha	0.5	Apsmidzināt tūlīt pēc iestādīšanas. Apstrādi atkārto ik pēc 3 līdz 4 nedēļām	-	6
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi, lapu koki*, skuju koki* kokaudzētavās (segtās platībās un atklātā laukā)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	200-500 g/m ³		Pirms kultūrauga sējas iestrādāt substrātā	-	1
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi (segtās platībās un atklātā laukā)	Puves (<i>Botrytis spp.</i>)		0.5	Iemērt stādus, dēstus, sīpolus, gumus pirms izstādīšanas	-	1
	Puves (<i>Botrytis spp.</i>)	1.0-10.0 kg/ha	0.5	Apsmidzināt tūlīt pēc iestādīšanas. Apstrādi atkārto ik pēc 3 līdz 4 nedēļām	-	6
Gurķi*, ķirbjaugi* (atklātā laukā)	Pelēkā puve (<i>Botrytis spp.</i>), stublāju iedegas (<i>Didymella spp.</i>)	0.6 kg/ha	0.05	Apsmidzināt dēstus pirms pārstādīšanas, kultūrauga 3-5 lapu stadijā (AS 13-15)	-	1
		2.0-3.0 kg/ha	0.5	Apsmidzināt 3-4 nedēļas pēc pārstādīšanas	-	1



1	2	3	4	5	6	7
Krustziežu dārzeni* (galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, u.c.)	Krustziežu sakņu augoņi (<i>Plasmodiophora brassicae</i>)	50-100 kg/ha vai 5-10 g/ 100 m ²		Apliet dēstus pirms izstādīšanas	-	1
		3.0-4.0 kg/ha	0.5	Apsmidzināt 3 nedēļas pēc izstādīšanas	-	1
Sīpoli*, ķiploki* (pirms izstādīšanas atklātā laukā, tuneļos)	Puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>)		0.5	Iemērkst stādāmo materiālu pirms izstādīšanas	-	1
Sīpoli*, ķiploki* (pirms izstādīšanas atklātā laukā, tuneļos)	Puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>)	50-100 kg/ha vai 5-10 g/m ²	0.5	Apliet kultūrauga dīgstus pirms izstādīšanas	-	1
Sīpoli*, ķiploki* (tuneļos)	Puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>)	2.0-3.0 kg/ha		Apsmidzināt 3-6 nedēļas pēc izstādīšanas, ja nepieciešams	-	1
Sīpoli*, ķiploki* (atklātā laukā)	Puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>)	3.0-4.0 kg/ha		Apsmidzināt 3-6 nedēļas pēc izstādīšanas, ja nepieciešams	-	1
Zemenes*, avenas* (segtās platībās, tuneļos)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)		0.5	Stādāmā materiāla apstrāde: 1.apstrādes veids: Iemērkst stādāmo materiālu pirms stādīšanas.	-	1
	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	125 g/ 1000 augiem		2.apstrādes veids Apliet stādāmo materiālu pirms izstādīšanas	-	1
Zemenes* (segtās platībās, tuneļos)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	10.0-12.5 kg/ ha vai 200-250 g /1000 augiem		3.apstrādes veids Pilienveida laistīšana tūlīt pēc iestādīšanas	-	1
Avenas* (segtās platībās, tuneļos)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	2.75-3.30 kg/ha vai 250-300 g/ 1000 augiem		3.apstrādes veids Pilienveida laistīšana tūlīt pēc iestādīšanas	-	1
Zemenes* (segtās platībās, tuneļos, atklātā laukā)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	10.0-12.5. kg/ ha vai 200-250 g/1000 augiem		Pilienveida laistīšana 4 nedēļas pēc iestādīšanas	-	1
Avenas* (segtās platībās, tuneļos, atklātā laukā)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	2.75-3.30 kg/ ha vai 250 -300 g/1000 augiem		Pilienveida laistīšana 4 nedēļas pēc iestādīšanas	-	1
Zemenes*, avenas* (atklātā laukā)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)		0.5	Iemērkst stādāmo materiālu pirms stādīšanas.	-	1

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Lapu koki*, skuju koki* kokaudzētavās (segtās paltībās un atklātā laukā)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Phytophthora spp.</i>)	50.0-100.0 kg/ha vai 5-10 g/m ²	0.5	Pēc sadīgšanas apliet vai apsmidzināt, apstrādi atkārtot pēc 4-6 nedēļām	-	5
Lapu koki*, skuju koki* kokaudzētavās (segtās platībās un atklātā laukā)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.5-10. 0 kg/ha	0.5	Apsmidzināt pēc kultūrauga sadīgšanas. Apstrādi atkārtot pēc 3-4 nedēļām	-	5
Zemenes, avenes* (segtās platībās, tuneļos, atklātā laukā), krūmmellenes* (tuneļos, atklātā laukā), dzēvenes*	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	6.0 kg/ha	0.5	Apsmidzināt stādījumu, sākoties kultūrauga ziedēšanai, otrā apstrāde ziedēšanas vidū un trešā ziedēšanas beigās	-	3

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

4. Rotstop

Reģ. Nr. 0295, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: mikroorganisms *Phlebiopsis gigantea* strain 1835.

Danstar Ferment AG

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšana
1	2	3	4	5
Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe (<i>Heterobasidion annosum</i> , <i>Heterobasidion parviporum</i>)	2 g/m ²	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs automātiski zāģēšanas laikā, izmantojot mehanizēto celmu apstrādi. Darba šķidrums patēriņš 2 l/m ²	1 g preparāta satur $2 \times 10^6 - 5 \times 10^7$ kolonijas veidojošo vienību
Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe (<i>Heterobasidion annosum</i> , <i>Heterobasidion parviporum</i>)	1 g/m ²	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs, apstrādājot tos ar muguras smidzinātāju pēc nozāģēšanas. Darba šķidrums patēriņš 1 l/m ²	

5. Rotstop SC

Reģ. Nr. 0401, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: mikroorganisms *Phlebiopsis gigantea* strain 1835.

Danstar Ferment AG

Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe (<i>Heterobasidion annosum</i> , <i>Heterobasidion parviporum</i>)	2 g/m ²	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs automātiski zāģēšanas laikā, izmantojot mehanizēto celmu apstrādi. Darba šķidrums patēriņš 2 l/m ²	Suspensijas koncentrāts, 1 g preparāta satur $2 \times 10^6 - 2 \times 10^7$ kolonijas veidojošo vienību
Priedes, egles (celmi)	Sakņu trupe (<i>Heterobasidion annosum</i> , <i>Heterobasidion parviporum</i>)	1 g/m ²	Celmu apstrāde kailcirtēs vai skrajcirtēs, apstrādājot tos ar muguras smidzinātāju pēc nozāģēšanas. Darba šķidrums patēriņš 1 l/m ²	

1	2	3	4	5	6	7

6. Serenade Aso

Reģ. Nr. 0556, reģ. klase 2.

Darbīgā viela: *Bacillus subtilis*, celms QST 713, 13.96 g/l (min. 1.042×10^{12} k.v.v./l).

Pieskares iedarbība.

Bayer AG

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Zemenes (atklātā laukā un segtā platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	8.0		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedkopas pumpuru parādīšanos līdz otrajai ražai (AS 55–85)	–	6
Burkāni	Burkānu lapu sauplankumainība (<i>Alternaria dauci</i>), čemurziežu istā miltresa (<i>Erysiphe heraclei</i>)	8.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no saknes veidošanās sākuma līdz tai izveidojusies raksturīgā forma un diametrs (AS 41–49)	–	8
Tomāti, paprika, baklažāni (segtais platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), tomātu lapu sauplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>)	8.0		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmajiem sānu dzinumiem līdz augļu pilnai nobriešanai (AS 21–89)	–	6
Salāti (atklātā laukā un segtais platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	8.0		Apsmidzināt sējumus vai stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūrauga 3. lapu stadiju līdz sasniegta tipiskā lapu masa/salātu galviņu izmērs (AS 13–49)	–	5
Vinogas	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	8.0		Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no ziedēšanas beigām līdz pilnīgai ogu gatavībai (AS 68–89)	–	9
Burkāni*	Dīgstu melnkāja (<i>Pythium violae</i>)	10.0		Apsmidzināt augsni pēc sējas. Nepieciešams nodrošināt preparāta nokļūšanu augu sakņu zonā	–	1
Puravi*	Lapu plankumainība (<i>Alternaria porri</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz vāksšanas gatavībai (AS 12–49)	–	9
Tomāti*, paprika* (segtais platībās)	Tomātu istā miltresa (<i>Oidium lycopersici</i>), tomātu bakteriālā plankumainība (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)	4.0–8.0		Apsmidzināt kultūraugu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos līdz vāksšanas gatavībai, kad augļiem ir šķirnei tipiska krāsa (AS 21–89)	–	6
Gurķi* (atklātā laukā un segtais platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), istā miltresa (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), gurķu bakteriālā plankumainība (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos līdz gatavībai, kad augli sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu, formu un nogatavinājuši sēklas (AS 21–89)	–	6

1	2	3	4	5	6	7
Pipargurķīši* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), ķirbjaugu istā miltresa (<i>Podosphaera xanthii</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos līdz gatavībai, kad augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu, formu un nogatavinājuši sēklas (AS 21–89)	–	6
Ķirbji*, arbūzi*, melones* (atklātā laukā)	Sakņu un stublāju puves (<i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>)	–	1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienvēda laistīšanas sistēmu		
		Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), ķirbjaugu istā miltresa (<i>Podosphaera xanthii</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos līdz vākšanas gatavībai, kad augļiem ir šķirnei tipiska krāsa (AS 21–89)	–
Kabači* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves (<i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>)		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienvēda laistīšanas sistēmu		
		Ķirbjaugu istā miltresa (<i>Podosphaera xanthii</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos līdz vākšanas gatavībai, kad augļiem ir šķirnei tipiska krāsa (AS 21–89)	–
Cukini* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), istā miltresa (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	3.2		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo sānu dzinumu izveidošanos līdz vākšanas gatavībai, kad augļiem ir šķirnei tipiska krāsa (AS 21–89)	–	9
Galda bietes*	Sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas līdz sakņu vākšanas gatavībai (AS 12–49)	–	6
Brokoļi*, Briseles kāposti*, ziedkāposti* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i>)		1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
			10.0			
Brokoļi*, Briseles kāposti*, ziedkāposti*, galviņkāposti*, Ķīnas kāposti* (atklātā laukā un segtās platībās)	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), krustziežu istā miltresa (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), krustziežu vadaudu bakterioze (<i>Xanthomonas campestris</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, līdz kultūrauga galviņa sasnies raksturīgo lielumu un nobriedusi (AS 49)	–	6

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Selerijas* (sakņu, kātu, lapu), pētersīļi* (sakņu, lapu), pastinaki* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves (<i>Pythium spp.</i>), dīgstu melnkāja (<i>Rhizoctonia solani</i>)	10.0	1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
Selerijas* (lapu, kātu, sakņu) pētersīļi* (sakņu, lapu), pastinaki*, kolrābji*, rāceņi*, batātes*, mārrutki*, sparģeļi*	Sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), miltasas (<i>Erysiphe spp.</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas līdz kultūrauga vākšanas gatavībai (AS 12–49)	–	6
Redīsi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas līdz sakņu vākšanas gatavībai (AS 12–49)	–	6
Fenhelis* (segtais platībās)	Sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas līdz vākšanas gatavībai (AS 12–49)	–	9
Cigoriņi* (sakņu)	Sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), miltasas (<i>Erysiphe spp.</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no divu lapu stadijas līdz sakņu vākšanas gatavībai (AS 12–49)	–	9
Salāti*, endīvijas*, rukola*, spināti* (atklātā laukā un segtās platībās)	Dīgstu melnkāja (<i>Rhizoctonia solani</i>)	10.0	1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
Spināti*, endīvijas*, rukola* (atklātā laukā un segtās platībās)	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no trīs lapu stadijas līdz sasniegta tipiskā lapu masa (AS 13–49)	–	6
Kāršu pupas*, pupiņas*, zirņi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar pirmo īsto lapu pāri līdz stadijai, kad pākstī kļūst redzamas atsevišķas pupas (AS 12–79)	–	6
Šalotes sīpoli*, sīpoli* (lokiem), sīpoli*, ķiploki*	Sīpolu kakla puve (<i>Botryotinia squamosa</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju līdz vākšanas gatavībai (AS 12–49)	–	9
Soja*, ķimenes*, lini*, magones*, kaņepes*	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju līdz pilnai sēklu gatavībai (AS 12–89)	–	6

1	2	3	4	5	6	7
Garšaugi (baziliks*, gurķu mētra*, pupu mētra*, koriandrs*, kressalāti*, dilles*, majorāns*, piparmētra*, raudene*, rozmarīns*, timiāns*) (atklātā laukā un segtās platībās)	Dīgstu melnkāja (<i>Rhizoctonia solani</i>)		1	Aplaištīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu sēšanas/ stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienvēda laistīšanas sistēmu		
	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju līdz sasniegta tipiskā lapu masa (AS 12–49)	–	9
Avenes*, upenes*, ērķšķogas*, jānogas*, kazesnes*	Sakņu un stublāju puves (<i>Phytophthora spp.</i>)		1	Aplaištīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienvēda laistīšanas sistēmu		
	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedpumpuru parādīšanos līdz ogu krāsošanās sākumam (AS 51–85)	–	9
Krūmmellenes*, dzērvenes*	Sakņu un stublāju puves (<i>Phytophthora spp.</i>)		1	Aplaištīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
		10.0		Apstrādāt sakņu zonu stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienvēda laistīšanas sistēmu		
	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedpumpuru parādīšanos līdz ogu krāsošanās sākumam (AS 51–85)	–	9
Zemenes* (atklātā laukā un segtās platībās)	Īstā milttrasa (<i>Podosphaera macularis</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar ziedpumpuru briešanu līdz otrajai ogu ražai (AS 51–89)	–	6
Ķirši*, plūmes*, aprikozes*, persiki*	Pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), augļu parastā puve (<i>Monilia fructigena</i>), kauleņkoku pelēkā puve (<i>Monilia laxa</i>), mizas bakteriālais vēzis (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz izveidojies šķirnei raksturīgais augļa krāsojums (AS 51–85)	–	6
Bumbieri*	Mizas bakteriālais vēzis (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz augļi sasnieguši 90 % no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 60–79)	–	4
Krāšņumaugi* (atklātā laukā un segtās platībās)	Sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), milttrāsas (<i>Erysiphe spp.</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju līdz pilnai sēklu gatavībai (AS 12–89)	–	9

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

1	2	3	4	5	6	7
Kokaugi*, krūmi* (kokaudzētavās, atklātā laukā un segtās platībās)	Sakņu un stublāju puves (<i>Phytophthora spp.</i>)	10.0	1	Aplaistīt stādus pirms pārstādīšanas, līdz substrāts paliek mitrs	–	1
Kokaugi*, krūmi* (kokaudzētavās, atklātā laukā un segtās platībās)	Sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), pelēkā puve (<i>Botrytis cinerea</i>), baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), miltrasas (<i>Erysiphe spp.</i>), lapu plankumainības (<i>Xanthomonas spp.</i>), bakteriālais vēzis (<i>Pseudomonas spp.</i>), rožu īstā miltrasa (<i>Podosphaera pannosa</i>)	8.0		Apstrādāt sakņu zonu stādīšanas/ pārstādīšanas laikā, izmantojot hidraulisko smidzinātāju vai pilienvēda laistīšanas sistēmu		
Kvinoja*	Baltā puve (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), sausplankumainība (<i>Alternaria spp.</i>), miltrasas (<i>Erysiphe spp.</i>)	8.0		Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos	–	9
				Apsmidzināt kultūraugu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar divu lapu stadiju līdz pilnai sēklu gatavībai (AS 12–89)	–	6

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem vai ražas zudumiem.

7. Trianum-P

Reģ. Nr. 0676, reģ. klase 3.

Aktīvā sastāvdaļa: *Trichoderma harzianum* celms T-22, 10 g/kg, (1.0x10⁹ k.v.v./g)

Pieskares iedarbība.

Koppert B.V.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva kg/ha	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksi- mālais apstrāžu skaits sezonā	Maksi- mālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6
Stādi un dēsti segtās platībās: ogulāji, salāti un citi lapu dārzeņi, pākšaugi, augļu dārzeņi (tomāti, gurķi, paprika, ķirbji, kabači u.c.), garšaugi, visu veidu kāposti, stublāju dārzeņi, krāšņumaugi (griezti ziedi, podu puķes), daudzgadīgie augi (stādi, dēsti, segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	15 + 7.5	Apstrādāt audzēšanas substrātu divas reizes stādu audzēšanas laikā ar 14 dienu intervālu. Darba šķidruma patēriņš 25000-50000 l/ha	-	2
Dažādu kultūru dēsti un stādi (kokaudzētavās, segtās platībās, atklātā laukā)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	15 + 7.5 + 7.5 + 7.5	Apstrādāt audzēšanas substrātu līdz četrām reizēm stādu audzēšanas laikā ar 14 dienu intervālu. Darba šķidruma patēriņš 25000-50000 l/ha	-	4
Zemenes, avenas, krūmmellenes, kazenes (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	2.5-5.0	Apliet, audzējot dobēs, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 1000-1200 l/ha	-	5
Zemenes, avenas, krūmmellenes, kazenes (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	1.0-2.5	Apliet, audzējot rindās, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 1000-1200 l/ha	-	5

1	2	3	4	5	6	7
Zemenes, avenes, krūmmellenes, kazenes (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	0.015-0.03 kg/ 1000 augiem	Apstrādi veikt, izmantojot pilienlaistīšanu, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 10 nedēļas. 30000 augi/ha	-	5	
Salāti un citi lapu dārzeni, stublāju dārzeni, sakņu un bumbuļu dārzeni (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	2.5-5.0	Apliet, audzējot dobēs, uzreiz pēc pārstādīšanas. Darba šķidruma patēriņš 200-1000 l/ha	-	1	
Salāti un citi lapu dārzeni, stublāju dārzeni, sakņu un bumbuļu dārzeni (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	1.0-2.5	Apliet, audzējot rindās, uzreiz pēc pārstādīšanas. Darba šķidruma patēriņš 200-500 l/ha	-	1	
Augļu dārzeni (tomāti, gurķi, paprika, ķirbji, kabači u.c.), (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	0.015-0.03 kg/ 1000 augiem	Apstrādi veikt, izmantojot pilienlaistīšanu, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 4 nedēļas. Augu daudzums ha 15000-30000	-	12	
Garšaugi (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	15 + 7.5	Apliet audzēšanas sezonā divas reizes ar minimālo intervālu 14 dienas. Darba šķidruma patēriņš 10000-13000 l/ha	-	2	
Sīpolpuķes (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	1.0-2.5	Apliet stādījumu, audzējot rindās, tūlīt pēc iestādīšanas. Darba šķidruma patēriņš 10000-25000 l/ha	-	1	
Sīpolpuķes (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	2.5-5.0	Apliet stādījumu, audzējot dobēs, tūlīt pēc iestādīšanas. Darba šķidruma patēriņš 25000-50000 l/ha	-	1	
Krāšņumaugi (griezti ziedi, podu puķes) (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	1.0-2.5	Apliet sējumu vai stādījumu, audzējot rindās, tūlīt pēc sējas vai stādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 2 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 5000-25000 l/ha	-	4	
Krāšņumaugi (griezti ziedi, podu puķes), (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	2.5-5.0	Apliet sējumu vai stādījumu, audzējot dobēs, tūlīt pēc sējas vai stādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 2 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 10000-50000 l/ha	-	4	
Krāšņumaugi (griezti ziedi, podu puķes), daudzgadīgie augi (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	0.015-0.03 kg/ 1000 augiem	Apstrādi veikt, izmantojot pilienlaistīšanu, uzreiz pēc pārstādīšanas, atkārtoti ar intervālu starp apstrādēm 4 nedēļas. Augu daudzums ha 20000-90000	-	12	
Daudzgadīgie augi, augi kokaudzētavās (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	1.0-2.5	Apliet stādījumu, audzējot rindās, tūlīt pēc sējas vai stādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 5000-25000 l/ha	-	5	
Daudzgadīgie augi, augi kokaudzētavās (segtās platībās),	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	2.5-5.0	Apliet stādījumu, audzējot dobēs, tūlīt pēc sējas vai stādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 10000-50000 l/ha	-	5	
Augi kokaudzētavās (segtās platībās)	Sakņu puves (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>)	0.15 kg/ 1000 augiem	Apliet stādījumā katru atsevišķu augu tūlīt iestādīšanas, atkārtoti ar minimālo intervālu 10 nedēļas. Darba šķidruma patēriņš 25000-50000 l/ha	-	5	

DZĪVOS ORGANISMUS SATUROŠIE AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva: Īpatņi/m ²	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšanas ilgums
1	2	3	4	5

1. ABS sistēma

Reģ. Nr. 0447, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblyseius cucumeris*).

Biobest Group N.V.

Gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, gerberas, rozes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (segtajās platībās)	Tripši (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Trips tabaci</i>)	Profilaktiski: 500	1 reizi augos ar putekšņiem	Plēsējērces dažādās attīstības stadijās. Uzglabāt tumsā, +20 °C temperatūrā, 1–2 dienas, relatīvais gaisa mitrums virs 85 %
		Vispārēja izlaišana: 500–1000	Iznīcina tripšu kāpurus. 1–2 reizes ar 4–6 nedēļu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 1300	1–2 reizes ar 4–6 nedēļu intervālu	

2. Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)

Reģ. Nr. 0463, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: divpunktu mārīte (*Adalia bipunctata*).

Biobest Group N.V.

Dārzeni, garšaugi, krāšņumaugi, zemenes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (atklātā laukā un segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>)	Vispārēja izlaišana: 10–50	Tikai invāzijas gadījumā. Ja nepieciešams, lieto atkārtoti	Kūniņas vai oļņas sajauktas ar sasmalcinātu papīru. Uzglabāt tumsā, +8–10 °C temperatūrā, 1–2 dienas
		Invāzijas perēkļos: 50–100	Tikai invāzijas gadījumā. Ja nepieciešams, lieto atkārtoti	

3. Afidius sistēma

Reģ. Nr. 0442, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Aphidius colemani*).

Biobest Group N.V.

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, salāti, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Laputis (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Profilaktiski: 0.15	Parazitē laputis. Izlaiž ik pēc 7 dienām	Laputu mūmijas. Uzglabāt +6–8 °C temperatūrā, 1–2 dienas, relatīvais gaisa mitrums 85 %
		Vispārēja izlaišana: 0.5–1	Izlaiž ik pēc 7 dienām, vismaz 3 nedēļas pēc kārtas, līdz ir pietiekami laputis parazitētas	

4. Afidiuss

Reģ. Nr. 0064, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: laputu lapsenīte (*Aphidiuss colemani*).

IK "Ciklaneda BS"

Gurķi, tomāti, pipari, selerijas, salāti, pētersīļi augu mājās	Laputis (<i>Aphididae</i>)	15 mūmijas/ m ²	Parazitē laputis. Izlikt mūmijas augu mājā, kaitēklim parādoties	Laputu mūmijas. Uzglabāt +5 °C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 15 dienām

1	2	3	4	5

5. Afidoletes sistēma

Reģ. Nr. 0448, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: pangodiņš (*Aphidoletes aphidimyza*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, salāti, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Macrosiphoniella sanborni</i>)	Profilaktiski: 0.1	Iznīcina laputis. Kopā ar <i>Aphidius colemani</i>	Vermikulītā iejauktas pangodiņa kūniņas. Uzglabāt tumsā, +10–15 °C temperatūrā, 1–2 dienas, relatīvais gaisa mitrums virs 85 %
		Vispārēja izlaišana: 0.5–2	3 reizes ar 7 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 5–10	Lokāli, pēc vajadzības	

6. Amblyseijus sistēma

Reģ. Nr. 0464, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce *Amblyseius cucumeris* (*Neoseiulus cucumeris*).**Biobest Group N.V.**

Gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, gerberas, rozes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (segtajās platībās)	Tripši (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Trips tabaci</i>)	Profilaktiski: 500	1 reizi augos ar putekšņiem	Plēsējērces imago stadijā. Uzglabāt tumsā, +10–15 °C temperatūrā, 1–2 dienas, relatīvais gaisa mitrums virs 85 %
		Vispārēja izlaišana: 500–1000	Iznīcina tripšu kāpurus. 1–2 reizes ar 4–6 nedēļu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 1300	1–2 reizes ar 4–6 nedēļu intervālu	

7. Amblyseius

Reģ. Nr. 0063, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblyseius cucumeris*).**IK "Ciklaneda BS"**

Gurķi, tomāti augu mājās	Parastā tīklērce (<i>Tetranychus urticae</i>), tripši (<i>Frankliniella occidentalis</i>), <i>Thrips tabaci</i>)	500 ērces / m ²	Iznīcina tīklērces, tripšu kāpurus, retāk olas. Izlaist, kaitēklim parādoties	Plēsējērces. Uzglabāt +10 °C temperatūrā, ne ilgāk par trim dienām
Pipari augu mājās	Tripši (<i>Frankliniella occidentalis</i>), <i>Thrips tabaci</i>)			

8. Aphidend

Reģ. Nr. 0124, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: pangodiņš (*Aphidoletes aphidimyza*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus nicotianae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aulacorthum solani</i>)	Vispārējai izlaišanai: 1 kūniņa/m ²	Izlikt kūniņas, laputīm parādoties, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	Vermikulītā iejauktas pangodiņa kūniņas. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +10°C līdz +15°C, ne ilgāk par 1–2 dienām.
		Invāzijas perēkļos: 10 kūniņas/m ²	Izlikt kūniņas lokāli, laputīm parādoties, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	

1	2	3	4	5

9. Aphipar

Reģ. Nr. 0616, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Aphidius colemani*).

Koppert B.V.

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Laputis (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>)	Profilaktiski: 0.25	Izlaiž ik pēc 7 dienām	Laputu mūmijas iejauktas koka skaidās. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, 1–2 dienas.
		Vispārēja izlaišana: 1	Vismaz 3 reizes ar 7 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 2	Vismaz 6 reizes ar 7 dienu intervālu	

10. Aphiscout

Reģ. Nr. 0702, reģ. klase 3.

Dzīvie organismi: parazītlapsenes (*Aphidius colemani*, *Aphidius ervi* Haliday, *Aphelinus abdominalis*, *Ephedrus cerasicola*, *Praon volucre*).

Dzīvos organismus saturošs augu aizsardzības līdzeklis.

Koppert B.V.

Dārzeni, garšaugi, krāšņumaugi (segtās platībās)	Laputis (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aulacorthum solani</i>)	Profilaktiski: 0.63 īpatņi /m2	Vismaz trīs reizes, ar 14 dienu intervālu	Parazītlapsēņu mūmijas zāģu skaidās. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, ne ilgāk kā 24 stundas

11. CBS sistēma

Reģ. Nr. 0610, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus californicus*).

Biobest Group N.V.

Tomāti, paprika, gurķi, pupas, baklažāni, avenes, jāņogas, upenes, krūmmellenes, kazenes, rozes, krizantēmas, gerberas, puansetijas, dižkallas, frēzijas, fuksijas, balzamīnes, daturas, koku un krūmu stādi kokaudzētavās (segtās platībās un atklātā lauka)	Parastā tīklērce (<i>Tetranychus urtica</i>), sarkanā augļu koku tīklērce (<i>Panonychus ulmi</i>), zemeņu ērce (<i>Tarsonemus pallidus</i>), sarkanā citrusaugu ērce (<i>Panonychus citri</i>), ērce (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	Vispārēja izlaišana: 40 plēsējērces/ m ²	Vienu līdz divas reizes ar 4–6 nedēļu intervālu	Plēsējērces imago iejaukts kliņģa kopā ar barību papīra maisiņā. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +18°C, līdz 7 dienām, nodrošinot labu ventilāciju.

12. Cryptobug

Reģ. Nr. 0683, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: Montrouza mārīte (*Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant).

Koppert B.V.

Dārzeni, krāšņumaugi (segtās platībās)	Pūkainās bruņutis (<i>Pseudococcidae</i>)	Vispārēja izlaišana: 2 īpatņi /m2	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	Pieauguši īpatņi iejaukti griķu sēnalās. Uzglabāt tumsā, +10°C līdz +15°C temperatūrā, 1-2 dienas
		Invāzijas perēkļos: 10 īpatņi/m2	Vienu reizi	

1	2	3	4	5

13. Cryptobug-L

Reģ. Nr. 0684, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: Montrouza mārīte (*Cryptolaemus montrouzieri Mulsant*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtās platībās)	Pūkainās bruņutis (<i>Pseudococcidae</i>)	Profilaktiski: 5 īpatņi/m ²	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	Mārīšu kāpuri iejaukti griķu sēnalās. Uzglabāt tumsā, +10°C līdz +15°C temperatūrā, 1 dienu
		Vispārēja izlaišana: 10 īpatņi/m ²	Vismaz 3 reizes, ar 7-14 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 20-40 īpatņi/m ²	Vismaz 3 reizes, ar 7-14 dienu intervālu	

14. Daknusa sistēma

Reģ. Nr. 0659, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Dacnusa sibirica*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, paprika, gurķi, kabači, baklažāni un citi dārzeni; krizantēmas, gerberas un citi ziedaugi; koku un krūmu stādi kokaudzētavās (segtās platībās)	Lapu alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i>)	Vispārēja izlaišana: 0.25–0.5 parazītlapsenes/m ²	3–4 reizes ar 7 dienu intervālu, ja <1 alojums/10 augi	Parazītlapsenes imago. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +10–15°C, 18 stundas.
		Invāzijas perēkļos: 0.5–1 parazītlapsenes/m ²	Ja >1 alojums/10 augi, lietot kopā ar Diglifus sistēma	

15. Diglifus sistēma

Reģ. Nr. 0443, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Diglyphus isaea*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, paprika, krizantēmas, gerberas (segtajās platībās)	Lapu alotājmušas (<i>Liriomyza bryoniae</i> , <i>Liriomyza trifolii</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i>)	Vispārēja izlaišana: 0.1	Barojas ar alotājmušu kāpuriem. 3–4 reizes ar 7 dienu intervālu	Parazītlapsenes. Uzglabāt tumsā, +6–10°C temperatūrā, 1–2 dienas.
		Invāzijas perēkļos: 0.5–1	3–4 reizes ar 7 dienu intervālu	

16. Enermix

Reģ. Nr. 0649, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Eretmocerus eremicus*), spožlapsene (*Encarsia formosa*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bremisia tabaci</i>)	Profilaktiski: 3	Izlaist ar 7–14 dienu intervālu	Pie kartona plāksnītēm fiksēti baltblusiņas pupāriji. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 6	Vismaz 3 reizes, kamēr kaitēkļi ir ierobežoti. Intervāls 7 dienas	
		Invāzijas perēkļos: 9	Vismaz 3 reizes, kamēr kaitēkļi ir ierobežoti. Intervāls 7 dienas	

1	2	3	4	5

17. Enkarsija

Reģ. Nr. 0061, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: spožlapsene (*Encarsia formosa*).

IK "Ciklaneda BS"

Gurķi augu mājās	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	10 pupāriji / m ²	Parazitē 3.–4. vecuma baltblusiņu kāpurus. Izlikt pupārijus augu mājā, kaitēklim parādoties	Pupāriji. Uzglabāt +10 °C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 30 dienām
Tomāti augu mājās		5 pupāriji / m ²		

18. Enkarsijas sistēma

Reģ. Nr. 0444, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: spožlapsene (*Encarsia formosa*).

Biobest Group N.V.

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bremisia tabaci</i>)	Profilaktiski: 1.5–3	Parazitē 3. un 4. vecuma baltblusiņas kāpurus. 3 reizes ar 7–14 dienas intervālu	Pie kartona plāksnītēm fiksēti pupāriji. Uzglabāt +6–10 °C temperatūrā, 1–2 dienas, relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %
		Vispārēja izlaišana: 3–4	3–4 reizes ar 7 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 5–10	3–4 reizes ar 7 dienu intervālu	

19. En-Strip

Reģ. Nr. 0125, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: spožlapsenīte (*Encarsia formosa*).

Koppert B.V.

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Baltblusiņas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Profilaktiskai izlaišanai: 1.5–3 pupāriji/m ²	Izlikt pupārijus atkārtoti ar 7–14 dienu intervālu	Pie kartona strēmelēm fiksēti pupāriji. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +8°C–10°C, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 3–6 pupāriji/m ²	Izlikt pupārijus, kaitēklim parādoties, vismaz 3 reizes ar intervālu 7 dienas	
		Invāzijas perēkļos: 9 pupāriji/m ²		

20. Entomite-M

Reģ. Nr. 0615, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērcē (*Stratiolaelaps scimitus*).

Koppert B.V.

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Trūdodiņu kāpuri (<i>Sciaridae</i>), tripšu kūniņas (<i>Frankliniella occidentalis</i>), kolembolas (<i>Collembola</i>) sakņu ērces	Profilaktiski: 100	Izlaist vienu reizi	Vermikulītā un kūdrā iejauktas plēsējērces visās attīstības stadijās. Uzglabāt tumsā, +10°C līdz +15°C temperatūrā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 200	Izlaist vienu reizi	
		Invāzijas perēkļos: 500	Izlaist vienu reizi	

1	2	3	4	5

21. Entonem

Reģ. Nr. 0619, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema feltiae*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi, garšaugi, zemenes (segtajās platībās)	Smidzināšana uz augsnes			Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +2°C līdz + 6°C, 1–2 dienas
	Trūdodiņi (<i>Sciaridae</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	Invāzijas perēkļos (neliela mēroga invāzijas gadījumā): 500 000	Viena reize	
		Invāzijas perēkļos (liela mēroga invāzijas gadījumā): 500 000	2–3 reizes ar 7 dienu intervālu.	
	Smidzināšana pa lapām			
	Tripši (<i>Thysanoptera</i>)	Invāzijas perēkļos: 250 000	Atkārtot ar 7 dienu intervālu, kamēr nepieciešams	

22. Ercal

Reģ. Nr. 0614, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: parazītlapsene (*Eretmoceris eremicus*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bremisia tabaci</i>)	Profilaktiski: 1.5–3	ar 7–14 dienas intervālu	Pie kartona plāksnītēm fiksēti baltblusiņas pupāriji. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz + 10°C temperatūrā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 3–6	Vismaz 3 reizes ar 7 dienu intervālu, kamēr kaitēkļi ir ierobežoti	
		Invāzijas perēkļos: 9	Vismaz 3 reizes ar 7 dienu intervālu, kamēr kaitēkļi ir ierobežoti	

23. Eretmiks sistēma

Reģ. Nr. 0465, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: spožlapsesnes (*Encarsia formosa*, *Eretmoceris eremicus*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bremisia tabaci</i>)	Profilaktiski: 1.5–3	Parazitē 2. un 4. vecuma baltblusiņas kāpurus. 3 reizes ar 7–14 dienas intervālu	Pie kartona plāksnītēm fiksēti baltblusiņas pupāriji vai parazitēti pupāriji pudelītē. Uzglabāt tumsā, +6–10 °C temperatūrā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 3–4	3–4 reizes ar 7 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 5–10	3–4 reizes ar 7 dienu intervālu	

24. Eretmoceris sistēma

Reģ. Nr. 0466, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: spožlapsesnes (*Eretmoceris eremicus*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bremisia tabaci</i>)	Profilaktiski: 1.5–3	Parazitē 2. un 3. vecuma baltblusiņas kāpurus. 3 reizes ar 7–14 dienas intervālu	Pie kartona plāksnītēm fiksēti baltblusiņas pupāriji vai parazitēti pupāriji pudelītēs. Uzglabāt tumsā, +8–10 °C temperatūrā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 3–4	3–4 reizes ar 7 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 5–10	3–4 reizes ar 7 dienu intervālu	

1	2	3	4	5

25. Ervipar

Reģ. Nr. 0670, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: parazītapsene (*Aphidius ervi Haliday*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtās platībās)	Laputis (<i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Myzus persicae</i> var. <i>nicotianae</i>)	Profilaktiski: 0.25	Izlaiž atkārtoti, ja nepieciešams pēc 7 dienām	Laputu mūmijas iejauktas griķu sēnalās. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, 1-2 dienas
		Mērena invāzija: 0.5	Nepārtraukti ar 7 dienu intervālu	
		Augsta invāzija: 2	Nepārtraukti ar 7 dienu intervālu	

26. Feltiella sistēma

Reģ. Nr. 0529, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: pangodiņš (*Feltiella acarisuga*) (Vallot 1827).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, paprika	Tīklērces (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	Mērena invāzija: 250 īpatņi/ perēkli/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 2–3 reizes	Dzīvā organisma kūniņas koka skaidās. Uzglabāšana +10 °C temperatūrā, 1–2 dienas
		Augsta invāzija: 250 īpatņi/ perēkli/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 8 reizes	
Gurķi		250 īpatņi/ perēkli/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 2–3 reizes	
Rozes		Mērena invāzija: 250 īpatņi/ perēkli/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 2–3 reizes	
Baklažāni, zemenes, krizantēmas, gerberas, antūrijas, stādi kokaudzētavās un stādu mājās		500–750 īpatņi/ha/ nedēļā	Pavasari, kad platībā parādās pārziemojušās tīklērces	
Tomāti, paprika, gurķi, rozēs, baklažāni, zemenes, krizantēmas, gerberas, antūrijas, stādi kokaudzētavās un stādu mājās		Augsta invāzija: 2500 īpatņi/ha/nedēļā	Pavasari, kad platībā parādās pārziemojušās tīklērces, minimums 6 reizes	
		250 īpatņi/ perēkli/ nedēļā	Veģetācijas periodā minimums 4–6 reizes.	

27. Fitoseiulus sistēma

Reģ. Nr. 0449, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Phytoseiulus persimilis*).**Biobest Group N.V.**

Gurķi, tomāti, paprika, zemenes, antūrijas, krizantēmas, gerberas, rozēs, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (segtajās platībās)	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)	Vispārēja izlaišana: 4–6	Iznīcina visu vecumu tīklērces, to olas. 2 reizes ar 7 dienu intervālu	Plēsējērces iejauktas pildvielā. Uzglabāt tumsā, +6–8 °C temperatūrā, pie relatīvā gaisa mitruma virs 85 %, 1–2 dienas, horizontālā stāvoklī
		Invāzijas perēkļos: 20–40	2–3 reizes ar 7 dienu intervālu	

1	2	3	4	5

28. Fitoseiulus T-sistēma

Reģ. Nr. 0452, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērcē (*Phytoseiulus persimilis*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti (segtajās platībās)	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)	Vispārēja izlaišana: 20–50	Iznīcina visu vecumu tīklērces, to olas. 2 reizes ar 7 dienu intervālu	Plēsējērcē vermikulītā vidē. Uzglabāt nav ieteicams
		Invāzijas perēkļos: 100–200	2 reizes ar 7 dienu intervālu	

29. Fitosējulus

Reģ. Nr. 0060, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērcē (*Phytoseiulus persimilis*).**IK "Ciklaneda BS"**

Gurķi augu mājās	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)	1 plēsējērcē uz 50 tīklērcēm	Iznīcina visu vecumu tīklērces, to olas. Izlaist augu mājā vienu reizi, kaitēklīm parādoties	Plēsējērces uz auga lapām. Uzglabāt +3 °C temperatūrā, pie gaisa mitruma 80 %, ne ilgāk par divām nedēļām
Tomāti augu mājās		1 plēsējērcē uz 25 tīklērcēm		
Rozes augu mājās		1 plēsējērcē uz 10 tīklērcēm		

30. Hipoaspis sistēma

Reģ. Nr. 0445, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērcē (*Stratiolaelaps scimitus*).**Biobest Group N.V.**

Dārzeni, puansetijas, krizantēmas, gerberas, rozes, (segtajās platībās), stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās	Trūdodiņa kāpuri (<i>Sciaridae</i>), tripšu pupāriji (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>), daudzkāji, sakņu ērces	Profilaktiski: 50–100	Barojas ar augsnē mītošajiem kaitēkļiem	Vermikulītā un kūdras maisījumā iejauktas plēsējērces. Uzglabāt tumsā, +12–18 °C temperatūrā, paaugstinātā gaisa mitrumā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 250–500	Plēsējērces 1 reizi vienmērīgi izvieto uz augšnes vai substrāta maisiem	
		Invāzijas perēkļos: 500–1000	Plēsējērces 1 reizi vienmērīgi izvieto uz augšnes vai substrāta maisiem	

31. Kalifornikus sistēma

Reģ. Nr. 0609, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērcē (*Neoseiulus californicus*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, paprika, gurķi, pupas, baklažāni, avenas, jānogas, upenes, krūmmellenes, kazes, rozes, krizantēmas, gerberas, puansetijas, dižkallas, frēzijas, fuksijas, balzamīnes, daturas, koku un krūmu stādi kokaudzētavās (segtais platībās un atklātā laukā)	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urtica</i>), sarkanā augļu koku tīklērcē (<i>Panonychus ulmi</i>), zemeņu ērcē (<i>Tarsonemus pallidus</i>), sarkanā citrusaugu ērcē (<i>Panonychus citri</i>), ērcē (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	Profilaktiski: 25 plēsējērces/ m ²	Ik pēc 3 nedēļām	Plēsējērces imago vermikulītā. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +8°C, 1–2 dienas, nodrošinot labu ventilāciju.
		Vispārēja izlaišana: 100 plēsējērces/ m ²	Pēc vajadzības, ja ērces atrodamas	
		Invāzijas perēkļos: 200 plēsējērces/ m ²	Pēc vajadzības, tikai invāzijas perēkļos	

1	2	3	4	5

32. Larvanem

Reģ. Nr. 0692, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Heterorhabditis bacteriophora*).

Dzīvo organismu saturošs augu aizsardzības līdzeklis.

Koppert B.V.

Dārzeni, garšaugi, krāšņumaugi, zemenes, ogulāji (segtās platībās un atklātā laukā)	Vinogulāju smecernieks (<i>Otiophrynchus sulcatus</i>), lauka maijvabole (<i>Melolontha melolontha</i>)	Invāzijas gadījumā: 500 000 īpatņi /m2	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	Nematodes trešā attīstības stadijā speciālā gelā. Uzglabāt tumsā, +2°C līdz +6°C temperatūrā
		Spēcīgas invāzijas gadījumā: 1 000 000 īpatņi /m2	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	
Zāliens (ieskaitot golfa laukumu)	Lauka maijvabole (<i>Melolontha melolontha</i>), dārza vabole (<i>Phyllotreta horticola</i>)	Invāzijas gadījumā: 500 000 īpatņi /m2	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	
		Spēcīgas invāzijas gadījumā: 1 000 000 īpatņi /m2	Divas reizes, ar 14 dienu intervālu	

33. Limonikus sistēma

Reģ. Nr. 0693, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblydromalus limonicus*).

Biobest Group N.V.

Dārzeni (izņemot tomātus), garšaugi, dekoratīvie augi, zemenes (segtās platībās)	Tabakas tripsis (<i>Trips tabaci</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bemisia tabaci</i>), parastā tīklērce	Produkts maisīšos		Plēsējērces imago iejauktas pildvielās. Uzglabāšana, sargājot no tiešiem saules stariem, temperatūrā +10 -15°C, paciņas līdz 7 dienām, beramais produkts izlietojams ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc saņemšanas
		Profilaktiski: 250 plēsējērces/ m2	Vienu līdz divas reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Vispārēja izlaidšana: 250 plēsējērces/ m2	Vienu līdz divas reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Beramais produkts		

34. Macro-Mite

Reģ. Nr. 0645, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Macrocheles robustulus*).

Koppert B.V.

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Tabakas tripsis (<i>Thrips tabaci</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Vispārēja izlaidšana: 200	Vienmērīgi izkaisīt uz augsnes. Viena reize.	Plēsējērces visās attīstības stadijās iejauktas vermikulītā. Uzglabāt tumsā, +10°C līdz +15°C temperatūrā, 1–2 dienas

1	2	3	4	5

35. Makrolofus sistēma (Makrolofus-N sistēma)

Reģ. Nr. 0446, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsīgā mīkstblaktis (*Macrolophus pygmaeus*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bemisia tabaci</i>)	Profilaktiski: 0.5 (pieauguši īpatņi)	2 reizes ar 2 nedēļu intervālu, kopā ar barību	Vermikulītā iejauktas pieaugušas plēsīgās mīkstblaktis vai nimfas. Uzglabāt +8–10 °C temperatūrā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 0.5–1 (pieauguši īpatņi)	2 reizes ar 7 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 5–10 (pieauguši īpatņi)	Lokāli, pēc vajadzības	
	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes va porariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bemisia tabaci</i>), parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urticae</i>)	Invāzijas perēkļos 25–50 (nimfas)	Lokāli, pēc vajadzības	

36. Miglyphus

Reģ. Nr. 0648, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: parazitlapse (*Diglyphus isaea*)(Walker).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Lapu alotājmušas (<i>Agromyzidae</i>)	Mērena invāzija: 0.25	Pielietot, ja ir vairāk nekā 1 kāpurs/10 augiem, vismaz 3 reizes. Intervāls 7 dienas	Pieaugušas parazitlapsesnes. Uzglabāt tumšā, +8°C līdz + 10°C temperatūrā, 1–2 dienas
		Augsta invāzija: 1	Pielietot, ja ir vairāk nekā 1 kāpurs/3 augiem, vismaz 3 reizes. Intervāls 7 dienas	

37. Mirical

Reģ. Nr. 0127, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsīgā mīkstblaktis (*Macrolophus pygmaeus*).**Koppert B.V.**

Apstrādājamo kultūraugu	Kaitīgais organisms	Deva, īpatņi/ m ²	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšanas ilgums
Dārzeni, krāšņumaugi, izņemot gerberas (segtajās platībās)	Baltblusiņas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Profilaktiskai izlaišanai: 0.25 mīkstblaktis/m ²	Izlaist mīkstblaktis 2 reizes ar intervālu 14 dienas (kopā ar barību ENTOFOOD)	Plēsīgās mīkstblaktis imago un nimfas koka skaidās. Uzglabāt tumšā, temperatūrā no +8°C– 10°C, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 0.5 mīkstblaktis/m ²	Izlaist mīkstblaktis kaitēklim parādotes 2 reizes ar 14 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 5 mīkstblaktis/m ²	Izlaist mīkstblaktis kaitēklim parādotes 2 reizes ar 14 dienu intervālu	

1	2	3	4	5

38. Montdorensis sistēma

Reģ. Nr. 0694, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērcē (*Transeius montdorensis*).

Biobest Group N.V.

Dārzeni, garšaugi, dekoratīvie augi, zemenes (segtās platībās)	Tabakas tripsis (<i>Trips tabaci</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>), siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialetrodes vaporariorum</i>), tabakas baltblusiņa (<i>Bemisia tabaci</i>), parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urtica</i>), zemeņu ērcē (<i>Phytonemus pallidus</i>), ērcē (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>), tomātu maurērcē (<i>Aculops lycopersici</i>)	Produkts maisiņos		Plēsējērces imago iejauktas pildvielās. Uzglabāšana, sargājot no tiešiem saules stariem, temperatūrā +10 -15°C, paciņas līdz 7 dienām, beramais produkts izlietojams ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc saņemšanas
		Profilaktiski: 250 plēsējērces/ m2	Vienu līdz divas reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Vispārēja izlaišana: 250 plēsējērces/ m2	Vienu līdz divas reizes ar 4 nedēļu intervālu	
		Beramais produkts		
		Vispārēja izlaišana: 20-50 plēsējērces/ m2	Vienu līdz divas reizes ar nedēļas intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 50-150 plēsējērces/ m2	Vienu līdz divas reizes ar nedēļas intervālu	

39. Nemaslug

Reģ. Nr. 0687, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Phasmarhabditis hermaphrodita*).

SIA BASF

Dārzeni, krāšņumaugi	Mikstgliemeži (<i>Deroceras spp.</i>), kailgliemeži (<i>Arion spp.</i>)	300 000	Apstrādājiet augsni, kad gliemeži ir aktīvi. Ja nepieciešams, atkārtot ik pēc 6 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1°C līdz + 5°C

40. Nemasys

Reģ. Nr. 0688, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema feltiae*).

Dzīvo organismu saturošs augu aizsardzības līdzeklis.

SIA BASF

Burkāni	Burkānu muša (<i>Psila rosae</i>)	166 666	Apliet augus rindās, sākot ar jūnija sākumu. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1°C līdz + 5°C
Sīpoli	Sīpolu muša (<i>Delia antiqua</i>)	166 666	Apliet augus rindās, sākot ar jūnija otro pusi. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	
Kāposti	Kāpostu mušas (<i>Delia spp.</i>)	166 666	Apliet pēc augu iestādīšanas. Apliet rindas un ap augiem. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	
Dārzeni, krāšņumaugi, garšaugi	Garkājodu kāpuri (<i>Tipula spp.</i>)	166 666	Apliet pēc augu iestādīšanas. Apliet rindas un ap augiem. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	



1	2	3	4	5
Dārzeņi, krāšņumaugi	Pūcišu kāpuri (<i>Noctuidae</i>)	166 666	Apliet pēc augu iestādīšanas. Apliet rindas un ap augiem. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1°C līdz + 5°C
Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi	Trūdodiņu kāpuri (<i>Sciaridae</i>)	166 666	Apliet podus, audzēšanas maisus vai augsni. Atkārtoti ik pēc 2 nedēļām, kamēr ir kaitēkļi	
Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi	Skudras (<i>Formicidae</i>)	166 666	Apliet augsni vai tieši skudru pūzni. Skudras meklēs jaunu vietu skudru pūžņa veidošanai. Ja nepieciešams, veikt atkārtotu apstrādi pēc 2 nedēļām	
Dārzeņi, krāšņumaugi, ogulāji	Tauriņu kāpuri (<i>Lepidoptera</i>)	166 666	Apsmidzināt augus, kad kāpuri ir redzami. Nepieciešama apstrāde katru nedēļu, līdz visi kaitēkļi ir izšķīlušies	
Ogulāji	Zāglapsenes (<i>Tenthredinidae</i>)	166 666	Apsmidzināt augus, kad kāpuri ir redzami. Nepieciešama apstrāde katru nedēļu, līdz visi kaitēkļi ir izšķīlušies	
Dārzeņi, krāšņumaugi, garšaugi	Tripši (<i>Thysanoptera</i>)	166 666	Apsmidzināt augus, kad kāpuri ir redzami. Nepieciešama apstrāde katru nedēļu, līdz visi kaitēkļi ir izšķīlušies	
Ābeles, bumbieres	Ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	625 000 vai līdz 16 koki	Apsmidzināt stumbru, skeletzarus un augsni zem vainaga. Nepieciešams veikt apstrādes katru nedēļu, kopā 3 apstrādes	

41. Nemasys C

Reģ. Nr. 0690, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema carpocapsae*).**SIA BASF**

Ābeles, bumbieres	Ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	150 000	Apsmidzināt stumbru, skeletzarus un augsni zem koka vainaga no jūlija beigām līdz septembrim, kamēr temperatūra ir virs 14°C	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1°C līdz + 5°C
Dārzeņi, krāšņumaugi	Krastmalmušas (<i>Ephydriidae</i>)	500 000	Apstrādāt augsni/ substrātu parādotes kaitēkļiem. Atkārtoti apstrādāt ik pēc nedēļas	
Dārzeņi	Pūcišu kāpuri (<i>Noctuidae</i>), kāpostu pūcītes kāpuri (<i>Mamestra brassicae</i>)	500 000	Apsmidzināt augus, parādotes kāpuriem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-7 dienām vai 7-14 dienām	
Dārzeņi, krāšņumaugi	Pūcišu kāpuri (<i>Noctuidae</i>), sviļņu kāpuri (<i>Pyrallidae</i>)	500 000	Apliet augsni parādotes kāpuriem. Atkārtoti apliet pēc 5-7 dienām vai 7-14 dienām	

1	2	3	4	5

42. Nemasys H

Reģ. Nr. 0686, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Heterorhabditis bacteriophora*).**SIA BASF**

Augsne	Vīnogulāju smecernieks (<i>Otiorhynchus sulcatus</i>)	1 000 000/ m2	Apliet augsni, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1°C līdz + 5°C
Podi, konteineri	Vīnogulāju smecernieks (<i>Otiorhynchus sulcatus</i>)	500 000/ m2	Apliet augsni, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	
Zemenes	Vīnogulāju smecernieks (<i>Otiorhynchus sulcatus</i>)	25 000/ augu	Apliet katru augu atsevišķi, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	

43. Nemasys L

Reģ. Nr. 0685, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema kraussei*).**SIA BASF**

Apstrādājamā kultūra, objekts	Kaitīgais organisms	Deva: īpatņi/ m2 vai augu	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšana
Augsne	Vīnogulāju smecernieks (<i>Otiorhynchus sulcatus</i>)	1 000 000/ m2	Apliet augsni, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1°C līdz + 5°C
Podi, konteineri	Vīnogulāju smecernieks (<i>Otiorhynchus sulcatus</i>)	500 000/ m2	Apliet katru augu atsevišķi, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	
Zemenes	Vīnogulāju smecernieks (<i>Otiorhynchus sulcatus</i>)	25 000/ augu	Apliet katru augu atsevišķi, kad kaitēklis ir kāpura vai kūniņas stadijā. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 4 nedēļām	

44. Nemasys No Ants

Reģ. Nr. 0689, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema feltiae*).**SIA BASF**

Dārzeni, krāšņumaugi, garšaugi, zāliens	Skudras (<i>Formicidae</i>)	1 000 000	Apliet augsni vai tieši skudru pūzni. Skudras meklēs jaunu vietu skudru pūžņa veidošanai. Skudras netiek iznīcinātas, tikai atbaidītas	Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā gelā. Uzglabāšanas temperatūra no +1°C līdz + 5°C

1	2	3	4	5

45. Orius sistēma

Reģ. Nr. 0467, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: laupītājblakts (*Orius laevigatus*).**Biobest Group N.V.**

Gurķi, paprika, zemenes, puansetijas, gerberas, rozes, stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās (segtajās platībās)	Tripši (<i>Thysanoptera</i>)	Profilaktiska izlaišana: 0.5–1	Barojas ar tripšiem, gan pieauguša, gan kāpura stadijā, kā arī laputu, tīklērces, baltblusiņas un kodes olām. 1–4 reizes ar 1–2 nedēļu intervālu	Blaktis iejauktas griķos un vermikulītā. Uzglabāt tumsā, +8–10 °C temperatūrā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 1	4 reizes sezonā	
		Invāzijas perēkļos: 5–10	Tikai invāzijas perēkļos	

46. Pangodiņš

Reģ. Nr. 0062, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsīgais pangodiņš (*Aphidoletes aphidimyza*).**IK "Ciklaneda BS"**

Gurķi, tomāti, pipari, salāti, garšaugi, dekoratīvās kultūras augu mājās	Laputis (<i>Aphididae</i>)	40 kūniņas/ m ²	Izlikt kūniņas augu mājā, kaitēklim parādoties	Kūniņas. Uzglabāt +8 °C temperatūrā, pie gaisa mitruma 70 %, ne ilgāk par 10 dienām

47. Sferoforia sistēma

Reģ. Nr. 0660, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: ziedmuša (*Spaerophoria rueppellii*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, paprika, gurķi, kabači, baklažāni un citi dārzeņi; dekoratīvie augi (atklātā laukā un segtās platībās)	Laputis (<i>Aphididae</i>)	Profilaktiski (laputis nav redzamas): 100 ziedmušas/ha	Vienu reizi nedēļā, 6 reizes, pudele vienā izlaišanas punktā. Augiem jāizdala nektārs un ziedputekšņi ziedmušu barībai	Ziedmušu kūniņas uz strēmelēm. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +8–10°C, 24 stundas.
		Vispārējai izlaišanai: 300–400 ziedmušas/ha	Vienu reizi nedēļā, 3 reizes, pudele vienā izlaišanas punktā, invāzijas perēkļos. Augiem jāizdala nektārs un ziedputekšņi ziedmušu barībai	

48. Spical

Reģ. Nr. 0633, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērcē (*Neoseiulus californicus*).**Koppert B.V.**

Dārzeņi, krāšņumaugi, (segtajās platībās)	Parastā tīklērcē (<i>Tetranychus urtica</i>), sarkanā augļu koku tīklērcē (<i>Panonychus ulmi</i>), zemeņu ērcē (<i>Tarsonemus pallidus</i>), sarkanā citrusaugu ērcē (<i>Panonychus citri</i>), ērcē (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	Profilaktiski: 25 plēsējērces/m ²	Vairākas reizes, intervāls 21 diena	Plēsējērces visās mobilajās stadijās inertā materiālā. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +8°C–10°C, 1–2 dienas.
		Vispārēja izlaišana: 100 plēsējērces/ m ²	Vienu reizi. Lietot kopā ar Spidex	
		Invāzijas perēkļos: 200 plēsējērces/ m ²	Vienu reizi. Lietot kopā ar Spidex	

1	2	3	4	5

49. Spical-Plus

Reģ. Nr. 0634, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus californicus*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi, (segtajās platībās)	Parastā tīklērce (<i>Tetranychus urtica</i>), sarkanā augļu koku tīklērce (<i>Panonychus ulmi</i>), zemeņu ērce (<i>Tarsonemus pallidus</i>), sarkanā citrusaugu ērce (<i>Panonychus citri</i>), ērce (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	Profilaktiski: iepakojušs uz 2.5 m ²	Vairākas reizes, intervāls 28–42 dienas	Plēsējērces kopā ar žāveto augļu ērcītēm klīdās. Uzglabāšana tumsā, temperatūrā +17°C–20°C, 1–2 dienas, nodrošinot labu ventilāciju
		Vispārējai izlaišanai: iepakojušs uz 2.5 m ²	Vairākas reizes, intervāls 28 dienas. Lietot kopā ar Spidex	
		Invāzijas perēkļos: iepakojušs uz 1 m ²	Vairākas reizes, intervāls 28 dienas. Lietot kopā ar Spidex	

50. Spidend

Reģ. Nr. 0647, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: pangodiņš (*Feltiella acarisuga*) (Vallot).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Tīklērces (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus spp.</i>)	Mērena invāzija: 0.25	Pielietot tikai invāzijas perēkļos, vismaz 3 reizes. Intervāls 7 dienas	Lapas ar dzīvā organisma kūniņām. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz +10°C temperatūrā, 1–2 dienas
		Augsta invāzija: 10	Pielietot visā platībā, vismaz 3 reizes. Intervāls 7 dienas	

51. Spidex

Reģ. Nr. 0128, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Phytoseiulus persimilis*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Tīklērces (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	Profilaktiskai izlaišanai: 2 plēsējērces/m ²	Izlaist atkārtoti ar intervālu 14 dienas, nelielās siltumnīcu saimniecībās, gadījumos, kad var prognozēt tīklērces parādīšanos.	Pieaugušas plēsējērces iejauktas koka skaidiņās. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +8°C– 10°C, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 6 plēsējērces/m ²	Izlaist kaitēklim parādīties, vienu līdz divas reizes ar intervālu 7 dienas.	
		Invāzijas perēkļos: 20–50 plēsējērces/m ²	Izlaist kaitēkļu invāzijas perēkļos, divas reizes ar intervālu 7 dienas	

1	2	3	4	5

52. Steinernema sistēma

Reģ. Nr. 0661, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: entomopatogēnā nematode (*Steinernema feltiae*).**Biobest Group N.V.**

Tomāti, paprika, gurķi, kabači, baklažāni un citi dārzeņi; garšaugi, krizantēmas, gerberas un citi ziedaugi; dekoratīvie koki un krūmi kokaudzētavās (segtās platībās), sēnes (sēņu audzētavās segtās platībās), zemenes (atklātā laukā un segtās platībās)	Smidzināšana pa lapām			Nematodes (trešajā attīstības stadijā) speciālā želejā. Uzglabāšanas temperatūra no +2°C līdz + 6°C, tumsā
	Tripši (<i>Thysanoptera</i>), lapu alotājmušas (<i>Liriomyza spp.</i>)	Vispārējai izlaišanai: 125 000 nematodes /m ²	Viena reize nedēļā	
		Invāzijas perēkļos: 250 000 nematodes/m ²	2–3 reizes ar 7 dienu intervālu	
	Augsnes/substrāta apstrāde			
	Trūdodiņi (<i>Sciaridae</i>), smecernieki (<i>Otiorhynchus spp.</i>)	Vispārējai izlaišanai: 1 000 000 nematodes/m ²	Vienu reizi pēc sēšanas/ stādīšanas. Lēni augošām kultūrām atkārotot pēc 6 nedēļām	

53. Svirski sistēma

Reģ. Nr. 0441, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblyseius swirskii*).**Biobest Group N.V.**

Gurķi, paprika, zemenes, salāti (segtajās platībās)	Siltumnīcu baltblusiņa (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	Produkts maisiņos:		
		Profilaktiska izlaišana: 250	Atkarto ik pēc 4 nedēļām	Plēsējērces dažādās attīstības stadijās barības maisījumā. Uzglabāt tumsā, +15°C temperatūrā, līdz 7 dienām, nodrošinot labu ventilāciju
		Beramais produkts:		
		Profilaktiska izlaišana: 20	Visā laukā uz lapām, pēc vajadzības	Iepakoti plēsējērcu imago beramā veidā tūlītējai izlaišanai. Uzglabāt tumsā, +12–+14°C temperatūrā, 1–2 dienas, nodrošinot labu ventilāciju
		Invāzijas perēkļos: vairāk par 100	Invāzijas perēkļos, atkārtoti pēc vajadzības	

54. Swirskii-Mite

Reģ. Nr. 0620, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Amblyseius swirskii*).**Koppert B.V.**

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva: Īpatņi/m ²	Lietošanas laiks, iedarbības veids	Preparatīvā forma, uzglabāšanas ilgums
Krāšņumaugi, dārzeņi (izņemot tomātus) (segtajās platībās)	Baltblusiņas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bremisia tabaci</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	Profilaktiski: 25	Izlaiž vienu reizi	Plēsējērces un nimfas iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +12 līdz +14°C temperatūrā, 1–2 dienas. Nodrošināt ventilāciju, lai neuzkrājas CO ₂
		Vispārēja izlaišana: 50	Izlaiž vienu reizi, kad tripsis vai baltblusiņa parādās	
		Invāzijas perēkļos: 100	Izlaiž vienu reizi invāzijas perēkļos, kad tripsis vai baltblusiņa parādās. Ieteicams kombinēt ar citiem dzīvos organismus saturošiem līdzekļiem	

1	2	3	4	5

55. Swirskii-Mite LD

Reģ. Nr. 0621, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Ambliseius swirskii*).**Koppert B.V.**

Gurķi, pipari, baklažāni, rozes, gerberas (segtajās platībās)	Baltblusiņas (<i>Trialetrodes vaporariorum</i> , <i>Bremisia tabaci</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	Profilaktiski: iepakojums uz 2.5 m ²	Izlaiž ar 28–42 dienu intervālu	Plēsējērces un žāvēto augļu ērces iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +10 līdz +15°C temperatūrā, 1–2 dienas. Nodrošināt ventilāciju, lai neuzkrājas CO ₂
		Vispārēja izlaišana: iepakojums uz 2.5 m ²	Izlaiž ar 28 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: –	Lietot Swirskii-Mite Plus	

56. Swirskii-Mite Plus

Reģ. Nr. 0622, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Ambliseius swirskii*).**Koppert B.V.**

Krāšņumaugi, dārzeni (izņemot tomātus) (segtajās platībās)	Baltblusiņas (<i>Trialetrodes vaporariorum</i> , <i>Bremisia tabaci</i>), tripši (<i>Thysanoptera</i>)	Profilaktiski: iepakojums uz 2.5 m ²	Izlaiž ar 28–42 dienu intervālu	Plēsējērces un žāvēto augļu ērces iejauktas klijās. Uzglabāt tumsā, +10 līdz +15°C temperatūrā, 1–2 dienas. Nodrošināt ventilāciju, lai neuzkrājas CO ₂
		Vispārēja izlaišana: iepakojums uz 2.5 m ²	Izlaiž ar 28 dienu intervālu, kad tripši vai baltblusiņa parādās	
		Invāzijas perēkļos: iepakojums uz 1 m ²	Izlaiž ar 28 dienu intervālu invāzijas perēkļos. Ieteicams kombinēt ar citiem dzīvos organismus saturošiem līdzekļiem	

57. Thripex (Thripex-Plus)

Reģ. Nr. 0125, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: plēsējērce (*Neoseiulus cucumeris*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās) (Thripex)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Profilaktiskai izlaišanai: 50 plēsējērces/m ²	Izlaist plēsējērces atkārtoti ar 14 dienu intervālu	Plēsējērces kopā ar graudu ērci klijās. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +10°C–15°C, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 100 plēsējērces/m ²	Izlaist plēsējērces, kaitēklim parādoties, ar 14 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 100 plēsējērces/m ²	Izlaist plēsējērces, kaitēklim parādoties, ar 7 dienu intervālu	
Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās) (Thripex-Plus)	Tripši (<i>Thrips tabaci</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i>)	Profilaktiskai izlaišanai: 1 iepakojums (1000 plēsējērces/ 2.5 m ²)	Izlaist plēsējērces ar 42 dienu intervālu. Ziedošiem augiem likt vienu reizi	Plēsējērces kopā ar graudu ērci klijās aploksnē. Uzglabāt tumsā, temperatūrā no +10°C–15°C, ne ilgāk par 1–2 dienām
		Vispārējai izlaišanai: 1 iepakojums (1000 plēsējērces/ 2.5 m ²)	Izlaist plēsējērces ar 35 dienu intervālu	
		Invāzijas perēkļos: 1 iepakojums (1000 plēsējērces/ 0.75 m ²)	Izlaist plēsējērces ar 28 dienu intervālu	

1	2	3	4	5

58. Thripior-L

Reģ. Nr. 0646, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: laupītājblakts (*Orius laevigatus*).**Koppert B.V.**

Dārzeni, krāšņumaugi (segtajās platībās)	Tabakas tripsis (<i>Thrips tabaci</i>), Kalifornijas tripsis (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Profilaktiski: 0.5	Izlaist vismaz 2 reizes. Intervāls 14 dienas. Vienu reizi var izlaist kultūrās, kurās pieejami putekšņi	Pieauguši īpatņi un nimfas griķu sēnalās un vermikulītā. Uzglabāt tumsā, +8°C līdz + 10°C temperatūrā, 1–2 dienas
		Vispārēja izlaišana: 1	Izlaist vismaz 2 reizes. Intervāls 14 dienas	
		Invāzijas perēkļos: 10	Izlaist vienu reizi invāzijas perēkļos	

59. Trihogramma

Reģ. Nr.0143, reģ. klase 3.

Dzīvais organisms: spožlapsenīte (*Trichogramma embryophagum* Hartig).**SLA "Bioefekts"**

Ābeles	Ābolu tinējs (<i>Cydia pomonella</i>)	0.5–1.0 g/ha	Izlaist uz ābelēm, kad kaitēklis izlidojis, 2 reizes ar intervālu 7–10 dienas	Ar trihogrammu parazitētu graudu kodes olas. Uzglabāt tumsā, +5°C līdz +6°C temperatūrā, ne ilgāk par 3 nedēļām
Zirņi	Zirņu tumšais tinējs (<i>Cydia nigricana</i>)	0.5–1.0 g/ha	Izlaist zirņiem vienu reizi ziedēšanas sākumā. Ja zirņi bagātīgi zied, ieteicams izlikt atkārtoti	
Kāposti, krustziežu dzimtas dārzeni	Kāpostu baltenis (<i>Pieris brassicae</i>), rāceņu baltenis (<i>Pieris rapae</i>), kāpostu pūcīte (<i>Mamestra brassicae</i>)	0.5–1.0 g/ha	Izlaist kāpostos un krustziežu dāržos 1–2 reizes, kaitēkļu lidošanas sākumā	

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURIEM PAPLAŠINĀTA DARBĪBAS JOMA, IEKĻAUJOT TAJĀ MAZOS LIETOJUMUS*

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums	Reģ. Nr. / PT atļaujas Nr.	'Mazais lietojums'
2.4-D Nufarm	0095	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai pļavas lapsastes* , bezakotu lācauzas* , kamolzāles* , augstās dižauzas* , timotiņa* , pļavu auzenes* , pļavu skarenes* sējumos
Accurate 200 WG	0342	Atļauts lietot latvāņa ierobežošanai ceļa malās* , mežmalās* , lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs* , zemēs zem elektrolīnu pārvadiem* , kā arī nezāļu ierobežošanai linu* sējumos
Agil 100 EC	0003	Atļauts lietot ķimeņu* sējumos
Aliette	0650	Atļauts lietot aveņu* (jaunie stādījumi, atklātā laukā) stādījumos
Amistar 250 SC	0187	Atļauts lietot ķiploku* , ķirbju* , melones* , arbūzu* , paprikas* , salātu* (atklātā laukā un segtās platībās), krizantēmu* (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos
Amistar Gold	0632	Atļauts lietot lopbarības biešu* un galda biešu* sējumos
Arrva	0695	Atļauts lietot arī zāliena* sējumos
Attila 250 SC	20	Atļauts lietot ķiploku* , ķirbju* , melones* , arbūzu* , paprikas* , salātu* (atklātā laukā un segtās platībās), krizantēmu* (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos
Avtar 75 NT	0668	Atļauts ierobežot bumbieru-kadiķu rūsu* (<i>Gymnosporangium fuscum</i>) bumbieru stādījumos
Biscaya OD	0459	Atļauts lietot zemeņu* stādījumos
Boxer 800 EC	0271	Atļauts lietot lupīnu , lauka pupu , burkānu , sīpolu , ķiploku un saulespuķu* sējumos un sakņu seleriju un kātu seleriju* stādījumos
Butisan 400	0037	Atļauts lietot Pekinas kāpostu* un Ķīnas kāpostu* sējumos un stādījumos
Butoxone	0138	Atļauts lietot pupu* , baltā āboliņa* , sarkanā āboliņa* , galegas* sējumos
Candit	0197	Atļauts lietot tomātu* (segtās platībās), paprikas* (segtās platībās), krizantēmu (atklātā laukā* un segtās platībās), begoniju* (atklātā laukā un segtās platībās), nelķu* (atklātā laukā un segtās platībās) un gerberu* (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos, kā arī miltasas ierobežošanai ozoliem*
Champion 50 WG	0139	Atļauts lietot vīnogu* , ķiršu* , plūmju* , upeņu* , jāņogu* , ērķšķogu* , aveņu* , kazeņu* , krūmmelleņu* , krāšņumaugi segtās platībās: filodendronu* , arāliju* , acāliju* , juku* , rožu* (segtās platībās un atklātā laukā), nelķu* (segtās platībās un atklātā laukā), begoniju* (segtās platībās un atklātā laukā), krizantēmu* (segtās platībās un atklātā laukā), liliju* , tulpju* , gladiolu* , klinteņu* , pirakantu* , segliņu* , eфеju* stādījumos
Cliophar 600 SL	0665	Atļauts lietot arī Savojas kāpostu* stādījumos
Cycocel 750	0096	Atļauts lietot stiebrzāļu* sējumos sēklai
Delmetros 100 SC	0675	Atļauts lietot arī galviņkāpostu* stādījumos
Devrinols s.k.	0252	Atļauts lietot arī galviņkāpostu* , ziedkāpostu* , brokoļu* , Briseles kāpostu* , Ķīnas kāpostu* , upeņu* , jāņogu* , ērķšķogu* , aveņu* , krūmmelleņu* , ābeļu* , bumbieru* , plūmju* , ķiršu* , zemeņu* , zirņu* un pupu* stādījumos
Difcor 250 EC	0580	Atļauts lietot galviņkāpostu* , ziedkāpostu* , brokoļu* , Briseles kāpostu* , seleriju* (kātu), burkānu* , pētersīļu* (sakņu), pastinaku* , mārrutku* , seleriju* (sakņu), kāļu* , rāceņu* , melno rutku* , galda biešu* , cigoriņu* (sakņu), spargeļu* , puravu* , mangoldu* , rožu* (atklātā laukā un segtās platībās), krāšņumaugu* (atklātā laukā un segtās platībās) sējumos un stādījumos
Dithane NT	0017	Atļauts ierobežot bumbieru-kadiķu rūsu* (<i>Gymnosporangium fuscum</i>) bumbieru stādījumos.
Effector	0134	Atļauts lietot plūmju* , upeņu* , jāņogu* , ērķšķogu* un aveņu* stādījumos
Emin dārzam Mavrik Vita	31	Atļauts lietot krāšņumaugu* stādījumos atklātā laukā
Emin dārzam Revus 250 SC	26	Atļauts lietot gurķu* , kabaču* , cukīni* , patisonu* un ķirbju* (segtās platībās) sējumos un stādījumos
Emin dārzam Score 250 EC	33	Atļauts ierobežot bumbieru-kadiķu rūsu* (<i>Gymnosporangium fuscum</i>) bumbieru stādījumos. Atļauts lietot arī burkānu , seleriju (sakņu), sīpolu , ķiploku , šalotes , galda biešu un krizantēmu (gan atklātā laukā, gan segtās platībās) sējumos un stādījumos*

Envidor	0550	Atļauts lietot dekoratīvo augu* , augļu koku* stādu, ogulāju* stādu, krūmcidoniju* , ķiršu* , plūmju* , aprikožu* , persiku* , jāņogu* , upeņu* , krūmmelleņu* , aveņu* , kazeņu* , tomātu* , gurķu* , paprikas* sējumus un stādījumus. Atļauts lietot komatveida bruņutu (<i>Lepidosaphes ulmi</i>)* ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, kā arī bumbieru lapu pangērces (<i>Eriophyes pyri</i>)* ierobežošanai bumbieru stādījumos
Evure	0577	Atļauts lietot krāšņumaugu* (atklātā laukā) stādījumos.
Focus Ultra	0065	Atļauts lietot vasaras ripša* , mārrutku* , pastinaku* , selerijas* (sakņu), kāļu* , rāceņu* , turnepšu* , ķiploku* , krāšņumaugu* , pētersīļu* (lapu), selerijas* (kātu, lapu), salātu* sējumus un stādījumos, upeņu* , jāņogu* , ērķšķogu* , aveņu* , krūmmelleņu* stādījumos
Fusilade Forte 150 EC	0182	Atļauts lietot nezāļu ierobežošanai krūmcidoniju* , smiltserķšķu* , krūmmelleņu* , dzērveņu* , cigoriņu* (sakņu), sojas* , sarkanā āboliņa* , baltā āboliņa* , bastarda āboliņa* , sarkanās auzenes* (sēklai), griķu* , ķimeņu* (sējas gadā) sējumos un stādījumos
Kinvara	0672	Atļauts lietot arī zāliena* sējumos
Lentagran WP	0330	Atļauts lietot ķiploku* , kolrābju* , saldās kukurūzas* sējumus un spargēļu* stādījumos
Lontrel 600 SL	0666	Atļauts lietot arī Savoja kāpostu* stādījumos, ziemas ripša* un vasaras ripša* sējumos
MAGTOXIN TABLET	0111	Atļauts lietot šādu kultūraugu fumigēšanai: Pupas* , zirņi* , rapši* , lupīna* , soja* , linsēklas* , kukurūza* , sauļepu sēklas* (pārtikai, lopbarībai, sēklai); dārza pupiņas* , rīsi* , sorgo* , prosa* , griķi* , rieksti* , kakao pupiņas* , kafijas pupiņas* , kaltēti augi* , žāvēti dārzeņi* , žāvēti augļi* ; dārza pupiņas* , griķi* , zālaugu sēklas* (sēklai); apalīe kokmateriāli* (zāgbaļķi, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka), zāgmateriāli* , koksnes un kokmateriālu izstrādājumi* , iesaiņojamie materiāli* , starplikas* , šķelda* , mulča* (sasmalcināta koku miza, koksne), kūdra* , kokvilna* ķīpās un saiņos, iesaiņoti pārtikas produkti*
Mavita 250 EC	0576	Atļauts lietot burkānu* , selerijas (sakņu)*, sīpolu* , ķiploku* , šalotes sīpolu* , galda biešu* un krizantēmu* (atklātā laukā un segtās platībās) stādījumos
Mavrik	0526	Atļauts lietot krāšņumaugu* (atklātā laukā) stādījumos
Maxim 025 FS	0089	Atļauts lietot zirņu* , lauka pupu* un lupīnu* sēklu kodināšanai, kā arī fomozes (<i>Phoma exigua</i>)*, paugurainā kraupja (<i>Polyscytalum pustulans</i>)* un parastā kraupja (<i>Steptomyces scabies</i>)* ierobežošanai kartupeļos
Maxim Star 025 FS	0150	Atļauts lietot linu* sēklu kodināšanai.
Merpan 80 WG	0499	Atļauts lietot arī puķu sīpolu (tulpes* , gladiolas* , lilijas* , narcises* , hiacintes* , īriši* , krokusi*) mērcēšanai pirms stādīšanas, kā arī apšu* , ķļavu* un rododendru* apsmidzināšanai stādaudzētavās gan atklātā laukā, gan segtās platībās
Mirador 250 SC	0591	Atļauts lietot arī ķiploku* , ķirbju* , melones* , arbūzu* , paprikas* (segtais platībās), salātu* (atklātā laukā un segtais platībās) un krizantēmu* (atklātā laukā un segtais platībās) sējumos un stādījumos
Mirage	0130	Atļauts lietot sēnēm* segtais platībās
Mistral 700 WG	0259	Atļauts lietot burkānu* un sojas* sējumos
NeemAzal-T/S	0241	Atļauts lietot galvīnkāpostu* , Briseles kāpostu* , Savoja kāpostu* , garšaugu* (izņemot maurlokus), spinātu* , biešu* (atklātā laukā), cidoniju* , vinogulāju* un ozolu* stādījumos. Atļauts ierobežot tīklērces (<i>Tetranychus urticae</i>)* vairākos dārzeņos un garšaugos, augļkoku sarkano tīklērci (<i>Panonychus ulmi</i>)* ābeļu un cidoniju stādījumos un tīklērces (<i>Tetranychidae</i>)* krāšņumaugu un dekoratīvo augu (izņemot skujkokus) stādījumos
Nuance 75 WG	0403	Atļauts lietot latvāņa ierobežošanai ceļa malās* , mežmalās* , lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs* , zemēs zem elektrolīnu pārvadiem*
PHOSTOXIN TABLET	0112	Atļauts lietot šādu kultūraugu fumigēšanai: Lupīna* , soja* , linsēklas* , kukurūza* , sauļepu sēklas* (pārtikai, lopbarībai, sēklai); dārza pupiņas* , rīsi* , sorgo* , prosa* , griķi* , rieksti* , kakao pupiņas* , kafijas pupiņas* , kaltēti augi* ; dārza pupiņas* , griķi* , zālaugu sēklas* , (sēklai); apalīe kokmateriāli* (zāgbaļķi, finierkluči, papīrmalka, stabi, mieti, malka), zāgmateriāli* , koksnes un kokmateriālu izstrādājumi* , iesaiņojamie materiāli* , starplikas* , šķelda* , mulča* (sasmalcināta koku miza, koksne), kūdra* , kokvilna* ķīpās un saiņos, iesaiņoti pārtikas produkti*
Pictor Active	0642	Atļauts lietot ziemas ripša* , vasaras ripša* , sinepju* , eļļas rutku* , kaņepju* un linu* sējumos. Atļauts lietot arī lauka pupu* (graudiem) un zirņu* (graudiem) sējumos
Prestop	0681	Atļauts lietot lapu kokiem* , skuju kokiem* kokaudzētavās (segtais platībās un atklātā laukā), gurķiem* , ķirbjaugiem* (atklātā laukā), krustziežu dārzeņiem* , sīpoliem* , ķīplokem* (pirms izstādīšanas atklātā laukā, tuneļos), sīpoliem* , ķīplokem* (tuneļos), sīpoliem* , ķīplokem* (atklātā laukā), zemenēm* , avenēm* (segtais platībās, tuneļos), zemenes* (atklātā laukā), krūmmellenēm* (tuneļos, atklātā laukā), dzērvenēm*
Propulse	0416	Atļauts lietot arī lauka pupu* (graudiem) un zirņu* (graudiem) sējumos
Prosaro	0276	Atļauts lietot pupu* un zirņu* sējumos. Pupas graudiem (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas). Zirņi graudiem

Proteus OD	0275	Atļauts lietot arī pupu* , zirņu* , galviņkāpostu* , brokoļu* , Briseles kāpostu* sējumos un stādījumos, kā arī zemeņu* (atklātā laukā un segtās platībās) un aveņu* stādījumos
Rapsan 400 SC	0617	Atļauts lietot Pekinas kāpostu* un Ķīnas kāpostu* sējumos un stādījumos
Revus 250 SC	0312	Atļauts lietot salātu* (segtās platībās), gurķu* , kabaču* , cukīni* , patisonu* un ķirbju* (segtās platībās) sējumos un stādījumos
Scenic Gold		Atļauts lietot ziemas ripsim* un vasaras ripsim*
Score 250 EC	0001	Atļauts ierobežot bumbieru-kadiķu rūsu* (<i>Gymnosporangium fuscum</i>) bumbieru stādījumos. Atļauts lietot arī burkānu , seleriju (sakņu), sīpolu , ķiploku , šalotes , galda biešu un krizantēmu (gan atklātā laukā, gan segtās platībās) sējumos un stādījumos*
Serenade Aso	0556	Atļauts lietot burkānu* , puravu* , tomātu* , paprikas* (segtās platībās), gurķu* (atklātā laukā un segtās platībās), pipargurķišu* (atklātā laukā un segtās platībās), ķirbju*, arbūzu* , meloņu* (atklātā laukā), kabaču* (atklātā laukā un segtās platībās), cukīni* (atklātā laukā un segtās platībās), galda biešu* , brokoļu* , Briseles kāpostu* , ziedkāpostu* (atklātā laukā un segtās platībās), Ķīnas kāpostu* (atklātā laukā un segtās platībās), seleriju* (sakņu, kātu, lapu), pētersīļu* (sakņu, lapu), pastinaku* (atklātā laukā un segtās platībās), kolrābju* , rāceņu* , batašu* , mārrutku* , spargeļu* , redīsu* (atklātā laukā un segtās platībās), fenheļu* (segtās platībās), cigoriņu* (sakņu), salātu* , endīviņu* , rukolas* , spinātu* (atklātā laukā un segtās platībās), kāršu pupu* , pupiņu* , zirņu* (atklātā laukā un segtās platībās), šalotes sīpolu* , sīpolu* (lokiem), sīpolu* , ķiploku* , sojas* , ķimeņu* , linu* , magoņu* , kaņepju* , garšaugu (baziliks*, gurķu mētra*, pupu mētra*, koriandrs*, kressalāti*, dilles*, majorāns*, piparmētra*, raudene*, rozmarīns*, timiāns*) (atklātā laukā un segtās platībās), aveņu* , upeņu* , ērķšķogu* , jāņogu* , kazeņu* , krūmmelleņu* , dzērveņu* , zemeņu* (atklātā laukā un segtās platībās), ķiršu* , plūmju* , aprikožu* , persiku* , bumbieru* , krāšņumaugu* (atklātā laukā un segtās platībās), kokaugu* , krūmu* (kokaudzētavās, atklātā laukā un segtās platībās), kvinojas* sējumos un stādījumos
Signum	0269	Atļauts lietot pupu* sējumos. Pupas graudiem (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas). Atļauts lietot arī ķiploku* stādījumos
Starane XL	0277	Atļauts lietot arī stiebrzāļu* sējumos
Switch 62.5 WG	0244	Atļauts lietot skuju koku* , lapu koku* , dekoratīvo krūmu* stādījumos kokaudzētavās, paprikas* un baklažānu* stādījumos segtās platībās, kabaču* un cukīni* sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, ķirbju* un meloņu* stādījumos atklātā laukā, salātu* un endīviņu* sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, burkānu* , sakņu pētersīļu* , melnasaknes* , pastinaku* , galda biešu* , mārrutku* , seleriju* (sakņu), sīpolu* , šalotes* , ķiploku* sējumos un stādījumos atklātā laukā, zirņu* , pupu* , pupiņu* sējumos un stādījumos svaigam patēriņam un graudiem, zālienā* golfa laukumā
Targa Super	0383	Atļauts lietot arī pupu* un zirņu* sējumos
Teppeki	0699	Atļauts lietot arī ķiršu* , plūmju* , galviņkāpostu* , Briseles kāpostu* stādījumiem un krāšņumaugiem*
Topas 100 EC	0009	Atļauts ierobežot bumbieru-kadiķu rūsu* (<i>Gymnosporangium fuscum</i>) bumbieru stādījumos , ogulāju stabiņrūsu* (<i>Cronartium ribicola</i>), ogu krūmu kausiņrūsu* (<i>Puccinia rebesii-caricis</i>) upeņu un ērkšķogu stādījumos. Atļauts lietot jāņogu , ķiršu , dekoratīvo kokaugu , krizantēmu , ķirbju , cukīni , meloņu un arbūzu* stādījumos un lapu koku stādījumos kokaudzētavās*
Vredmix	0711	Atļauts lietot lopbarības biešu* un galda biešu* sējumos
Zetrola	0578	Atļauts lietot ķimeņu* sējumos (sējas gadā)
Zypar	0555	Atļauts lietot latvāņu ierobežošanai ceļa malās* , mežmalās* , lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs* , zemēs zem elektrolīniju pārvadiem*

“Mazais lietojums” ir augu aizsardzības līdzekļa lietošana attiecīgā dalībvalstī augiem vai augu produktiem, kurus: a) šajā dalībvalstī neaudzē lielās platībās; vai b) audzē lielās platībās, – lai apmierinātu ārkārtēju augu aizsardzības vajadzību.

* **Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu un nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

FUNGICĪDI KARTUPEĻU LAKSTU PUVES (*Phytophthora infestans*) IEROBEŽOŠANAI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha, %	Ieteicamais intervāls smidzinājumiem, dienās	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Sistēmas iedarbības fungicīdi				
Infinito	1.2-1.6	7-12	7	4
	12-16 ml/100 m²			
Sistēmas un pieskares iedarbības fungicīdi				
Ridomil Gold MZ 68 WG	2.5	10-14	7	2
Lokālas sistēmas iedarbības fungicīdi				
Elektis 75 d.g.	1.8	7-10	7	8
Emin dārzam Revus 250 SC	12 ml/10 l	7-10	3	3
Revus 250 SC	0.6	7-10	3	6
	12 ml/10 l			3
Revus Top	0.6	7-10	3	3
Zorvec Enicade	0.15	7-10	7	4
Lokālas sistēmas un pieskares iedarbības fungicīdi				
Acrobat Plus	2.0	10-14	7	4
Banjo Forte	0.75-1.0	7-10	7	4
Orvego	0.8	5-10	7	3
Pieskares iedarbības fungicīdi				
Altima 500 s.k.	0.4	7-14	7	8
Avtar 75 NT	2.0	7-10	7	8
Champion 50 WG	1.5-2.0	7-10	7	2
Dithane NT	2.0-3.0	7-10	7	8
Frownicide 500 s.k.	0.4	7-10	7	8
Leimay SC	0.5	7-10	7	4
Manfil 75 WG	2.13	7-14	7	8
Manfil 80 WP	2.0	7-14	7	8
Nando 500 SC	0.3-0.4	7-10	1	8
Ohayo 500 s.k.	0.4	7-10	7	8
Penncozeb 75 DG	2.0	7-14	7	8
Penncozeb 80 WP	2.0	7-14	7	8
Ranman Top	0.5	5-10	7	6
Širlans 500 s.k.	0.4	7-14	7	8
Tridex DG	2.0	7-14	7	8
Trimanoc DG	2.0	7-14	7	8
Winby 500 s.k.	0.4	7-10	7	8

FUNGICĪDI AUGĻU DĀRZIEM

Kaitīgais organisms	Pelēkā puve <i>Botryotinia fuckeliana</i>																				
	Vējplūmes <i>Taphrina pruni</i>	•																			
	Plūmju rūsa <i>Tranzschelia discolor</i>	•																			
	Plūmju rūsa <i>Transchelia pruni-spinosae</i>																				
	Ķiršu kraupis <i>Venturia cerasi</i>																				
	Ķiršu lapbire <i>Blumeriella jaapii</i>																				
	Kaulenķoku sausplankumainība <i>Stigmia carpophila</i>	•																			
	Kaulenķoku pelēkā puve <i>Monilinia laxa</i>																				
	Bumbieru rūsa <i>Gymnosporangium sabinaea</i>	*																			
	Bumbieru kraupis <i>Venturia pirina</i>	•	•	•																	
	Augļu rūgtā puve <i>Pezicula alba</i> , <i>Colletotrichum gleosporioides</i>																				
	Augļu parastā puve <i>Monilinia fructigena</i>																				
	Augļu koku vēzis <i>Nectria galligena</i>																				
	Ābeļu miltrasa <i>Podosphaera leucotricha</i>																				
	Ābeļu kraupis <i>Venturia inaequalis</i>	•	•	•																	
	Apstrādājamā kultūra / deva l, kg/ha	Plūmes		2.0																	
Ķirši			2.0																		
Bumbieres			2.0	0.15-0.25																	
Ābeles		2.0	0.15-0.25	0.30-0.45																	
Augu aizsardzības līdzeklis	Avtar 75 NT																				
	Candit																				
	Chorus 50 WG																				
	Champion 50 WG																				
	Delan Pro																				
	Difcor 250 EC																				
	Difenzone																				
	Dithane NT																				
	Effector																				
	Manfil 75 WG																				
	Manfil 80 WP																				
	Mavita 250 EC																				
	Merpan 80 WG																				
	Scab 80 WG																				
	Score 250 EC																				
	Signum																				
Syllit 544 SC																					
Topas 100 EC																					

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

TO DEVAS UN IEROBĒŽOJAMĀS AUGU SLIMĪBAS

[illegible]

[illegible]

FUNGICĪDI GRAUDAUGIEM

MIEŽI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms											
		Melnais sodrējums <i>Alternaria alternata</i> <i>Cladosporium herbarum</i>	Miežu lapu brūnplankumainība <i>Bipolaris sorokiniana</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fusarium spp.</i>	Miežu lapu brūnsvītrainība <i>Drechslera graminea</i>	Miežu lapu tiklplankumainība <i>Drechslera teres</i>	Graudzāļu miltrasa <i>Erysiphe graminis</i>	Sakņu puve <i>Fusarium spp.</i>	Pundurrūsa <i>Puccinia hordei</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Stiebrzāļu gredzenplan- kumainība <i>Rhynchosporium secalis</i>	Ramulārija <i>Ramularia collo-cygni</i>	Stiebru lūšana <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>
Adexar XE	1.33-2.0					•	•		•		•	•	•
Amistar 250 SC	0.8-1.0					•			•	•	•		
Ampera	1.2-1.5			•		•	•		•		•		
Artina EC	0.7					•			•	•	•		
Ascra Xpro	0.6-1.2					•	•		•		•	•	
Azaka	0.8-1.0					•	•		•		•		
Bell	0.75-1.5					•			•	•	•	•	•
Bell Super	1.25-2.5					•	•		•		•	•	•
Bolid 250 SE	1.0					v •			v •		v •		
Cerix	1.5-3.0					•	•		•		•	•	
Cezix	1.0			•		•	•		•		•		
Comet Pro	1.25					•			•	•			
Curbatur	0.6-0.8			•		•	•		•		•		•
DARCOS	1.0			•		•	•		•		•		
Delaro	0.6-0.8; 0.8*			•*		•	•		•		•	•	
Dominic	1.0					•	•		•		•		
Duett Ultra	0.3-0.6					•	•		•	•	•		
Elatas Era	0.75-1.0					•			•		•	•	
Elatas Plus	0.375-0.750					•			•		•	•	
Epox Extra	1.0-2.0					•	•		•		•		
Epox Top	1.5-2.5					•	•				•		
Erasmus	1.0			•		•	•		•		•		
Falcon Forte	0.6-0.8					•	•		•		•		
Fleksiti s.k.	0.5						•						
Folicur	1.0			•			•						
Gemino	1.0-1.5					•	•						
Globaztar 250 SC	1.0; 0.5+0.5					•	•		•		•		
Imtrex XE	1.0-2.0					•	•		•	•	•	•	
Input	0.8-1.0			•		•	•	•	•		•		•
Input Triple	0.75					•	•		•		•		•
Juventus 90	0.7					•			•	•	•		
Kantik	1.5-2.0					•	•		•	•	•		
Leander	0.5						•		•	•			
Librax	1.0-2.0			•		•	•		•		•	•	
Maracas	1.0-2.0					•	•		•		•		
Maredo 125 SC	0.5-1.0					•	•		•	•	•		
Mirador 250 SC	0.8-1.0					•			•	•	•		
Mirador Forte	1.5-2.0					•	•		•		•		
Mirador Xtra	0.75-1.0					•	•		•		•		
Mirage	1.0					•	•				•		
Mystic	1.0	•		•		•	•		•		•		
Mystic 250 EW	1.0			•		•	•		•		•		
Opera N	1.0-2.0					•	•		•	•	•	•	
Opus EC	0.75-1.5				•	•	•		•	•	•		
Opus	0.5-1.0		•			•	•		•	•	•		
Orius 250 EW	1.0			•		•	•		•		•		
Osiris	2.0					•				•	•		
Osiris Star	1.33					•				•	•	•	
Plexeo 90	0.7					•			•	•	•		
Priaxor	0.75-1.5					•	•		•	•	•	•	
Proline	0.6-0.8			•		•	•		•		•		•

Property 180 SC	0.5						•						
Prosaro	0.75-1.0		•	•		•	•		•	•	•		
Revystar XL	0.75-1.5					•	•		•		•	•	
Revytrex	0.75-1.5					•	•		•		•	•	
Riza 200 EC	1.25					•	•		•		•		
Riza 250 EW	1.0					•	•		•	•	•		
RUBRIC	1.0					•	•		•		•		
Siltra Xpro	0.75-1.0					•	•		•		•	•	
Syrius	1.0			•		•	•		•		•		
Talius	0.125-0.250						•						
Tango Flex	0.75-1.5					•	•		•	•	•	•	
Tebuplius	1.0					•	•		•		•		
Tebusha 25 EW	1.0					•	•		•		•		
Torero	0.8-1.0					•	•		•		•		
Turret 90	0.7					•			•	•	•		
Variano Xpro	1.0-1.25			•		•	•		•		•		
Viverda	1.25-2.5					•	•		•		•	•	•
Zakeo Xtra	0.75-1.0					•	•		•		•		
Zoxy 250	0.8-1.0					•	•		•		•		

KVIEŠI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms									
		Melnais sodrējums <i>Alternaria alternata</i> <i>Cladosporium herbarum</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fusarium spp.</i>	Kviešu lapu dzeltenplankumainība <i>Drechslera tritici-repentis</i>	Graudzāļu miltrasa <i>Erysiphe graminis</i>	Sakņu puve <i>Fusarium spp.</i>	Stiebru lūšana <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>	Brūnā rūsa <i>Puccinia recondita</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Kviešu plēkšņu plankumainība <i>Septoria nodorum</i>	Kviešu lapu pelēkplankumainība <i>Septoria tritici</i>
Adexar XE	1.33-2.0			•	•		•	•	•	•	•
Afrodyta 250 SC	0.8-1.0			z.	z.						z.
Amistar 250 SC	0.8-1.0							•	•	•	
Ampera	1.0-1.5		•	•	•					•	•
Artina EC	0.7; 1.0*		•*	•				•	•	•	•
Ascra Xpro	0.75-1.5			•	•			•	•	•	•
Avtar 75 NT	2.0							z.			z.
Azaka	0.8-1.0			•	•			•			•
Bell	0.75-1.5						•	•	•	•	•
Bell Super	1.25-2.5			•			•	•	•	•	•
Bolid 250 SE	1.0			z.				z.			z.
Cerix	1.5-3.0			•	•			•	•	•	•
Cezix	1.0		•	•	•			•		•	•
Comet Pro	1.25			•				•	•	•	•
Comrade	1.0				•			•			•
Curbatur	0.6-0.8		•	•	•		•	•			•
DARCOS	1.0		•	•	•			•		•	•
Delaro	0.6-0.8; 0.8*		•*	•	•			•		•	•
Dithane NT	2.0							z.			z.
Dominic	1.0		•		•			•		•	•
Duett Ultra	0.3-0.6			•	•			•	•	•	•
Elatus Era	0.75-1.0		•					•	•	•	•
Elatus Plus	0.375- 0.750							•	•	•	•
Epo Extra	1.0-2.0			•	•			•	•	•	•
Epo Top	1.5-2.5			•	•					•	•
Erasmus	1.0		•	•	•			•		•	•
Falcon Forte	0.6-0.8			•	•			•	•	•	•
Fleksiti s.k.	0.5				•						
Folicur	1.0		•	•	•			•	•	•	•
Gemino	1.0-1.5			•	•						•

Globaztar 250 SC	1.0; 0.5+0.5			•					•	•	•
Imtrex XE	2.0			•	•			•	•	•	•
Input	0.8-1.0		•	•	•	•	•	•		•	•
Input Triple	0.75			•	•		•	•			•
Juventus 90	0.7; 1.0*		• *	•				•	•	•	•
Kantik	1.5-2.0			•	•		•	•	•	•	•
Leander	0.5				•			•	•		
Librax	1.0-2.0		•	•	•			•	•	•	•
Maracas	1.0-2.0			•	•			•		•	•
Maredo 125 SC	0.5-1.0			•	•			•	•	•	•
Mirador 250 SC	0.8-1.0							•	•	•	
Mirador Forte	1.5-2.0			•	•			•	•	•	•
Mirador Xtra	0.75-1.0; 0.5+0.5			•	•			•	•	•	•
Mirage	1.0			•	•	•				•	•
Mystic	1.0		•	•	•						•
Mystic 250 EW	1.0		•	•	•			•	•		•
Opera N	1.0-2.0			•				•	•	•	•
Opus EC	0.75-1.5			•	•			•	•	•	•
Opus	0.5-1.0			•				•	•	•	•
Orius 250 EW	1.0		•		•			•	•	•	•
Osiris	2.0			•					•		•
Osiris Star	1.33			•					•		•
Plexeo 90	0.7; 1.0*		• *	•				•	•	•	•
Priaxor	0.75-1.5			•	•			•	•	•	•
Proline	0.6-0.8		•	•	•		•	•	•	•	•
Property 180 SC	0.5				•						
Prosaro	0.75-1.0		•	•	•			•	•	•	•
Revystar XL	0.75-1.5			•	•			•	•		•
Revytrex	0.75-1.5			•	•			•	•		•
Riza 200 EC	1.25		•		•			•	•	•	•
Riza 250 EW	1.0	•	•	•	•			•	•	•	•
RUBRIC	1.0			•	•				•		•
Siltra Xpro	0.75-1.0		•	•	•			•	•	•	•
Syrius	1.0		•		•			•	•	•	•
Swing Gold	1.5		•	•				•		•	•
Talius	0.1225- 0.250				•						
Tango Flex	0.75-1.5			•	•			•	•	•	•
Tebuplius	1.0		•		•			•		•	•
Tebusha 25 EW	1.0		•		•			•		•	•
Torero	0.8-1.0			•	•			•			•
Turret 90	0.7; 1.0*		• *	•				•	•	•	•
Variano Xpro	1.0-1.25		•	•	•			•		•	•
Viverda	1.25-2.5			•			•	•	•	•	•
Zakeo Xtra	0.75-1.0			•	•			•	•	•	•
	0.5+0.5			•	•			•	•	•	•
Zoxy 250	0.8-1.0			•	•			•			•

RUDZI

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms							
		Melnais sodrējums <i>Alternaria alternata</i> <i>Cladosporium herbarum</i>	Stiebru lūšana <i>Pseudocercospora herpotricoides</i>	Graudzāļu milt rasa <i>Erysiphe graminis</i>	Brūnā rūsa <i>Puccinia recondita</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Stiebrzāļu gredzenplankumainība <i>Rhynchosporium secalis</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fusarium spp.</i>	Kviešu lapu pelēkplankumainība <i>Septoria tritici</i>
Adexar XE	1.33-2.0		•	•	•	•	•		
Amistar 250 SC	0.8-1.0				•	•	•		
Ampera	1.2-1.5			•				•	•
Artina EC	0.7				•	•	•		
Ascra Xpro	0.75-1.5			•	•		•		
Azaka	0.8-1.0			•	•				
Bell	0.75-1.5		•		•	•	•		
Bell Super	1.25-2.5		•		•	•	•		
Cerix	1.5-3.0			•	•	•	•		
Comrade	1.0				•				
Curbatur	0.6-0.8		•	•	•		•	•	
Delaro	0.6-0.8; 0.8*			•	•		•	•	
Duett Ultra	0.3-0.6			•	•	•	•		
Elatas Era	0.75-1.0				•		•		
Elatas Plus	0.375-0.750				•		•		
EpoX Top	1.5-2.5			•	•		•		
Falcon Forte	0.6-0.8			•	•	•	•		
Fleksiti s.k.	0.5			•					
Globaztar 250 SC	1.0; 0.5+0.5			•			•		
Imtrex XE	2.0			•	•	•	•		
Input	0.8-1.0				•	•		•	
Input Triple	0.75		•	•	•		•		
Juventus 90	0.7				•	•	•		
Kantik	1.5-2.0			•	•	•			•
Leander	0.5			•	•				
Librax	1.0-2.0			•	•	•	•	•	•
Maracas	1.0-2.0				•		•		
Maredo 125 SC	0.5-1.0				•	•	•		
Mirador 250 SC	0.8-1.0				•	•	•		
Mirador Forte	1.5-2.0			•	•		•		
Mirador Xtra	0.75-1.0			•	•		•		
Mystic	1.0				•		•		
Mystic 250 EW	1.0			•	•	•	•		
Opera N	1.0-2.0			•	•	•	•		
Opus EC	0.75-1.5			•	•		•		
Opus	0.5-1.0			•	•	•	•		
Orius 250 EW	1.0			•	•		•	•	
Osiris	2.0					•	•		
Osiris Star	1.33					•	•		
Plexeo 90	0.7				•	•	•		
Priaxor	0.75-1.5			•	•		•		
Proline	0.6-0.8		•	•	•		•	•	
Property 180 SC	0.5			•					
Prosaro	0.75-1.0			•	•	•	•	•	
Revystar XL	0.75-1.5			•	•		•		
Revytrex	0.75-1.5			•	•		•		
Riza 200 EC	1.25			•	•	•	•	•	
Riza 250 EW	1.0	•		•		•	•	•	
RUBRIC	1.0						•		
Siltra Xpro	0.75-1.0				•		•	•	
Syrius	1.0			•	•		•	•	
Talius	0.125-0.250			•					
Tango Flex	0.75-1.5			•	•	•	•		
Torero	0.8-1.0			□	□				

Turret 90	0.7				•	•	•		
Variano Xpro	1.0-1.25			•	•		•	•	
Viverda	1.25-2.5		•			•	•		
Zakeo Xtra	0.75-1.0			•	•		•		
Zoxy 250	0.8-1.0			•	•				

TRITIKĀLE

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms										
		Melnais sodrējums <i>Alternaria alternata</i> <i>Cladosporium herbarum</i>	Graudzāļu miltresa <i>Erysiphe graminis</i>	Sakņu puve <i>Fusarium spp.</i>	Brūnā rūsa <i>Puccinia recondita</i>	Stiebrzāļu gredzenplankumainība <i>Rhynchosporium secalis</i>	Kviešu plēkšņu plankumainība <i>Septoria nodorum</i>	Kviešu lapu pelēkplankumainība <i>Septoria tritici</i>	Dzeltenā rūsa <i>Puccinia striiformis</i>	Kviešu lapu dzeltenplankumainība <i>Drechslera tritici-repentis</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fusarium spp.</i>	Stiebru lušana <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>
Adexar XE	1.33-2.0		•		•	•	•	•	•	•		•
Amistar 250 SC	0.8-1.0				•	•			•			
Ampera	1.0-1.5		•				•	•		•	•	
Artina EC	0.7; 1.0*				•		•	•	•	•	•*	
Asera Xpro	0.75-1.5		•		•	•	•	•	•	•		
Azaka	0.8-1.0		•		•							
Bell	0.75-1.5				•		•	•	•			•
Bell Super	1.25-2.5				•	•	•	•	•	•		•
Bolid 250 SE	1.0				z•			z•		z•		
Cerix	1.5-3.0		•		•		•	•	•	•		
Comrade	1.0		•		•			•				
Curbatur	0.6-0.8		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Delaro	0.6-0.8; 0.8*		•		•	•	•	•		•	•*	
Duett Ultra	0.3-0.6		•		•			•	•	•		
Elatas Era	0.75-1.0				•	•	•	•	•			
Elatas Plus	0.375-0.750				•	•	•	•	•			
Epox Extra	1.0-2.0		•		•	•	•	•	•	•		
Epox Top	1.5-2.5		•		•	•	•	•	•			
Falcon Forte	0.6-0.8		•		•	•	•	•	•	•		
Fleksiti s.k.	0.5		•									
Gemino	1.0-1.5		•					•		•		
Globaztar 250 SC	1.0; 0.5+0.5		•			•	•	•	•	•		
Imtrex XE	2.0		•		•		•	•	•	•		
Input	0.8-1.0		•	•	•	•	•	•		•	•	•
Input Triple	0.75		•		•	•		•		•		•
Juventus 90	0.7; 1.0*				•		•	•	•	•	•*	
Kantik	1.5-2.0		•		•		•	•	•			
Leander	0.5		•		•				•			
Librax	0.75-1.0		•		•	•	•	•	•		•	
Maracas	1.0-2.0		•		•		•			•		
Maredo 125 SC	0.5-1.0		•		•		•	•	•	•		
Mirador 250 SC	0.8-1.0				•	•			•			
Mirador Forte	1.5-2.0		•		•		•	•	•			
Mirador Xtra	0.75-1.0		•		•	•	•	•	•	•		
Mirage	1.0		•				•	•		•		•
Mystic	1.0				•	•						
Mystic 250 EW	1.0		z•		z•	z•			•			
Opera N	1.0-2.0				•	•	•	•	•	•		
Opus EC	0.75-1.5		•		•	•	•	•	•	•		
Opus	0.5-1.0				•		•	•	•	•		
Osiris	2.0							•	•	•		
Osiris Star	1.33							v	•	•		
Plexeo 90	0.7; 1.0*				•		•	•	•	•	•*	
Priaxor	0.75-1.5		•		•	•	•	•	•	•		

Proline	0.6-0.8		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Property 180 SC	0.5		•									
Prosaro	0.75-1.0		•		•	•	•	•	•		•	
Revystar XL	0.75-1.5		•		•	•	•	•	•	•		
Revytrex	0.75-1.5		•		•	•	•	•	•	•		
Riza 200 EC	1.25		•		•		•	•	•		•	
Riza 250 EW	1.0	•	•		•	•	•	•	•		•	
RUBRIC	1.0		•			•		•				
Siltra Xpro	0.75-1.0				•	•	•	•	•		•	
Talius	0.125-0.250		•									
Tango Flex	0.75-1.5		•		•		•	•	•	•		
Torero	0.8-1.0		•		•							
Turret 90	0.7; 1.0*				•		•	•	•	•	•*	
Variano Xpro	1.0-1.25		•		•	•	•	•	•	•	•	
Viverda	1.25-2.5				•		•	•	•	•		•
Zakeo Xtra	0.75-1.0		•		•	•	•	•	•	•		
Zoxy 250	0.8-1.0		•		•							

AUZAS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms				
		Auzu lapu brūnplanku- mainība <i>Drechslera avenae</i>	Graudzāļu mitrāsa <i>Erysiphe graminis</i>	Auzu vainagrūsa <i>Puccinia coronata</i>	Auzu pelēkplanku- mainība <i>Stagonospora avenae</i>	Vārpu fuzarioze <i>Fusarium spp.</i>
Adexar XE	1.33-2.0		•	•		
Ampera	1.0-1.5	•				•
Artina EC	0.7	•				
Ascra Xpro	0.6-1.2	•	•	•		
Bell	0.75-1.5			•		
Bell Super	1.25-2.5			•	•	
Cerix	1.5-3.0		•	•		
Comet Pro	1.25			•		
Delaro	0.6-0.8; 0.8		•			•
Duett Ultra	0.3-0.6		•	•		
Epox Top e.k.	1.5-2.5	•				
Fleksiti s.k.	0.5		•			
Globaztar 250 SC	1.0	•		•		
Imtrex XE	1.0-2.0	•	•	•		
Juventus 90	0.7	•				
Librax	1.0-2.0	•				•
Maracas	1.0-2.0	•		•		
Maredo 125 SC	0.5-1.0	•		•		
Mirador Forte	1.5-2.0		•			
Mirage	1.0				•	
Mystic 250 EW	1.0	•		•		
Opera N	1.0-2.0		•	•		
Opus EC	0.75-1.5			•		
Opus	0.5-1.0		•	•		
Orius 250 EW	1.0		•	•		
Plexeo 90	0.7	•				
Priaxor	0.75-1.5	•				
Property 180 SC	0.5		•			
Prosaro	0.75-1.0		•	•	•	
Revystar XL	0.75-1.5	•				
Revytrex	0.75-1.5	•				
Riza 250 EW	1.0		•		•	
RUBRIC	1.0		•			
Siltra Xpro	0.75-1.0	•				•
Syrius	1.0		•	•		
Tango Flex	0.75-1.5		•	•		
Turret 90	0.7	•				
Viverda	1.25-2.5			•	•	

FUNGICĪDI RAPSIM

ZIEMAS RAPSIS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms					
		Baltā puve <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Pelēkā puve <i>Botrytis cinerea</i>	Krustziežu sausā puve <i>Phoma lingam</i>	Krustiežu sausplankumainība <i>Alternaria brassicae</i>	Krustiežu gaišplankumainība <i>Pyrenopeziza brassicae</i>	Neistā miltāsa <i>Peronospora brassicae</i>

Amistar 250 SC	0.8-1.0	•			•		
Amistar Gold	0.75	•					
Ampera	1.0	•					
Artina EC	0.5			•	•		
	0.7	•			•		
Attila 250 SC	0.5-0.75			•	•		•
	0.75	•	•		•		
Azaka	1.0	•			•		
Bolid 250 SE	1.0	•	•		•		
Cantus	0.5	•			•		
Cantus Gold	0.4-0.5	•			•		
Cezix	0.75		•	•	•		
	1.0-1.5			•			
	1.0		•		•		
DARCOS	0.75		•	•	•		
	1.0-1.5			•			
	1.0		•		•		
Efilor	1.0			•			
	0.7-1.0	•			•		
Erasmus	0.75		•	•	•		
	1.0-1.5			•			
	1.0		•		•		
Folicur	0.5			•	•	•	
	1.0	•	•	•	•	•	
Juventus 90	0.5			•	•		
	0.7	•			•		
Mirador 250 SC	0.8-1.0	•			•		
Mirador Forte	2.0	•	•		•		
Mirador Xtra	1.0	•			•		
Mystic	1.0	•		•	•		
Mystic 250 EW	0.5			•			
	1.0	•			•		
Orius 250 EW	0.5			•			
	1.0	•	•	•	•		
Pictor Active	0.6-1.0	•			•		
	0.5+0.5	•			•		
Plexeo 90	0.5			•	•		
	0.7	•			•		
Propulse	0.8-1.0	•	•		•		
Prosaro	1.0	•	•	•	•	•	
Riza 200 EC	1.25	•	•	•	•		

Riza 250 EW	1.0	•		•	•	•	
Syrius	0.5			•			
	1.0	•	•	•	•		
Tilmor	0.8-1.2			•			
	0.8-1.0				•	•	
	1.0	•	•	•			
Toprex 375 SC	0.3			•	•	•	
	0.5			•	•	•	
Torero	1.0	•			•		
Turret 90	0.5			•	•		
	0.7	•			•		
Vredmix	0.75	•					
Zakeo Xtra	1.0	•			•		

VASARAS RAPSIS

Augu aizsardzības līdzeklis	Deva l, kg/ha	Kaitīgais organisms					
		Baltā puve <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Pelēkā puve <i>Botrytis cinerea</i>	Krustiežu sausā puve <i>Phoma lingam</i>	Krustiežu sauskumainība <i>Alternaria brassicae</i>	Krustiežu gaišplankumainība <i>Pyrenopeziza brassicae</i>	Neīstā milttrasa <i>Peronospora brassicae</i>
Amistar 250 SC	0.8-1.0	•			•		
Amistar Gold	0.75	•					
Ampera	1.0	•					
Artina EC	0.5				•		
	0.7	•			•		
Attila 250 SC	0.5-0.75			•	•		•
	0.75	•	•		•		
Azaka	1.0	•			•		
Cantus	0.5	•			•		
Cantus Gold	0.4-0.5	•			•		
Efilor	1.0			•			
	0.7-1.0	•			•		
Folicur	1.0	•	•	•	•	•	
Juventus 90	0.5				•		
	0.7	•			•		
Mirador 250 SC	0.8-1.0	•			•		
Mirador Forte	2.0	•	•		•		
Mirador Xtra	1.0	•			•		
Mystic	1.0	•		•	•		
Mystic 250 EW	1.0	•			•		
Orius 250 EW	1.0	•	•	•	•		
Pictor Active	0.6-1.0	•			•		
	0.5+0.5	•			•		
Plexeo 90	0.5				•		
	0.7	•			•		
Propulse	0.8-1.0	•	•		•		
Prosaro	1.0	•	•	•	•	•	
Riza 200 EC	1.25		•	•	•		
Riza 250 EW	1.0	•		•	•	•	
Syrius	1.0	•	•	•	•		
Tilmor	0.8-1.0				•	•	
	1.0	•	•	•			
Torero	1.0	•			•		
Turret 90	0.5				•		
	0.7	•			•		
Vredmix	0.75	•					
Zakeo Xtra	1.0	•			•		

APSTRĀDĀJAMO KULTŪRAUGU UN CITU OBJEKTU RĀDĪTĀJS

SATURS

Augļu koki	338
Ogulāji	339
Dārzeni, garšaugi	340
Cukurbietes, lopbarības bietes	347
Lopbarības kāposti	347
Graudaugi ar/bez pasēju	347
Rapsis, ripsis	358
Pākšaugi	360
Kartupeļi	361
Lini	362

Kukurūza	362
Saulespuķes	362
Krāšņumaugi, dekoratīvie augi	362
Zālāji, ilggadīgās stiebrzāles un tauriņzieži	364
Zāliens	365
Kokaudzētavas, stādaudzētavas, jaunaudzēs ...	365
Meži	366
Noliktavas	367
Dažādi	367
Fumigācija	368

Kultūra	Augu aizsardzības līdzeklis	Liet. kat.	Lpp.
1	2	3	4

AUGĻU KOKI			
Augļu dārzi	Emin dārzam Taifun B	H	249
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Ouragan System 4	H	233
	Roundup Ultra	H	244
	Taifun B	H	249
Augļu koki	Wöbra	R	292
Aprikozes	Envidor	I/A	262
	Serenade Aso	F	299
Abeles	Agil 100 EC	H	182
	Avtar 75 NT	F	100
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Baythroid	I	257
	Bulldock 025 EC	I	257
	Candit	F	88
	Chorus 50 WG	F	92
	Champion 50 WG	F	91
	Clinic Up	H	187
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delan Pro	F	40
	Difcor 250 EC	F	98
	Difenzone	F	100
	Dithane NT	F	100
	Effector	F	103
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Envidor	I/A	262
	Fastac 50	I	264
	Fibro	I/A	266
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gallup Super 360	H	187
	Glyphomax 480	H	214
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264

Kultūra	Augu aizsardzības līdzeklis	Liet. kat.	Lpp.
1	2	3	4

	Kyleo	H	219
	Landmaster 360 TF	H	187
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Manfil 75 WG	F	126
	Manfil 80 WP	F	127
	Mavita 250 EC	F	165
	Meridian	Lim	287
	Merpan 80 WG	F	130
	Monosate G	H	187
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Nemasys	Dz	315
	Nemasys C	Dz	316
	Rosate 360 TF	H	187
	Regalis Plus	AR	57
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Scab 80 WG	F	165
	Score 250 EC	F	165, 167
	Syllit 544 SC	F	141
	Teppeki	I	281
	Topas 100 EC	F	176
	Trihogramma	Dz	322
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Zetrola	H	182
Bumbieres	Agil 100 EC	H	182
	Avtar 75 NT	F	100
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Candit	F	88
	Chorus 50 WG	F	92
	Champion 50 WG	F	91
	Clinic Up	H	187

1	2	3	4
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delan Pro	F	40
	Difcor 250 EC	F	98
	Dithane NT	F	100
	Effector	F	103
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Envidor	I/A	262
	Fastac 50	I	264
	Fibro	I/A	266
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gallup Super 360	H	187
	Glyphomax 480	H	214
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kyleo	H	219
	Landmaster 360 TF	H	187
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Mavita 250 EC	F	165
	Meridian	Lim	287
	Merpan 80 WG	F	130
	Monosate G	H	187
	Nemasys	Dz	315
	Nemasys C	Dz	316
	Regalis Plus	AR	316
	Rosate 360 TF	H	187
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Scab 80 WG	F	165
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Syllit 544 SC	F	172
	Teppeki	I	281
	Topas 100 EC	F	176
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Zetrola	H	182
Ķirši	Avtar 75 NT	F	100
	Chorus 50 WG	F	92
	Champion 50 WG	F	91
	Dithane NT	F	100
	Effector	F	103
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Envidor	I/A	262
	Fastac 50	I	264
	Fibro	I/A	266
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Glyphomax 480	H	214
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kyleo	H	219
	Mavita 250 EC	F	165
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	249
	Roundup PowerMax	H	240
	Roundup Ultra	H	244
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Syllit 544 SC	F	172
	Teppeki	I	281
	Topas 100 EC	F	176
Melnais plūškoks	Trico	R	292
Persiki	Envidor	I/A	262
	Serenade Aso	F	299

1	2	3	4
Plūmes	Avtar 75 NT	F	100
	Chorus 50 WG	F	92
	Champion 50 WG	F	91
	Dithane NT	F	100
	Effector	F	103
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Envidor	I/A	262
	Fastac 50	I	264
	Fibro	I/A	266
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Glyphomax 480	H	214
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kyleo	H	219
	Mavita 250 EC	F	165
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Teppeki	I	281
Smiltserkšķi	Fusilade Forte 150 EC	H	211
OGULĀJI			
Avenes	Agil 100 EC	H	182
	Aliette	F	74
	CBS sistēma	Dz	307
	Champion 50 WG	F	91
	Decis Forte	I	259
	Effector	F	103
	Envidor	I/A	262
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Kestac 50	I	264
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Meridian	Lim	287
	Prestop	F	296
	Proteus OD	I	278
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
	Trianum-P	F	303
	Zetrola	H	182
Dzērvenes	Candit	F	88
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Prestop	F	296
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
Ērkšķogas	Agil 100 EC	H	182
	Avtar 75 NT	F	100
	Candit	F	88
	Champion 50 WG	F	91
	Dithane NT	F	100
	Effector	F	103
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Meridian	Lim	287
	Serenade Aso	F	299
	Topas 100 EC	F	176
	Zetrola	H	182
Jāņogas	Agil 100 EC	H	182
	Avtar 75 NT	F	100
	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Champion 50 WG	F	91
	Dithane NT	F	100
	Effector	F	103
	Envidor	I/A	262
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Kestac 50	I	264
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Meridian	Lim	287
	Serenade Aso	F	299
	Topas 100 EC	F	176
	Zetrola	H	182
Kazenes	CBS sistēma	Dz	307
	Champion 50 WG	F	91
	Envidor	I/A	262
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Meridian	Lim	287
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
	Trianum-P	F	303
Krūmcidonijas	Envidor	I/A	262
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
Krūmmellenes	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307
	Champion 50 WG	F	91
	Envidor	I/A	262
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Prestop	F	296
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Trianum-P	F	303
Ogulāji	Gusto	Lim	283, 284
	Larvanem	Dz	313
	Nemasys	Dz	315
	Trianum-P	F	303
Upenes	Agil 100 EC	H	182
	Avtar 75 NT	F	100
	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307
	Champion 50 WG	F	91
	Dithane NT	F	100
	Effector	F	103
	Envidor	I/A	262
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Meridian	Lim	287
	Serenade Aso	F	299
	Topas 100 EC	F	176
	Zetrola	H	182
Vinogas	Avtar 75 NT	F	100
	Champion 50 WG	F	91
	Dithane NT	F	100
	Manfil 75 WG	F	126
	Manfil 80 WP	F	127
	Serenade Aso	F	299
	Topas 100 EC	F	176
	Trico	R	292

1	2	3	4
Vīnogulāji (neražojoši)	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
Zemenes	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	305
	Agil 100 EC	H	182
	Betanal	H	192
	Biscaya OD	I	256
	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307
	Centurion Plus	H	197
	Cliophar 600 SL	H	199
	Envidor	I/A	262
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gusto	Lim	283, 284
	Kestac 50	I	264
	Larvanem	Dz	313
	Lontrel 72 SG	H	224
	Nemasys H	Dz	317
	Nemasys L	Dz	317
	Proteus OD	I	278
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
	Zetrola	H	182
Zemenes segtās platībās	ABS sistēma	Dz	305
	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	305
	Afidius sistēma	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306
	Aliette	F	74
	Ambliseijus sistēma	Dz	306
	Biscaya OD	I	256
	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307
	Cidely Top	F	93
	Enkarsijas sistēma	Dz	309
	Entonem	Dz	310
	Envidor	I/A	262
	Eretmiks sistēma	Dz	310
	Eretmocerus sistēma	Dz	310
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311
	Gusto	Lim	283, 284
	Larvanem	Dz	313
	Limonikus sistēma	Dz	313
	Montdorensis sistēma	Dz	315
	Orius sistēma	Dz	318
	Prestop	F	296
	Prolectus	F	150
	Proteus OD	I	278
	Serenade Aso	F	299
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Svirski sistēma	Dz	320
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
	Trianum-P	F	303
	Vertimec 018 EC	I/A	282
Zemenes stādu audzēšanai mātesaugu laukos	Aliette	F	74
DĀRZEŅI, GARŠAUGI			
Arbūzi	Amistar 250 SC	F	76
	Ironmax Pro	Lim	285

1	2	3	4
	Mirador 250 SC	F	76
	Serenade Aso	F	299
	Topas 100 EC	F	176
Baklažāni atklātā laukā	Gusto	Lim	283, 284
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
Baklažāni segtās platībās	CBS sistēma	Dz	307
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Gusto	Lim	283, 284
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Prolectus	F	150
	Serenade Aso	F	299
	Sferoforia sistēma	Dz	318
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Swirskii-Mite LD	Dz	321
	Switch 62.5 WG	F	171
Batātes	Serenade Aso	F	299
Baziliks	Serenade Aso	F	299
Bietes, galda	Agil 100 EC	H	182
	Amistar Gold	F	80
	Betanal	H	192
	Centurion Plus	H	197
	Cliophar 600 SL	H	199
	Difcor 250 EC	F	98
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Goltix 700 SC	H	216
	Ironmax Pro	Lim	285
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maredo 125 SC	F	128
	Mavita 250 EC	F	165
	Pantera 4 EC	H	233
	Proteus OD	I	278
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
	Vredmix	F	80
	Zetrola	H	182
Bietes, lapu (atklātā laukā)	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
Brokoļi	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Butisan 400	H	194
	Decis Mega	I	261
	Difcor 250 EC	F	98
	Dithane NT	F	100
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Evure	I	272
	Gusto	Lim	283, 284
	Infinito	F	115, 116
	Ironmax Pro	Lim	285
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Lentagran WP	H	221
	Mavrik	I	272, 273
	Mirador 250 SC	F	76
	Proteus OD	I	278
	Rapsan 400 SC	H	194
	Serenade Aso	F	299
	Zetrola	H	182
Burkāni	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76

1	2	3	4
	Attila 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Boxer 800 EC	H	192
	Centurion Plus	H	197
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Difcor 250 EC	F	98
	Dithane NT	F	100
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Fastac 50	I	264
	Fenix	H	203
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264
	Leopard	H	223
	Mavita 250 EC	F	165
	Mirador 250 SC	F	76
	Mistral 700 WG	H	228
	Nemasys	Dz	315
	Pantera 4 EC	H	233
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Stomp CS	H	248
	Switch 62.5 WG	F	171
	Zetrola	H	182
Cigoriņi (sakņu)	Difcor 250 EC	F	98
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Serenade Aso	F	299
Cukīni atklātā laukā	Cabrio Duo	F	87
	Ironmax Pro	Lim	285
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
Cukīni segtās platībās	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Cidely Top	F	93
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	157
	Mirador 250 SC	F	76
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Prolectus	F	150
	Revus 250 SC	F	156, 157
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
	Vertimec 018 EC	I/A	282
Dārzeni	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	305
	Larvanem	Dz	313
	Nemaslug	Dz	315
	Nemasys	Dz	315
	Nemasys C	Dz	316
	Nemasys No Ants	Dz	317
	Prestop	F	296
Dārzeni, augļu	Mycostop	F	294
	Triatum-P	F	303
Dārzeni, bumbulu	Triatum-P	F	303
Dārzeni, lapu	Mycostop	F	294
	Triatum-P	F	303
Dārzeni, segtās platībās	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	305
	Aphidend	Dz	306
	Ahipar	Dz	307
	Aphiscout	Dz	307
	Cryptobug	Dz	307

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Cryprobug-L	Dz	308
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Enermix	Dz	308
	En-strip	Dz	309
	Entomite-M	Dz	309
	Entonem	Dz	310
	Ercal	Dz	310
	Ervipar	Dz	311
	Hipoaspis sistēma	Dz	312
	Limonikus sistēma	Dz	313
	Macro-Mite	Dz	313
	Miglyphus	Dz	314
	Mirical	Dz	314
	Montdorensis sistēma	Dz	315
	Sferoforia sistēma	Dz	318
	Spical	Dz	318
	Spical Plus	Dz	319
	Spidex	Dz	319
	Spidend	Dz	319
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Swirskii-Mite	Dz	320
	Swirskii-Mite Plus	Dz	321
	Thripex (Thripex-plus)	Dz	321
	Thripor-L	Dz	322
Dārzeni, sakņu	Fastac 50	I	264
	Kestac 50	I	264
	Mycostop	F	294
	Trianum-P	F	303
Dārzeni, stublāju	Trianum-P	F	303
Dilles	Fenix	H	203
	Serenade Aso	F	299
Dilles sēklai	Fastac 50	I	264
	Kestac 50	I	264
Endīvijās	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
Fenhelis (segtās platībās)	Serenade Aso	F	299
Garšaugi	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	305
	Aphiscout	Dz	307
	Entonem	Dz	310
	Larvanem	Dz	313
	Limonikus sistēma	Dz	313
	Montdorensis sistēma	Dz	315
	Mycostop	F	294
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Nemasys	Dz	315
	Nemasys No Ants	Dz	317
	Pangodiņš	Dz	318
	Prestop	F	296
	Serenade Aso	F	299
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Trianum-P	F	303
Gurķi atklātā laukā	Aliette	F	74
	Cabrio Duo	F	87
	CBS sistēma	Dz	307
	Fastac 50	I	264
	Infinito	F	115, 116
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Kestac 50	I	264
	Mycostop	F	294
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Prestop	F	296
	Previcur Energy	F	146
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176

1	2	3	4
Gurķi segtās platībās	ABS sistēma	Dz	305
	Afidiuss sistēma	Dz	305
	Afidiuss	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306
	Aliette	F	74
	Ambliseijus sistēma	Dz	306
	Ambliseiuss	Dz	306
	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	CBS sistēma	Dz	307
	Cidely Top	F	93
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Decis Forte	I	259
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	157
	Enkarsija	Dz	309
	Enkarsijas sistēma	Dz	309
	Envidor	I/A	262
	Eretmiks sistēma	Dz	310
	Eretmoceruss sistēma	Dz	310
	Fastac 50	I	264
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311
	Fitosējuluss	Dz	312
	Infinito	F	115, 116
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Kestac 50	I	264
	Mirador 250 SC	F	76
	Mycostop	F	294
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Orius sistēma	Dz	318
	Pangodiņš	Dz	318
	Prestop	F	296
	Previcur Energy	F	146
	Prolectus	F	150
	Revus 250 SC	F	156, 157
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	160
	Serenade Aso	F	299
	Sferoforia sistēma	Dz	318
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Svirski sistēma	Dz	320
	Swirskii-Mite LD	Dz	321
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
	Vertimec 018 EC	I/A	282
Gurķu mētra	Serenade Aso	F	299
Kabači	Amistar 250 SC	F	76
	Cabrio Duo	F	87
	Ironmax Pro	Lim	285
	Switch 62.5 WG	F	171
Kabači atklātā laukā	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Serenade Aso	F	299
Kabači segtās platībās	Attila 250 SC	F	76
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	157
	Mirador 250 SC	F	76
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Prolectus	F	150
	Revus 250 SC	F	156, 157
	Serenade Aso	F	299
	Sferoforia sistēma	Dz	318
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Switch 62.5 WG	F	171
Kanavālijas	Prosaro	F	154
	Signum	F	167

1	2	3	4
Kāļi	Amistar 250 SC	F	76
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Difcor 250 EC	F	98
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gallup Super 360	H	187
	Ironmax Pro	Lim	285
	Landmaster 360 TF	H	187
	Mirador 250 SC	F	76
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
Kāposti	Agil 100 EC	H	182
	Baythroid	I	257
	Bulldock 025 EC	I	257
	Fastac 50	I	264
	Kestac 50	I	264
	Mycostop	F	294
	Nemasys	Dz	315
	Trianum-P	F	303
	Trihogramma	Dz	322
Kāposti, Briseles	Butisan 400	H	194
	Centurion Plus	H	197
	Decis Forte	I	259
	Difcor 250 EC	F	98
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Evure	I	272
	Focus Ultra	H	205
	Gusto	Lim	283, 240
	Infinito	F	115, 116
	Ironmax Pro	Lim	285
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Lentagran WP	H	221
	Mavrik	I	272, 273
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Proteus OD	I	278
	Rapsan 400 SC	H	194
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Teppeki	I	281
	Trianum-P	F	303
Kāposti, galviņu	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Butisan 400	H	194
	Centurion Plus	H	197
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Cliophar 600 SL	H	199
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delmetros 100 SC	I	262
	Difcor 250 EC	F	98
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Focus Ultra	H	205
	Evure	I	272
	Gusto	Lim	283, 284
	Infinito	F	115, 116
	Ironmax Pro	Lim	285
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Lentagran WP	H	221
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Mavrik	I	272, 273

1	2	3	4
	Mirador 250 SC	F	76
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Previcur Energy	F	146
	Proteus OD	I	278
	Rapsan 400 SC	H	194
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Syper	I	258
	Teppeki	I	281
	Trianum-P	F	303
	Wizard 500 EC	I	258
	Zetrola	H	182
Kāposti, Ķīnas	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Butisan 400	H	194
	Focus Ultra	H	205
	Mirador 250 SC	F	76
	Previcur Energy	F	146
	Rapsan 400 SC	H	194
	Serenade Aso	F	299
	Trianum-P	F	303
Kāposti, lapu	Focus Ultra	H	205
	Lentagran WP	H	221
	Trianum-P	F	303
Kāposti, Pekinas	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Butisan 400	H	194
	Mirador 250 SC	F	76
	Previcur Energy	F	146
	Rapsan 400 SC	H	194
	Trianum-P	F	303
Kāposti, savoļas	Centurion Plus	H	197
	Cliophar 600 SL	H	199
	Focus Ultra	H	205
	Lentagran WP	H	221
	Lontrel 600 SL	H	223
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Trianum-P	F	303
Krustziežu dzimtas dārzeņi	Baythroid	I	257
	Bulldock 025 EC	I	257
	Prestop	F	296
	Trihogramma	Dz	322
Kukurūza, saldā	Ironmax Pro	Lim	285
	Lentagran WP	H	221
Ķīmenes	Agil 100 EC	H	182
	Boxer 800 EC	H	192
	Fastac 50	I	264
	Fenix	H	203
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Kestac 50	I	264
	Serenade Aso	F	299
	Zetrola	H	182
Ķiploki	Acrobat Plus	F	71
	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Boxer 800 EC	H	192
	Cabrio Duo	F	87
	Centurion Plus	H	197
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Dithane NT	F	100
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Fastac 50	I	264
	Fenix	H	203
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Lentagran WP	H	221
	Mavita 250 EC	F	165
	Mirador 250 SC	F	76
	Prestop	F	296
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Stomp CS	H	248
	Switch 62.5 WG	F	171
	Syper	I	258
	Wizard 500 EC	I	258
	Zetrola	H	182
Ķirbjaugi	Prestop	F	296
Ķirbji	Amistar 250 SC	F	76
	Ironmax Pro	Lim	285
	Mirador 250 SC	F	76
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
Ķirbji atklātā laukā	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Serenade Aso	F	299
Ķirbji segtās platībās	Emin dārzam Revus 250 SC	F	157
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Revus 250 SC	F	156, 157
Kolrābji	Lentagran WP	H	221
	Serenade Aso	F	299
Koriandrs	Serenade Aso	F	299
Kressalāti	Serenade Aso	F	299
Majorāns	Serenade Aso	F	299
Mangolds	Difcor 250 EC	F	98
Mārrutki	Decis Forte	I	259
	Difcor 250 EC	F	98
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
Melnasakne	Switch 62.5 WG	F	171
Melones	Amistar 250 SC	F	76
	Ironmax Pro	Lim	285
	Mirador 250 SC	F	76
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
Paprika segtās platībās	ABS sistēma	Dz	305
	Afidius sistēma	Dz	305
	Afidiuss	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306
	Ambliseijus sistēma	Dz	306
	Ambliseiuss	Dz	306
	Amistar 250 SC	F	76
	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307
	Cidely Top	F	93
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Decis Forte	I	259
	Diglifus sistēma	Dz	308
	Enkarsijas sistēma	Dz	309
	Envidor	I/A	262
	Eretmiks sistēma	Dz	310
	Eretmocerus sistēma	Dz	310
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Mirador 250 SC	F	324
	Mycostop	F	294
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Orius sistēma	Dz	318

1	2	3	4
	Pangodiņš	Dz	318
	Prestop	F	296
	Previcur Energy	F	146
	Prolectus	F	150
	Serenade Aso	F	299
	Sferoforia sistēma	Dz	318
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Svirski sistēma	Dz	320
	Swirskii-Mite LD	Dz	321
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
	Vertimec 018 EC	I/A	282
Pastinaki	Amistar 250 SC	F	76
	Decis Forte	I	259
	Difcor 250 EC	F	98
	Fenix	H	203
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Mirador 250 SC	F	76
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
Patisoni	Cabrio Duo	F	87
Patisoni segtās platībās	Emin dārzam Revus 250 SC	F	157
	Revus 250 SC	F	156, 157
Pētersīļi	Afidiuss	Dz	305
	Fastac 50	I	264
	Kestac 50	I	264
Pētersīļi, lapu	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Serenade Aso	F	299
Pētersīļi, sakņu	Amistar 250 SC	F	76
	Difcor 250 EC	F	98
	Fenix	H	203
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Mirador 250 SC	F	76
	Serenade Aso	F	299
	Stomp CS	H	248
	Switch 62.5 WG	F	171
Pipargurķīši	Serenade Aso	F	299
Piparmētra	Serenade Aso	F	299
Portulaki (atklātā laukā)	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
Pupas, sviesta	Prosaro	F	154
	Signum	F	167
Pupiņas	Basagran 480	H	190
	Ironmax Pro	Lim	285
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
Pupu mētra	Serenade Aso	F	299
Puravi	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Clinic Up	H	187
	Decis Forte	I	259
	Difcor 250 EC	F	98
	Dithane NT	F	100
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Gallup Super 360	H	187
	Infinito	F	115, 116
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264
	Landmaster 360 TF	H	187
	Lentagran WP	H	221

1	2	3	4
	Mirador 250 SC	F	324
	Monosate G	H	187
	Mycostop	F	294
	Rosate 360 TF	H	187
	Serenade Aso	F	299
	Syper	I	258
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Wizard 500 EC	I	258
Raudene	Serenade Aso	F	299
Rāceņi	Amistar 250 SC	F	76
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Decis Forte	I	259
	Difcor 250 EC	F	98
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gallup Super 360	H	187
	Ironmax Pro	Lim	285
	Landmaster 360 TF	H	187
	Mirador 250 SC	F	76
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Serenade Aso	F	299
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
Redisi atklātā laukā	Ironmax Pro	Lim	285
	Serenade Aso	F	299
Redisi segtās platībās	Previcur Energy	F	146
	Serenade Aso	F	299
Rozmarīns	Serenade Aso	F	299
Rukola	Serenade Aso	F	299
Rutki	Fusilade Forte 150 EC	H	211
Rutki (eļļas)	Pictor Active	F	145
Rutki (melnie)	Difcor 250 EC	F	98
Sakņu dārzs pēc ražas novākšanas	Roundup 60	H	238
	Roundup B	H	238
	Roundup G	H	241
Salāti	Afidiuss sistēma	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306
	Amistar 250 SC	F	76
	Cabrio Duo	F	87
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Meridian	Lim	287
	Mycostop	F	294
	Previcur Energy	F	146
	Revus 250 SC	F	156, 157
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
	Trianum-P	F	303
	Vertimec 018 EC	I/A	282
Salāti atklātā laukā	Aliette	F	74
	Decis Forte	I	259
	Ironmax Pro	Lim	285
	Mirador 250 SC	F	324
Salāti segtās platībās	Afidiuss	Dz	305
	Amistar 250 SC	F	76
	Ironmax Pro	Lim	285
	Mirador 250 SC	F	324
	Pangodiņš	Dz	318
	Revus 250 SC	F	156, 157

1	2	3	4
	Serenade Aso	F	299
	Svirski sistēma	Dz	320
	Trianum-P	F	303
Salātu dēsti (izstādīšanai atklātā laukā)	Aliette	F	74
Selerijas	Afidiuss	Dz	305
Selerijas, kātu	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Boxer 800 EC	H	192
	Difcor 250 EC	F	98
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Ironmax Pro	Lim	285
	Mirador 250 SC	F	76
	Serenade Aso	F	299
Selerijas, lapu	Focus Ultra	H	205
	Ironmax Pro	Lim	285
	Serenade Aso	F	299
Selerijas, sakņu	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Boxer 800 EC	H	
	Difcor 250 EC	F	98
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Ironmax Pro	Lim	285
	Mavita 250 EC	F	165
	Mirador 250 SC	F	76
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
Sinepes	Agil 100 EC	H	182
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Butisan 400	H	194
	Clinic Up	H	187
	Decis Forte	I	259
	Gallup Super 360	H	187
	Ironmax Pro	Lim	285
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Pictor Active	F	145
	Rapsan 400 SC	H	194
	Rosate 360 TF	H	187
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Zetrola	H	182
Sīpoli	Acrobat Plus	F	71
	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Boxer 800 EC	H	192
	Cabrio Duo	F	87
	Centurion Plus	H	197
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Clinic Up	H	187
	Dithane NT	F	100
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Fastac 50	I	264
	Fenix	H	203
	Focus Ultra	H	205

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gallup Super 360	H	187
	Gusto	Lim	283, 284
	Infinito	F	115, 116
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264
	Landmaster 360 TF	H	187
	Lentagran WP	H	221
	Mavita 250 EC	F	165
	Mirador 250 SC	F	76
	Monosate G	H	187
	Mycostop	F	294
	Nemasys	Dz	315
	Prestop	F	296
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	160
	Rosate 360 TF	H	187
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Stomp CS	H	248
	Switch 62.5 WG	F	171
	Syper	I	258
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Wizard 500 EC	I	258
	Zetrola	H	182
Sipoli (lokiem)	Decis Forte	I	259
	Serenade Aso	F	299
Sipoli, vasaras	Ironmax Pro	Lim	285
Sipoli, vasaras (lokiem)	Lentagran WP	H	221
Skābenes (atklātā laukā)	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
Spargēļi	Difcor 250 EC	F	98
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Lentagran WP	H	221
	Serenade Aso	F	299
Spināti (atklātā laukā)	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Serenade Aso	F	299
Spināti (segtās platībās)	Serenade Aso	F	299
Šalotes	Cabrio Duo	F	87
	Centurion Plus	H	197
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gusto	Lim	283, 284
	Lentagran WP	H	221
	Mavita 250 EC	F	165
	Score 250 EC	F	165, 167
	Serenade Aso	F	299
	Switch 62.5 WG	F	171
Timiāns	Serenade Aso	F	299
Tomāti atklātā laukā	CBS sistēma	Dz	307
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	157
	Fastac 50	I	264
	Gusto	Lim	283, 284
	Kestac 50	I	264
	Manfil 75 WG	F	126
	Manfil 80 WP	F	127
	Mycostop	F	294
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Revus 250 SC	F	156, 157
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	160
Tomāti segtās platībās	Afidius sistēma	Dz	305
	Afidius	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306

1	2	3	4
	Ambliseiuss	Dz	306
	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Candit	F	88
	Cidely Top	F	93
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Decis Forte	I	259
	Diglifus sistēma	Dz	308
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	157
	Enkarsija	Dz	309
	Enkarsijas sistēma	Dz	309
	Envidor	I/A	262
	Eretmiks sistēma	Dz	310
	Eretmoceruss sistēma	Dz	310
	Fastac 50	I	264
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311
	Fitoseiulus T-sistēma	Dz	312
	Fitosējuluss	Dz	312
	Gusto	Lim	283, 284
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Kestac 50	I	264
	Makrolofuss sistēma (Makrolofuss-N sistēma)	Dz	314
	Mirador 250 SC	F	76
	Mycostop	F	294
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Pangodiņš	Dz	318
	PMV-01	V	295
	Prestop	F	296
	Previcur Energy	F	146
	Prolectus	F	150
	Revus 250 SC	F	156, 157
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	160
	Serenade Aso	F	299
	Sferoforia sistēma	Dz	318
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
	Vertimec 018 EC	I/A	282
Turnepši	Focus Ultra	H	205
Ziedkāposti	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Baythroid	I	257
	Bulldock 025 EC	I	257
	Butisan 400	H	194
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Difcor 250 EC	F	98
	Dithane NT	F	100
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Evure	I	272
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Gusto	Lim	283, 284
	Infinito	F	115, 116
	Ironmax Pro	Lim	285
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Lentagran WP	H	221
	Mavrik	I	272, 273
	Mirador 250 SC	F	76
	Previcur Energy	F	146
	Proteus OD	I	278
	Rapsan 400 SC	H	194
	Serenade Aso	F	299

1	2	3	4
	Syper	I	258
	Wizard 500 EC	I	258
CUKURBIETES, LOPBARĪBAS BIETES			
Bietes, lopbarības	Agil 100 EC	H	182
	Amistar Gold	F	80
	Betanal	H	192
	Centurion Plus	H	197
	Cliophar 600 SL	H	199
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Goltix 700 SC	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264
	Leopard	H	223
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Pantera 4 EC	H	233
	Proteus OD	I	278
	RUBRIC	F	164
	Targa Super	H	250
	Vredmix	F	80
	Zetrola	H	182
Cukurbietes	Agil 100 EC	H	182
	Amistar Gold	F	80
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Baythroid	I	257
	Betanal	H	192
	Bulldock 025 EC	I	257
	Centurion Plus	H	197
	Clinic Up	H	187
	Cliophar 600 SL	H	199
	Decis Forte	I	259
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Fury 100 EW	I	267
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gallup Super 360	H	187
	Goltix 700 SC	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Ironmax Pro	Lim	285
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Landmaster 360 TF	H	187
	Leopard	H	223
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maredo 125 SC	F	128
	Monosate G	H	187
	Pantera 4 EC	H	233
	Proteus OD	I	278
	Rosate 360 TF	H	187
	RUBRIC	F	164
	Satel 100 EW	I	267
	Targa Super	H	250
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Vredmix	F	80
	Zetrola	H	182
LOPBARĪBAS KĀPOSTI			
Kāposti, lopbarības	Agil 100 EC	H	182
	Bulldock 025 EC	I	257
	Butisan 400	H	194
	Lentagran WP	H	221
	Rapsan 400 SC	H	194

1	2	3	4
GRAUDAUGI AR/BEZ PASEJU			
Auzas	2.4-D Nufarm	H	181
	Accurate 200 WG	H	181
	Adexar XE	F	71
	Ampera	F	81
	Ariane S	H	184
	Arrat	H	185
	Arrva	H	218
	Artina EC	F	51, 120
	Ascra Xpro	F	82
	Banvel 4S	H	186
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Bariton Super	K	61
	Baythroid	I	257
	Bell	F	84
	Bell Super	F	86
	Bertego	AR	54
	Biathlon 4D	H	192
	Bulldock 025 EC	I	257
	Calibre 50 SX	H	196
	CCC	AR	49
	CDQ SX	H	196
	Celest Trio 060 FS	K	62
	Cerix	F	90
	Chwastox 750 SL	H	198
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Cleave	H	199
	Clinic Up	H	187
	Cliophar 600 SL	H	199
	Comet Pro	F	94
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Cycocel 750	AR	50
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delaro	F	96
	DMA 600	H	201
	Duett Ultra	F	102
	Elegant 2FD	H	202
	Epox Top	F	109
	Estets 600 e.k.	I	203
	Evure	I	272
	Fastac 50	I	264
	Fleksiti s.k.	F	111
	Flurostar 180	H	205
	Fury 100 EW	I	267
	Gallup Super 360	H	187
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Globaztar 250 SC	F	113
	Glyphomax 480	H	214
	Granprotec	I	267
	Granstar Premia 50 SX	H	216
	Grodyl	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Imtrex XE	F	114
	Ironmax Pro	Lim	285
	Juventus 90	F	51, 120
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kinto	K	63
	Kinvara	H	218
	Lancelot	H	220
	Landmaster 360 TF	H	187
	Legacy 500 SC	H	221
	Librax	F	124
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maracas	F	127
	Maredo 125 SC	F	128
	Maxim Extra 050 FS	K	64
	Maxim Star 025 FS	K	65
	Mavrik	I	272, 273
	MCPA 750	H	225
	MCPA Classic 750 SL	H	198
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Medax Top	AR	53
	Meridian	Lim	287
	Mezzo WG	H	227
	Mirador Forte	F	131
	Mirage	F	133
	Mixin	H	199
	Moddus 250 EC	AR	54
	Moddus Start	AR	54
	Mollo	H	245
	Monosate G	H	187
	Moxa	AR	55
	Mustangs s.e.	H	229
	Mustangs Forte s.e.	H	229
	Mystic 250 EW	F	56, 136
	Nuance 75 WG	H	230
	Opera N	F	138
	Opus EC	F	140
	Opus	F	139
	Orius 250 EW	F	141
	Ouragan System 4	H	233
	Plexeo 90	F	51, 120
	Priaxor	F	149
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Profi MCPA 750 SL	H	198
	Property 180 SC	F	152
	Prosaro	F	154
	Proteus OD	I	278
	Quelex	H	237
	Redigo Pro	K	66
	Regucil	AR	54
	Revystar XL	F	158
	Revytrex	F	159
	Riza 250 EW	F	162
	Rosate 360 TF	H	187
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	RUBRIC	F	164
	Saracen	H	245
	Satel 100 EW	I	267
	Seedron	F	67
	Siltra Xpro	F	169
	Spitfire 333 HL	H	246
	Stabilāns 750 š.k.	AR	49
	Starane 333 HL	H	246
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Syper	I	258
	Syrius	F	141
	Taifun B	H	249
	Tango Flex	F	173
	TBM 75 WG	H	251
	Tempo	AR	54
	Teppeki	I	281
	Tomahawk 200 EC	H	252
	Tooler	H	253

1	2	3	4
	Trimmer 50 SG	H	216
	Trimmer 500 WG	H	253
	Tripali	H	254
	Turret 90	F	51, 120
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Vibrance Pro	K	68
	Vibrance Star	K	69
	Vibrance Trio	K	70
	Viverda	F	179
	Wizard 500 EC	I	258
Auzas ar āboliņa pasēju	MCPA 750	H	225
Auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airesnes pasēju	Trimmer 50 SG	H	216
Auzas ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	184
	Biathlon 4D	H	192
	Duplozāns Super š.k.	H	202
	Lontrel 72 SG	H	224
	Primus	H	234
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Tomahawk 200 EC	H	252
Kvieši	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Gallup Super 360	H	187
	Ironmax Pro	Lim	285
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Vagta	H	187
	Varvar	H	187
Kvieši, cietie	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Decis Forte	I	259
	Gallup Super 360	H	187
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
Kvieši, speltas	Curbatur	F	151
	Diflanil 500 SC	H	201
	Input Triple	F	118
	Proline	F	151
	Property 180 SC	F	152
	Vibrance Pro	K	68
	Vibrance Star	K	69
Kvieši, vasaras	2.4-D Nufarm	H	181
	Accurate 200 WG	H	181
	Adexar XE	F	71
	Amistar 250 SC	F	76
	Ampera	F	81
	Ariane S	H	184
	Arrat	H	185
	Arrva	H	218
	Artina EC	F	51, 120
	Ascra Xpro	F	82
	Attila 250 SC	F	76
	Attribut	H	185
	Avoxa	H	185

1	2	3	4
	Axial 50 EC	H	186
	Azaka	F	83
	Banvel 4S	H	186
	Bariton Super	K	61
	Baythroid	I	257
	Bell	F	84
	Bell Super	F	86
	Bertego	AR	54
	Biathlon 4D	H	192
	Broadway Star	H	194
	Bulldock 025 EC	I	257
	Calibre 50 SX	H	196
	Calma	AR	58
	CCC	AR	49
	CDQ SX	H	196
	Celest Trio 060 FS	K	62
	Cerix	F	90
	Cerone	AR	49
	Cezix	F	95
	Chambel 6 FS	K	62
	Chwastox 750 SL	H	198
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Cleave	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Comet Pro	F	94
	Comrade	F	94
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Curbatur	F	151
	Cycocel 750	AR	50
	DARCOS	F	95
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delaro	F	96
	Dicoherb Super 750 SL	H	201
	Difend	K	62
	DMA 600	H	201
	Dominic	F	174
	Duett Ultra	F	102
	Elatus Era	F	105
	Elatus Plus	F	106
	Elegant 2FD	H	202
	Epo Extra	F	108
	Epo Top	F	109
	Erasmus	F	95
	Ergon	H	202
	Estets 600 e.k.	H	203
	Evure	I	272
	Fastac 50	I	264
	Falcon Forte	F	110
	Fleksiti s.k.	F	111
	Flurostar 180	H	205
	Folicur	F	50, 111
	Foxtrot 69 EW	H	210
	Fury 100 EW	I	267
	Gemino	F	112
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Globaztar 250 SC	F	113
	Glyphomax 480	H	214
	Granstar Premia 50 SX	H	216
	Grodyl	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Herbos 110 EC	H	217
	Imtrex XE	F	114
	Input	F	117
	Input Triple	F	118
	Juventus 90	F	51, 120
	Kaiso 50 EG	I	268
	Kantik	F	122

1	2	3	4
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kinto	F	63
	Kinvara	H	218
	Lancelot	H	220
	Latitude XL	K	64
	Leander	F	123
	Legacy 500 SC	H	221
	Librax	F	124
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maracas	F	127
	Maredo 125 SC	F	128
	Mavrik	I	272, 273
	Maxim 025 FS	K	64
	Maxim Extra 050 FS	K	64
	Maxim Star 025 FS	K	65
	MCPA 750	H	225
	MCPA Classic 750 SL	H	198
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Medax Top	AR	53
	Meridian	Lim	287
	Mezzo WG	H	227
	Mirador 250 SC	F	76
	Mirador Forte	F	131
	Mirador Xtra	F	132
	Mirage	F	133
	Mixin	H	199
	Moddus 250 EC	AR	54
	Moddus Start	AR	54
	Mollo	H	245
	Monitor	H	229
	Moxa	AR	55
	Mustangs s.e.	H	229
	Mustangs Forte s.e.	H	229
	Mystic	F	135
	Mystic 250 EW	F	56, 136
	Nuance 75 WG	H	230
	Opera N	F	138
	Optika Trio š.k.	H	232
	Optimus	AR	58
	Opus EC	F	140
	Opus	F	139
	Orius 250 EW	F	141
	Osiris	F	143
	Osiris Star	F	143
	Ouragan System 4	H	233
	Pixxaro EC	H	234
	Plexeo 90	F	51, 120
	Prepper	K	65
	Priaxor	F	149
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Profi MCPA 750 SL	H	198
	Proline	F	151
	Property 180 SC	F	152
	Prosaro	F	154
	Proteus OD	I	278
	Puma Universal	H	236
	Quelex	H	237
	Rancona 15 ME	K	66
	Redigo Pro	K	66
	Regucil	AR	54
	Revystar XL	F	158
	Revytrex	F	159

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Riza 200 EC	F	160
	Riza 250 EW	F	162
	Rosate 360 TF	H	187
	Roundup Flick	H	240
	Roundup Flex	H	239
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	RUBRIC	F	164
	Saracen	H	245
	Saracen Delta	H	246
	Satel 100 EW	I	267
	Seedron	F	67
	Sekator OD	H	246
	Siltra Xpro	F	169
	Spitfire 333 HL	H	246
	Stabilāns 750 š.k.	AR	49
	Starane 333 HL	H	246
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Swing Gold	F	170
	Syper	I	258
	Syrius	F	141
	Taifun B	H	249
	Talius	F	173
	Tango Flex	F	173
	TBM 75 WG	H	251
	Tebuplius	F	174
	Tebusha 25 EW	F	174
	Tempo	AR	54
	Teppeki	I	281
	Tomahawk 200 EC	H	252
	Tombo WG	H	253
	Tooler	H	253
	Torero	F	83
	Trimaxx	AR	58
	Trimmer 50 SG	H	216
	Trimmer 500 WG	H	253
	Tripali	H	254
	Turret 90	F	51, 120
	Viverda	F	179
	Variano Xpro	F	178
	Vibrance Duo	K	68
	Vibrance Pro	K	68
	Vibrance Star	K	69
	Vibrance Trio	K	70
	Wizard 500 EC	I	258
	Zakeo Xtra	F	132
	Zoxy 250	F	83
	Zypar	H	255
Kvieši, vasaras ar aboliņa pasēju	MCPA 750	H	255
	Stomp CS	H	248
Kvieši, vasaras ar lucernas pasēju	Stomp CS	H	248
Kvieši, vasaras ar sarkanās auzenes vai ganību aīrenes pasēju	Trimmer 50 SG	H	216
Kvieši, vasaras ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	184
	Biathlon 4D	H	192
	Duplozāns Super š.k.	H	202
	Lontrel 72 SG	H	224
	Primus	H	234
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Tomahawk 200 EC	H	252

1	2	3	4
Kvieši, vasaras un zirņu mīstrs	Stomp CS	H	248
Kvieši, ziemas	2.4-D Nufarm	H	181
	Accurate 200 WG	H	181
	Adexar XE	F	71
	Afrodyta 250 SC	F	74
	Amistar 250 SC	F	76
	Ampera	F	81
	Ariane S	H	184
	Arrat	H	185
	Arrva	H	218
	Artina EC	F	51, 120
	Ascra Xpro	F	82
	Attila 250 SC	F	76
	Attribut	H	185
	Avoxa	H	185
	Avtar 75 NT	F	100
	Axial 50 EC	H	186
	Azaka	F	83
	Banvel 4S	H	186
	Bariton Super	K	61
	Baythroid	I	257
	Bell	F	84
	Bell Super	F	86
	Bertego	AR	54
	Biathlon 4D	H	192
	Bolid 250 SE	F	87
	Boxer 800 EC	H	192
	Broadway Star	H	194
	Bulldock 025 EC	I	257
	Calibre 50 SX	H	196
	Calma	AR	58
	CCC	AR	49
	CDQ SX	H	196
	Celest Trio 060 FS	K	62
	Cerix	F	90
	Cerone	AR	49
	Cezix	F	95
	Chambel 6 FS	K	62
	Chwastox 750 SL	H	198
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Cleave	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Comet Pro	F	94
	Comrade	F	94
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Curbatur	F	151
	Cycocel 750	AR	50
	DARCOS	F	95
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delaro	F	96
	Delmetros 100 SC	I	262
	Dicoherb Super 750 SL	H	201
	Difend	K	62
	Diflanil 500 SC	H	201
	DMA 600	H	201
	Dominic	F	174
	Duett Ultra	F	102
	Duplozāns Super š.k.	H	202
	Elatas Era	F	105
	Elatas Plus	F	106
	Elegant 2FD	H	202
	Epox Extra	F	108

1	2	3	4
	EpoX Top	F	109
	Erasmus	F	95
	Ergon	H	202
	Estets 600 e.k.	H	203
	Evure	I	272
	Falcon Forte	F	110
	Fastac 50	I	264
	Fleksiti s.k.	F	111
	Flight Forte	H	204
	Flurostar 180	H	205
	Folicur	F	50, 111
	Foxtrot 69 EW	H	210
	Frazer	H	217
	Fury 100 EW	I	267
	Galistop 200	H	217
	Gemino	F	112
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Globaztar 250 SC	F	113
	Glyphomax 480	H	214
	Granstar Premia 50 SX	H	216
	Grassrooter	AR	50
	Grodyl	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Herbos 110 EC	H	217
	Hurler	H	217
	Hussar Activ Plus OD	H	217
	Imtrex XE	F	114
	Input	F	117
	Input Triple	F	118
	Juventus 90	F	51, 120
	Kaiso 50 EG	I	268
	Kantik	F	122
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kinto	F	63
	Kinvara	H	218
	Komplet	H	219
	Lancelot	H	220
	Latitude XL	K	64
	Leander	F	123
	Legacy 500 SC	H	221
	Legacy Pro	H	221
	Librax	F	124
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maracas	F	127
	Maredo 125 SC	F	128
	Mateno Duo	H	225
	Mavrik	I	272, 273
	Maxim 025 FS	K	64
	Maxim Extra 050 FS	K	64
	Maxim Star 025 FS	K	65
	MCPA 750	H	225
	MCPA Classic 750 SL	H	198
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Medax Top	AR	53
	Meridian	Lim	287
	Mezzo WG	H	227
	Mirador 250 SC	F	76
	Mirador Forte	F	131
	Mirador Xtra	F	132
	Mirage	F	133
	Mixin	H	199
	Moddus 250 EC	AR	54
	Moddus Start	AR	54
	Mollo	H	245
	Monitor	H	229

1	2	3	4
	Moxa	AR	55
	Mustangs s.e.	H	229
	Mustangs Forte s.e.	H	229
	Mystic	F	135
	Mystic 250 EW	F	56, 136
	Nexa 500 EC	AR	56
	Next	AR	56
	Nuance 75 WG	H	230
	Opera N	F	138
	Opus EC	F	140
	Opus	F	139
	Optika Trio š.k.	H	232
	Optimus	AR	58
	Orius 250 EW	F	141
	Osiris	F	143
	Osiris Star	F	143
	Ouragan System 4	H	233
	Pico 750 WG	H	233
	Pixxaro EC	H	234
	Plexeo 90	F	51, 120
	Prepper	K	65
	Priaxor	F	149
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Profi MCPA 750 SL	H	198
	Proline	F	151
	Property 180 SC	F	152
	Prosaro	F	154
	Proteus OD	I	278
	Puma Universal	H	236
	Quelex	H	237
	Rancona 15 ME	K	66
	Regucil	AR	54
	Revystar XL	F	158
	Revytrex	F	159
	Riza 200 EC	F	160
	Riza 250 EW	F	162
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Roxy 800 EC	H	245
	RUBRIC	F	164
	Saracen	H	245
	Saracen Delta	H	246
	Satel 100 EW	I	267
	Seedron	F	67
	Sekator OD	F	246
	Siltra Xpro	F	169
	Spitfire 333 HL	H	246
	Stabilāns 750 š.k.	AR	49
	Starane 333 HL	H	246
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Swing Gold	F	170
	Syper	I	258
	Syrius	F	141
	Taifun B	H	249
	Talius	F	173
	Tango Flex	F	173
	TBM 75 WG	H	251
	Tebuplius	F	174
	Tebusha 25 EW	F	174
	Tempo	AR	54
	Teppeki	I	281
	Terpal	AR	57

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Tomahawk 200 EC	H	252
	Tombo WG	H	253
	Tooler	H	253
	Torero	F	83
	Trimaxx	AR	58
	Trimmer 50 SG	H	216
	Trimmer 500 WG	H	253
	Tripali	H	254
	Tristar 50 SG	H	254
	Turret 90	F	51, 120
	Viverda	F	179
	Variano Xpro	F	178
	Vibrance Duo	K	68
	Vibrance Pro	K	68
	Vibrance Star	K	69
	Vibrance Trio	K	70
	Wizard 500 EC	I	758
	Zakeo Xtra	F	132
	Zoxy 250	F	83
	Zypar	H	255
Kvieši, ziemas ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	184
	Lontrel 72 SG	H	224
	Primus	H	234
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Tomahawk 200 EC	H	252
Mieži	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	CCC	AR	49
	Clinic Up	H	187
	Gallup Super 360	H	187
	Granprotec	I	267
	Ironmax Pro	Lim	285
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Stabilāns 750 š.k.	AR	49
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
Mieži ar pļavas auzenes pasēju	2.4-D Nufarm	H	181
Mieži, vasaras	2.4-D Nufarm	H	181
	Accurate 200 WG	H	181
	Adexar XE	F	71
	Amistar 250 SC	F	76
	Ampera	F	81
	Ariane S	H	184
	Arrat	H	185
	Arrva	H	218
	Artina EC	F	51, 120
	Ascra Xpro	F	82
	Attila 250 SC	F	76
	Axial 50 EC	H	186
	Azaka	F	83
	Banvel 4S	H	186
	Bariton Super	K	61
	Baythroid	I	257
	Bell	F	84
	Bell Super	F	86
	Bertego	AR	54
	Biathlon 4D	H	192
	Bolid 250 SE	F	87
	Bulldock 025 EC	I	257
	Calibre 50 SX	H	196
	Calma	AR	58

1	2	3	4
	CDQ SX	H	196
	Celest Trio 060 FS	K	62
	Cerix	F	90
	Cerone	AR	49
	Cezix	F	95
	Chwastox 750 SL	H	198
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Cleave	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Comet Pro	F	94
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Curbatur	F	151
	Cycocel 750	AR	50
	DARCOS	F	95
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delaro	F	96
	Delmetros 100 SC	I	262
	Dicoherb Super 750 SL	H	201
	DMA 600	H	201
	Dominic	F	174
	Duett Ultra	F	102
	Elatus Era	F	105
	Elatus Plus	F	106
	Elegant 2FD	H	202
	Epo Extra	F	108
	Epo Top	F	109
	Erasmus	F	95
	Ergon	H	202
	Estets 600 e.k.	H	203
	Evure	I	272
	Falcon Forte	F	110
	Fastac 50	I	264
	Fleksiti s.k.	F	111
	Flurostar 180	H	205
	Folicur	F	50, 111
	Foxtrot 69 EW	H	210
	Fury 100 EW	I	267
	Gemino	F	112
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Globaztar 250 SC	F	113
	Glyphomax 480	H	214
	Granstar Premia 50 SX	H	216
	Grassrooter	AR	50
	Grodyl	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Herbos 110 EC	H	217
	Imtrex XE	F	114
	Input	F	117
	Input Triple	F	118
	Juventus 90	F	51, 120
	Kantik	F	122
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kinto	F	63
	Kinvara	H	218
	Lancelot	H	220
	Leander	F	123
	Legacy 500 SC	H	221
	Librax	F	124
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287

1	2	3	4
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maracas	F	127
	Maredo 125 SC	F	128
	Maxim 025 FS	K	64
	Maxim Extra 050 FS	K	64
	Maxim Star 025 FS	K	65
	Mavrik	I	272, 273
	MCPA 750	H	225
	MCPA Classic 750 SL	H	198
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Medax Top	AR	53
	Meridian	Lim	287
	Mezzo WG	H	227
	Mirador 250 SC	F	76
	Mirador Forte	F	131
	Mirador Xtra	F	132
	Mirage	F	133
	Mixin	H	199
	Moddus 250 EC	AR	54
	Moddus Start	AR	54
	Mollo	H	245
	Moxa	AR	55
	Mustangs s.e.	H	229
	Mustangs Forte s.e.	H	229
	Mystic	F	135
	Mystic 250 EW	F	56, 136
	Nexa 500 EC	AR	56
	Nuance 75 WG	H	230
	Opera N	F	138
	Optika Trio š.k.	H	232
	Optimus	AR	58
	Opus EC	F	140
	Opus	F	139
	Orius 250 EW	F	141
	Osiris	F	143
	Osiris Star	F	143
	Ouragan System 4	H	233
	Pixxaro EC	H	234
	Plexeo 90	F	51, 120
	Prepper	K	65
	Priaxor	F	149
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Profi MCPA 750 SL	H	198
	Proline	F	151
	Property 180 SC	F	152
	Prosaro	F	154
	Proteus OD	I	278
	Puma Universal	H	236
	Quelex	H	237
	Rancona 15 ME	K	66
	Redigo Pro	K	66
	Regucil	AR	54
	Revystar XL	F	158
	Revytrex	F	159
	Riza 200 EC	F	160
	Riza 250 EW	F	162
	Roundup Flick	H	240
	Roundup Flex	H	239
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	RUBRIC	F	164
	Saracen	H	245
	Saracen Delta	H	246
	Satel 100 EW	I	267
	Seedron	F	67

1	2	3	4
	Sekator OD	H	246
	Siltra Xpro	F	169
	Spitfire 333 HL	H	246
	Starane 333 HL	H	246
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Syrius	F	141
	Taifun B	H	249
	Talius	F	173
	Tango Flex	F	173
	TBM 75 WG	H	251
	Tebuplius	F	174
	Tebusha 25 EW	F	174
	Tempo	AR	54
	Teppeki	I	281
	Terpal	AR	57
	Tomahawk 200 EC	H	252
	Tooler	H	253
	Torero	F	83
	Trimaxx	AR	58
	Trimmer 50 SG	H	216
	Trimmer 500 WG	H	253
	Tripali	H	254
	Tristar 50 SG	H	254
	Turret 90	F	51, 120
	Variano Xpro	F	178
	Vibrance Pro	K	68
	Vibrance Star	K	69
	Vibrance Trio	K	70
	Viverda	F	179
	Zakeo Xtra	F	132
	Zoxy 250	F	83
	Zypar	H	255
Mieži, vasaras ar ābola pasēju	MCPA 750	H	225
	Stomp CS	H	248
Mieži, vasaras ar lucernas pasēju	Stomp CS	H	248
Mieži, vasaras ar sarkanās auzenes vai ganību airesnes pasēju	Trimmer 50 SG	H	216
Mieži, vasaras ar stiebrzaļu pasēju	Ariane S	H	184
	Biathlon 4D	H	192
	Duplozāns Super š.k.	H	202
	Lontrel 72 SG	H	224
	Primus	H	234
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Tomahawk 200 EC	H	252
Mieži, vasaras un zirņu mists	Stomp CS	H	248
Mieži, ziemas	2.4-D Nufarm	H	181
	Accurate 200 WG	H	181
	Adexar XE	F	71
	Amistar 250 SC	F	76
	Ampera	F	81
	Ariane S	H	184
	Arrat	H	185
	Arrva	H	218
	Artina EC	F	51, 120
	Ascra Xpro	F	82
	Attila 250 SC	F	76
	Axial 50 EC	H	186
	Azaka	F	83
	Banvel 4S	H	186

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Bariton Super	K	61
	Baythroid	I	257
	Bell	F	84
	Bell Super	F	86
	Bertego	AR	54
	Biathlon 4D	H	192
	Boxer 800 EC	H	192
	Bulldock 025 EC	I	257
	Calibre 50 SX	H	196
	Calma	AR	58
	CDQ SX	H	196
	Celest Trio 060 FS	K	62
	Cerix	F	90
	Cerone	AR	49
	Cezix	F	95
	Chwastox 750 SL	H	198
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Cleave	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Comet Pro	F	94
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Curbatur	F	151
	DARCOS	F	95
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delaro	F	96
	Diflanil 500 SC	H	201
	DMA 600	H	201
	Dominic	F	174
	Duett Ultra	F	102
	Duplozāns Super š.k.	H	202
	Elatus Era	F	105
	Elatus Plus	F	106
	Elegant 2FD	H	202
	Epox Extra	F	108
	Epox Top	F	109
	Erasmus	F	95
	Evure	I	272
	Falcon Forte	F	110
	Fastac 50	I	264
	Fleksiti s.k.	F	111
	Flight Forte	H	204
	Flurostar 180	H	205
	Folicur	F	50, 111
	Foxtrot 69 EW	H	210
	Frazer	H	217
	Fury 100 EW	I	267
	Galistop 200	H	217
	Gemino	F	112
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Globaztar 250 SC	F	113
	Glyphomax 480	H	214
	Granstar Premia 50 SX	H	216
	Grassrooter	AR	50
	Grodyl	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Herbos 110 EC	H	217
	Hurler	H	217
	Imtrex XE	F	114
	Input	F	117
	Input Triple	F	118
	Juventus 90	F	51, 120
	Kantik	F	122
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kinto	F	63
	Kinvara	H	218
	Komplet	H	219

1	2	3	4
	Lancelot	H	220
	Leander	F	123
	Legacy 500 SC	H	221
	Legacy Pro	H	221
	Librax	F	124
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maracas	F	127
	Maredo 125 SC	F	128
	Mateno Duo	H	225
	Mavrik	I	272, 273
	Maxim 025 FS	K	64
	Maxim Extra 050 FS	K	64
	Maxim Star 025 FS	K	65
	MCPA 750	H	225
	MCPA Classic 750 SL	H	198
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Medax Top	AR	53
	Mezzo WG	H	227
	Mirador 250 SC	F	76
	Mirador Forte	F	131
	Mirador Xtra	F	132
	Mirage	F	133
	Mixin	H	199
	Meridian	Lim	287
	Moddus 250 EC	AR	54
	Moddus Start	AR	54
	Mollo	H	245
	Moxa	AR	55
	Mustangs s.e.	H	229
	Mystic	F	135
	Mystic 250 EW	F	56, 136
	Nexa 500 EC	AR	56
	Next	AR	56
	Nuance 75 WG	H	230
	Opera N	F	138
	Optimus	AR	58
	Opus EC	F	140
	Opus	F	139
	Orius 250 EW	F	141
	Osiris	F	143
	Osiris Star	F	143
	Ouragan System 4	H	233
	Pico 750 WG	H	233
	Pixxaro EC	H	234
	Plexeo 90	F	51, 120
	Prepper	K	65
	Priaxor	F	149
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Profi MCPA 750 SL	H	198
	Proline	F	151
	Property 180 SC	F	152
	Prosaro	F	154
	Proteus OD	I	278
	Puma Universal	H	236
	Quelex	H	237
	Rancona 15 ME	K	66
	Regucil	AR	54
	Revytstar XL	F	158
	Revytstar	F	159
	Riza 200 EC	F	160
	Riza 250 EW	F	162
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240

1	2	3	4
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Roxy 800 EC	H	245
	RUBRIC	F	164
	Saracen	H	245
	Saracen Delta	H	246
	Satel 100 EW	I	267
	Seedron	F	67
	Sekator OD	H	246
	Siltra Xpro	F	169
	Spitfire 333 HL	H	246
	Starane 333 HL	H	246
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Syrius	F	141
	Taifun B	H	249
	Talius	F	173
	Tango Flex	F	173
	TBM 75 WG	H	251
	Tebuplius	F	174
	Tebusha 25 EW	F	174
	Tempo	AR	54
	Teppeki	I	281
	Terpal	AR	57
	Tomahawk 200 EC	H	252
	Tooler	H	253
	Torero	F	58
	Trimaxx	AR	216
	Trimmer 50 SG	H	253
	Trimmer 500 WG	H	254
	Tripali	H	51, 120
	Turret 90	F	51, 120
	Variano Xpro	F	68
	Vibrance Pro	K	69
	Vibrance Star	K	70
	Vibrance Trio	K	70
	Viverda	F	179
	Zakeo Xtra	F	132
	Zoxy 250	F	83
	Zypar	H	255
Mieži, ziemas ar stiebrāju pasēju	Ariane S	H	184
	Lontrel 72 SG	H	224
	Primus	H	234
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
Rudzi	Tomahawk 200 EC	H	252
	2,4-D Nufarm	H	181
	Adexar XE	F	71
	Amistar 250 SC	F	76
	Ampera	F	81
	Ariane S	H	184
	Arrat	H	185
	Arrva	H	218
	Artina EC	F	51, 120
	Ascra Xpro	F	82
	Attila 250 SC	F	76
	Attribut	H	185
	Avoxa	H	185
	Banvel 4S	H	186
	Bariton Super	K	61
	Baythroid	I	257
	Bell	F	84
	Bell Super	F	86
	Bertego	AR	54
	Biathlon 4D	H	192
	Boxer 800 EC	H	192

1	2	3	4
	Broadway Star	H	194
	Bulldock 025 EC	I	257
	Calibre 50 SX	H	196
	CCC	AR	49
	CDQ SX	H	196
	Celest Trio 060 FS	K	62
	Cerix	F	90
	Cerone	AR	49
	Chwastox 750 SL	H	198
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Cleave	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Comrade	F	94
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Curbatur	F	151
	Cycocel 750	AR	50
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delaro	F	96
	Dicoherb Super 750 SL	H	201
	Diflanil 500 SC	H	201
	DMA 600	H	201
	Duett Ultra	F	102
	Duplozāns Super š.k.	H	202
	Elatus Era	F	105
	Elatus Plus	F	106
	Elegant 2FD	H	202
	EpoX Top	F	109
	Estets 600 e.k.	H	203
	Evure	I	272
	Falcon Forte	F	110
	Fastac 50	I	264
	Fleksiti s.k.	F	111
	Flight Forte	H	204
	Flurostar 180	H	205
	Foxtrot 69 EW	H	210
	Fury 100 EW	I	267
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Globaztar 250 SC	F	113
	Glyphomax 480	H	214
	Granprotec	I	267
	Granstar Premia 50 SX	H	216
	Grodyl	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Hussar Activ Plus OD	H	217
	Imtrex XE	F	114
	Input	F	117
	Input Triple	F	118
	Ironmax Pro	Lim	285
	Juventus 90	F	51, 120
	Kaiso 50 EG	I	268
	Kantik	F	122
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kinto	F	63
	Kinvara	H	218
	Komplet	H	219
	Lancelot	H	220
	Leander	F	123
	Legacy 500 SC	H	221
	Librax	F	124
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maracas	F	127
	Maredo 125 SC	F	128
	Mateno Duo	H	225

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Mavrik	I	272, 273
	Maxim 025 FS	K	64
	Maxim Extra 050 FS	K	64
	MCPA 750	H	225
	MCPA Classic 750 SL	H	198
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Medax Top	AR	53
	Meridian	Lim	287
	Mezzo WG	H	227
	Mirador 250 SC	F	76
	Mirador Forte	F	131
	Mirador Xtra	F	132
	Mixin	H	199
	Moddus 250 EC	AR	54
	Moddus Start	AR	54
	Mollo	H	245
	Moxa	AR	55
	Mustangs s.e.	H	229
	Mustangs Forte s.e.	H	229
	Mystic	F	135
	Mystic 250 EW	F	56, 136
	Nexa 500 EC	AR	56
	Nuance 75 WG	H	220
	Opera N	F	138
	Opus EC	F	140
	Opus	F	139
	Orius 250 EW	F	141
	Osiris	F	143
	Osiris Star	F	143
	Pico 750 WG	H	233
	Pixxaro EC	H	234
	Plexeo 90	F	51, 120
	Prepper	K	65
	Priaxor	F	149
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Profi MCPA 750 SL	H	198
	Proline	F	151
	Property 180 SC	F	152
	Prosaro	F	154
	Proteus OD	I	278
	Puma Universal	H	236
	Quelex	H	237
	Regucil	AR	54
	Revystar XL	F	158
	Revytrex	F	159
	Riza 200 EC	F	160
	Riza 250 EW	F	162
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roxy 800 EC	H	245
	RUBRIC	F	164
	Saracen	H	245
	Saracen Delta	H	246
	Satel 100 EW	I	267
	Seedron	F	67
	Sekator OD	H	246
	Siltra Xpro	F	169
	Spitfire 333 HL	H	246
	Stabilāns 750 š.k.	AR	49
	Starane 333 HL	H	246
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Syper	I	258
	Syrius	F	141
	Talius	F	173

1	2	3	4
	Tango Flex	F	173
	TBM 75 WG	H	251
	Tempo	AR	54
	Teppeki	I	281
	Terpal	AR	57
	Tomahawk 200 EC	H	252
	Tombo WG	H	253
	Tooler	H	253
	Trimmer 50 SG	H	216
	Trimmer 500 WG	H	253
	Tripali	H	254
	Turret 90	F	51, 120
	Variano Xpro	F	178
	Vibrance Duo	K	68
	Vibrance Pro	K	68
	Vibrance Star	K	69
	Vibrance Trio	K	70
	Viverda	F	179
	Wizard 500 EC	I	258
	Zakeo Xtra	F	132
	Zypar	H	255
Rudzi ar stiebrzāļu pasēju	Ariane S	H	184
	Lontrel 72 SG	H	224
	Primus	H	234
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Tomahawk 200 EC	H	252
Rudzi, vasaras	Azaka	F	83
	Torero	F	83
	Zoxy 250	F	83
Rudzi, ziemas	Azaka	F	83
	Torero	F	83
	Zoxy 250	F	83
Tritikāle	2.4-D Nufarm	H	181
	Accurate 200 WG	H	181
	Amistar 250 SC	F	76
	Ariane S	H	184
	Arrat	H	185
	Ascra Xpro	F	82
	Attila 250 SC	F	76
	Banvel 4S	H	186
	Baythroid	I	257
	Bell	F	84
	Bell Super	F	86
	Bertego	AR	54
	Biathlon 4D	H	192
	Boxer 800 EC	H	192
	Broadway Star	H	194
	Bulldock 025 EC	I	257
	Calibre 50 SX	H	196
	CCC	AR	49
	Celest Trio 060 FS	K	62
	Cerone	AR	49
	Chwastox 750 SL	H	198
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Cycocel 750	AR	50
	Decis Mega	I	261
	Diflanil 500 SC	H	201
	DMA 600	H	201
	Duett Ultra	F	102
	Duplozāns Super š.k.	H	202
	Elegant 2FD	H	202
	Epox Extra	F	108
	Epox Top	F	109

1	2	3	4
	Estets 600 e.k.	H	203
	Fastac 50	I	264
	Fleksiti s.k.	F	111
	Flight Forte	H	204
	Foxtrot 69 EW	H	210
	Fury 100 EW	I	267
	Gemino	F	112
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Glyphomax 480	H	214
	Granstar Premia 50 SX	H	216
	Grodyl	H	216
	Gusto	Lim	283, 284
	Imtrex XE	F	114
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kaiso 50 EG	I	268
	Kestac 50	I	264
	Kinto	F	63
	Komplet	H	219
	Leander	F	123
	Legacy 500 SC	H	221
	Legacy Pro	H	221
	Librax	F	124
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maredo 125 SC	F	128
	Meridian	Lim	287
	Mezzo WG	H	227
	Mirador 250 SC	F	76
	Moddus 250 EC	AR	54
	Moddus Start	AR	54
	Mollo	H	245
	Monitor	H	229
	Mustangs s.e.	H	229
	Mustangs Forte s.e.	H	229
	Mystic	F	135
	Nuance 75 WG	H	230
	Opera N	F	138
	Opus EC	F	140
	Opus	F	139
	Osiris	F	143
	Osiris Star	F	143
	Pixxaro EC	H	234
	Priaxor	F	149
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Proteus OD	I	278
	Prosaro	F	154
	Regucil	AR	54
	Riza 200 EC	F	160
	Riza 250 EW	F	162
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	RUBRIC	F	164
	Saracen	H	245
	Saracen Delta	H	246
	Satel 100 EW	I	267
	Sekator OD	H	246
	Siltra Xpro	F	169
	Stabilāns 750 š.k.	AR	49
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	239
	Tango Flex	F	173
	TBM 75 WG	H	251
	Tempo	AR	54
	Tomahawk 200 EC	H	252

1	2	3	4
	Tombo WG	H	253
	Tooler	H	253
	Trimmer 50 SG	H	216
	Variano Xpro	F	178
	Viverda	F	179
	Zypar	H	255
Tritikāle ar stiebrzāļu paseju	Ariane S	H	184
	Lontrel 72 SG	H	224
	Primus	H	234
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Tomahawk 200 EC	H	252
Tritikāle, vasaras	Adexar XE	F	71
	Ampera	F	81
	Artina EC	F	51, 120
	Azaka	F	83
	Bariton Super	K	61
	Cerix	F	90
	Cleave	H	199
	Comrade	F	94
	Curbatur	F	151
	Delaro	F	96
	Difend	K	62
	Elatus Era	F	105
	Elatus Plus	F	106
	Evure	I	272
	Falcon Forte	F	110
	Flurostar 180	H	205
	Globaztar 250 SC	F	113
	Input	F	117
	Input Triple	F	118
	Juventus 90	F	51, 120
	Kantik	F	122
	Maracas	F	127
	Maxim 025 FS	K	64
	Maxim Extra 050 FS	K	64
	Mavrik	I	272, 273
	MCPA Classic 750 SL	H	198
	Mirador Forte	F	131
	Mirador Xtra	F	132
	Mirage	F	133
	Mixin	H	199
	Moxa	AR	55
	Plexeo 90	F	51, 120
	Profi MCPA 750 SL	H	198
	Proline	F	151
	Property 180 SC	F	152
	Redigo Pro	K	66
	Revystar XL	F	158
	Revytrex	F	159
	Seedron	F	67
	Syper	I	258
	Talius	F	173
	Torero	F	83
	Trimmer 500 WG	H	253
	Turret 90	F	51, 120
	Vibrance Duo	K	68
	Vibrance Pro	K	68
	Vibrance Star	K	69
	Wizard 500 EC	I	758
	Zakeo Xtra	F	132
	Zoxy 250	F	83
Tritikāle, ziemas	Adexar XE	F	71
	Ampera	F	81
	Arrva	H	218
	Artina EC	F	51, 120

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Attribut	H	185
	Avoxa	H	185
	Azaka	F	83
	Bariton Super	K	61
	Bolid 250 SE	F	87
	CDQ SX	H	196
	Cerix	F	90
	Cleave	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Comrade	F	94
	Curbatur	F	151
	Decis Forte	I	259
	Delaro	F	96
	Difend	K	62
	Elatas Era	F	105
	Elatas Plus	F	106
	Evure	I	272
	Falcon Forte	F	110
	Flurostar 180	H	205
	Globaztar 250 SC	F	113
	Herbos 110 EC	H	217
	Hussar Activ Plus OD	H	217
	Input	F	117
	Input Triple	F	118
	Juventus 90	F	51, 120
	Kantik	F	122
	Kinvara	H	218
	Lancelot	H	220
	Lontrel 600 SL	H	223
	Maracas	F	127
	Mateno Duo	H	225
	Maxim 025 FS	K	64
	Maxim Extra 050 FS	K	64
	Mavrik	I	272, 273
	MCPA Classic 750 SL	H	198
	Medax Top	AR	53
	Mirador Forte	F	131
	Mirador Xtra	F	132
	Mirage	F	133
	Mixin	H	199
	Moxa	AR	55
	Mystic 250 EW	F	56, 136
	Nexa 500 EC	AR	56
	Pico 750 WG	H	233
	Plexeo 90	F	51, 120
	Profi MCPA 750 SL	H	198
	Proline	F	151
	Property 180 SC	F	152
	Puma Universal	H	236
	Quelex	H	237
	Revystar XL	F	158
	Revytrex	F	159
	Roxy 800 EC	H	245
	Seedron	F	67
	Spitfire 333 HL	H	246
	Starane 333 HL	H	246
	Syper	I	258
	Talius	F	173
	Teppeki	I	281
	Torero	F	83
	Trimmer 500 WG	H	253
	Tripali	H	254
	Tristar 50 SG	H	254
	Turret 90	F	51, 120
	Vibrance Duo	K	68
	Vibrance Pro	K	68
	Vibrance Star	K	69
	Vibrance Trio	K	70
	Wizard 500 EC	I	758

1	2	3	4
	Zakeo Xtra	F	132
	Zoxy 250	F	83
Vasarāju graudaugi	Agroksons 75 š.k.	H	184
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Agroksons 75 š.k.	H	184
	Basagran 480	H	190
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
Vasarāju graudaugi ar lucernas pasēju	Basagran 480	H	190
Vasarāju graudaugi ar stiebrzāļu pasēju	Basagran 480	H	190
Ziemāju graudaugi	Agroksons 75 š.k.	H	184
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
Ziemāju graudaugi ar āboliņa pasēju	Basagran 480	H	190
Ziemāju graudaugi ar lucernas pasēju	Basagran 480	H	190
Ziemāju graudaugi ar stiebrzāļu pasēju	Basagran 480	H	190
RAPSIS, RIPSIS			
Rapsis	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Baythroid	I	257
	Bulldock 025 EC	I	257
	Clinic Up	H	187
	Fastac 50	I	284
	Gallup Super 360	H	187
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Ouragan System 4	H	233
	Rosate 360 TF	H	187
	Roundup Ultra	H	244
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
Rapsis, vasaras	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Amistar Gold	F	80
	Ampera	F	81
	Artina EC	F/AR	51, 120
	Attila 250 SC	F	76
	Avaunt	I	256
	Azaka	F	83
	Barca 334 SL	H	190
	Biscaya OD	I	256
	Brasan 540 EC	H	193
	Buteo Start	K	61
	Butisan 400	H	194
	Butisan Avant	H	195
	Butisan Kombi	H	195
	Butisan Pro	H	250
	Butisan Star	H	195
	Cantus	F	89
	Cantus Gold	F	89
	Caryx	AR	48
	Centurion Plus	H	197
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Clamox	H	198
	Clap Forte	H	198
	Cleravo	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261

1	2	3	4
	Devrinols s.k.	H	200
	Difcor 250 EC	F	98
	Efilor	F	105
	Evure	I	272
	Focus Ultra	H	205
	Folicur	F/AR	50, 111
	Fox 480 SC	H	209
	Fuego Top	H	249
	Fury 100 EW	I	267
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Galera š.k.	H	213
	Gepard 50 EC	H	237
	Glyphomax 480	H	214
	Graminis	H	237
	Gusto	Lim	283, 284
	Juventus 90	F/AR	51, 120
	Kaiso 50 EG	I	268
	Kalif 360 CS	H	218
	Kalif Mega	H	218
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Leopard	H	223
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Mavrik	I	272, 273
	Meridian	Lim	287
	Metazamix™	H	226
	Mirador 250 SC	F	76
	Mirador Forte	F	131
	Mirador Xtra	F	132
	Mystic	F	135
	Mystic 250 EW	F	56, 136
	Nimbus SE	H	230
	Orius 250 EW	F	141
	Pantera 4 EC	H	233
	Pictor Active	F	145
	Plexeo 90	F/AR	51, 120
	Propulse	F	153
	Proteus OD	I	278
	Prosaro	F	154
	Quick 50 EC	H	237
	Rapsan 400 SC	H	194
	Rapsan 500 SC	H	238
	Rapsan Plus	H	238
	Rapsan Plus SC	H	195
	Regent	H	218
	Riza 200 EC	F	160
	Riza 250 EW	F	162
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Satel 100 EW	I	267
	Scenic Gold	K	67
	Sultan 500 SC	H	248
	Sultan Super	H	249
	Supero	H	237
	Syper	I	258
	Syrius	F	141
	Taifun B	H	249
	Tanaris	H	250
	Targa Super	H	250
	Teridox 500 EC	H	252
	Tilmor	F/AR	57, 175
	Torero	F	83
	Trico	R	292
	Turret 90	F/AR	51, 120
	Vredmix	F	80
	Wizard 500 EC	I	258

1	2	3	4
	Zakeo Xtra	F	132
	Zetrola	H	182
	Zoxy 250	F	83
Rapsis, ziemas	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Amistar Gold	F	80
	Ampera	F	81
	Artina EC	F/AR	51, 120
	Attila 250 SC	F	76
	Avaunt	I	256
	Azaka	F	83
	Barca 334 SL	H	190
	Belkar	H	191
	Biscaya OD	I	256
	Bolid 250 SE	F	87
	Brasan 540 EC	H	193
	Buteo Start	K	61
	Butisan 400	H	194
	Butisan Avant	H	195
	Butisan Kombi	H	195
	Butisan Pro	H	250
	Butisan Star	H	195
	Cantus	F	89
	Cantus Gold	F	89
	Caryx	AR	48
	Centurion Plus	H	197
	Cezix	F	95
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Clamox	H	198
	Clap Forte	H	198
	Cleravo	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	DARCOS	F	95
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Delmetros 100 SC	I	262
	Devrinols s.k.	H	200
	Difcor 250 EC	F	98
	Efilor	F	105
	Erasmus	F	95
	Evure	I	272
	Focus Ultra	H	205
	Folicur	F/AR	50, 111
	Fox 480 SC	H	209
	Frequent	H	210
	Fuego Top	H	249
	Fury 100 EW	I	267
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Galera š.k.	H	213
	Gepard 50 EC	H	237
	Glyphomax 480	H	214
	Graminis	H	237
	Gusto	Lim	283, 284
	Juventus 90	F/AR	51, 120
	Kaiso 50 EG	I	268
	Kalif 360 CS	H	218
	Kalif Mega	H	218
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Korvetto	H	219
	Leopard	H	223
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Mavrik	I	272, 273
	Meridian	Lim	287
	Metazamix™	H	226
	Mirador 250 SC	F	76
	Mirador Forte	F	131

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Mirador Xtra	F	132
	Mystic	F	135
	Mystic 250 EW	F/AR	56, 136
	Nimbus Gold	H	230
	Nimbus SE	H	230
	Orius 250 EW	F	141
	Pantera 4 EC	H	233
	Pictor Active	F	145
	Plexeo 90	F/AR	51, 120
	Propulse	F	153
	Proteus OD	I	278
	Prosaro	F	154
	Quick 50 EC	H	237
	Rapsan 400 SC	H	194
	Rapsan 500 SC	H	238
	Rapsan Plus	H	238
	Rapsan Plus SC	H	195
	Regent	H	218
	Riza 200 EC	F	160
	Riza 250 EW	F	162
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Satel 100 EW	I	267
	Scenic Gold	K	67
	Sultan 500 SC	H	248
	Sultan Super	H	249
	Supero	H	237
	Syper	I	258
	Syrius	F	141
	Taifun B	H	249
	Tanaris	H	250
	Targa Super	H	250
	Teridox 500 EC	H	252
	Tilmor	F/AR	57, 175
	Toprex 375 SC	AR	57, 177
	Torero	F	83
	Trico	R	292
	Turret 90	F/AR	51, 120
	Vredmix	F	80
	Wizard 500 EC	I	258
	Zakeo Xtra	F	132
	Zetrola	H	182
	Zoxy 250	F	83
Ripsis	Ironmax Pro	Lim	285
	Rapsan 400 SC	H	194
Ripsis, vasaras	Avaunt	I	256
	Buteo Start	K	61
	Butisan 400	H	194
	Cleravo	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Evure	I	272
	Focus Ultra	H	205
	Galera š.k.	H	213
	Lontrel 600 SL	H	223
	Mavrik	I	272, 273
	Metazamix™	H	226
	Pictor Active	F	145
	Scenic Gold	K	67
Ripsis, ziemas	Avaunt	I	256
	Buteo Start	K	61
	Butisan 400	H	194
	Cliophar 600 SL	H	199
	Evure	I	272
	Lontrel 600 SL	H	223
	Mavrik	I	272, 273
	Pictor Active	F	145
	Scenic Gold	K	67

1	2	3	4
PĀKŠAUGI			
Lupina	Boxer 800 EC	H	192
	Maxim 025 FS	K	64
Lupina graudiem	Fusilade Forte 150 EC	H	211
Pākšaugi	Mycostop	F	294
	Triatum-P	F	303
Pupas	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Basagran 480	H	190
	Butoxone	H	195
	CBS sistēma	Dz	307
	Centurion Plus	H	197
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Decis Mega	I	261
	Dithane NT	F	100
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Frequent	H	210
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Glyphomax 480	H	214
	Gusto	Lim	283, 284
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Kestac 50	I	264
	Leopard	H	223
	Mirador 250 SC	F	76
	Pantera 4 EC	H	233
	Proteus OD	I	278
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Switch 62.5 WG	F	171
	Syper	I	258
	Targa Super	H	250
	Wizard 500 EC	I	258
Pupas graudiem	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Centurion Plus	H	197
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Evure	I	272
	Frequent	H	210
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gusto	Lim	283, 284
	Mavrik	I	272, 273
	Mirador 250 SC	F	76
	Zetrola	H	182
Pupas, kāršu	Decis Forte	I	259
	Prosaro	F	154
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
Pupas, lauka	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Basagran 480	H	190
	Boxer 800 EC	H	192
	Clinic Up	H	187
	Decis Forte	I	259
	Fenix	H	203
	Gallup Super 360	H	187
	Landmaster 360 TF	H	187
	Maxim 025 FS	K	64
	Monosate G	H	187
	Prosaro	F	154
	Rosate 360 TF	H	187
	Signum	F	167
	Stomp CS	H	248
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187

1	2	3	4
Pupas, lauka (graudiem)	Pictor Active	F	145
	Propulse	F	153
Pupas, lopbarībai	Prosaro	F	154
	Signum	F	167
Soja	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Ironmax Pro	Lim	285
	Mistral 700 WG	H	228
	Serenade Aso	F	299
Zirņi	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Basagran 480	H	190
	Boxer 800 EC	H	192
	Butoxone	H	195
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Dithane NT	F	100
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Evure	I	272
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Frequent	H	210
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Glyphomax 480	H	214
	Gusto	Lim	283, 284
	Ironmax Pro	Lim	285
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Lentagran WP	H	221
	Leopard	H	223
	Mavrik	I	272, 273
	Maxim 025 FS	K	64
	Mirador 250 SC	F	64
	Proteus OD	I	278
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Serenade Aso	F	299
	Signum	F	167
	Stomp CS	H	248
	Switch 62.5 WG	F	171
	Syper	I	258
	Targa Super	H	250
	Teppeki	I	281
	Trihogramma	Dz	322
	Wizard 500 EC	I	258
	Zetrola	H	182
Zirņi graudiem	Agil 100 EC	H	182
	Amistar 250 SC	F	76
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Centurion Plus	H	197
	Clinic Up	H	187
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Evure	I	272
	Fenix	H	203
	Frequent	H	210
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gallup Super 360	H	187
	Gusto	Lim	283, 284
	Landmaster 360 TF	H	187
	Mavrik	I	272, 273
	Mirador 250 SC	F	76
	Monosate G	H	187

1	2	3	4
	Pantera 4 EC	H	233
	Pictor Active	F	145
	Propulse	F	153
	Prosaro	F	154
	Rosate 360 TF	H	187
	Taifun B	H	249
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Zetrola	H	182
Zirņu mistri	Basagran 480	H	190
KARTUPEĻI			
Kartupeļi	Acrobat Plus	F	71
	Agil 100 EC	H	182
	Altima 500 s.k.	F	75
	Amistar 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Banjo Forte	F	84
	Baythroid	I	257
	Boxer 800 EC	H	192
	Bulldock 025 EC	I	257
	Centurion Plus	H	197
	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Champion 50 WG	F	91
	Decis Mega	I	261
	Delmetros 100 SC	I	262
	Dithane NT	F	100
	Elektis 75 d.g.	F	107
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Emin dārzam Revus 250 SC	F	157
	Evure	I	272
	Fastac 50	I	264
	Fenix	H	203
	Focus Ultra	H	205
	Fibro	I/A	266
	Frowncide 500 s.k.	F	75
	Fury 100 EW	I	267
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gusto	Lim	283, 284
	Infinito	F	115, 116
	Kaiso 50 EG	I	268
	Kalif 360 CS	H	218
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Leimay SC	F	123
	Leopard	H	223
	Manfil 75 WG	F	126
	Manfil 80 WP	F	127
	Mavrik	I	272, 273
	Maxim 025 FS	K	64
	Metric ZC	H	227
	Mirador 250 SC	F	76
	Mistral 700 WG	H	228
	Nando 500 SC	F	137
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Ohayo 500 s.k.	F	75
	Orvego	F	142
	Pantera 4 EC	H	233
	Penncozeb 75 DG	F	144
	Penncozeb 80 WP	F	145
	Proman	H	236
	Proteus OD	I	278
	Ranman Top	F	156
	Regent	H	218
	Revus 250 SC	F	156, 157
	Revus Top	F	157
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	160
	Roxy 800 EC	H	245
	Satel 100 EW	I	267
	Signum	F	167

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Syper	I	258
	Širlans 500 s.k.	F	75
	Teppeki	I	281
	Titus 25 d.g.	H	252
	Tridex DG	F	144
	Trimanoc DG	F	144
	Winby 500 s.k.	F	75
	Wizard 500 EC	I	258
	Zetrola	H	182
	Zorvec Enicade	F	180
LINI			
Lini	Accurate 200 WG	H	181
	Agil 100 EC	H	182
	Agroksons 75 š.k.	H	184
	Basagran 480	H	190
	Centurion Plus	H	197
	Cliphar 600 SL	H	199
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Grodyl	H	216
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maxim Star 025 FS	K	65
	MCPA 750	H	225
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
	Pantera 4 EC	H	233
	Pictor Active	F	145
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Taifun B	H	249
	Zetrola	H	182
Lini, eļļas	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Gallup Super 360	H	187
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Serenade Aso	F	299
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
KUKURŪZA			
Kukurūza	Arrat	H	185
	Banvel 4S	H	186
	Callisto 100 SC	H	196
	Cliphar 600 SL	H	199
	Dicash	H	201
	Elumis 105 OD	H	202
	Estets 600 e.k.	H	203
	Fastac 50	I	264
	Fornet 4 OD	H	227
	Fornet Max 6 OD	H	228
	Granprotec	I	267
	Gusto	Lim	283, 284
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Maister Power OD	H	225
	Meridian	Lim	287
	Milagro 4 OD	H	227
	Milagro Extra 6 OD	H	228

1	2	3	4
	Nicogan	H	230
	Niklos 40 OD	H	227
	Onyx	H	232
	Opera N	F	138
	Propulse	F	153
	Proteus OD	I	278
	Samson 4 OD	H	227
	Samson Max 6 OD	H	228
	Spitfire 333 HL	H	246
	Starane 333 HL	H	246
	Starship	H	247
	Stomp CS	H	248
	Temsa SC	H	251
	Titus 25 d.g.	H	252
	Trico	R	292
SAULESPUĶES			
Saulespuķes	Boxer 800 EC	H	192
	Fenix	H	203
	Ironmax Pro	Lim	285
	Trico	R	292
KRĀŠNUMAUGI, DEKORATĪVIE AUGI			
Acālijas	Champion 50 WG	F	91
Antūrijas	Feltiella sistēma	Dz	311
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311
Arālījas	Champion 50 WG	F	91
Atraitnītes	Karate Zeon 5 CS	I	268
Balzamīnes	CBS sistēma	Dz	307
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
Begonijas (atklātā laukā)	Candit	F	88
	Champion 50 WG	F	91
Begonijas (segtās platībās)	Candit	F	88
	Champion 50 WG	F	91
Daturas	CBS sistēma	Dz	307
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
Dekoratīvie kokaugi	Topas 100 EC	F	176
Dekoratīvie kokaugi un krūmi	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Wöbra	R	292
Dekoratīvās kultūras, augi	Decis Forte	I	259
	Envidor	I/A	262
	Ferramol	Lim	283
	Gusto	Lim	283, 284
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Limonikus sistēma	Dz	313
	Meridian	Lim	287
	Montdorensis sistēma	Dz	315
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Pangodiņš	Dz	318
	Polytanol	Ro	293
	Prestop	F	296
	SLUXX ^{HP}	Lim	290
	Detia Wühlmausgas	R	291
Dižkallas	CBS sistēma	Dz	307
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
Efejas	Champion 50 WG	F	91
Filodendroni	Champion 50 WG	F	91
Frējijas	CBS sistēma	Dz	307
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
Fuksijas	CBS sistēma	Dz	307
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
Gerberas	ABS sistēma	Dz	305
	Afidius sistēma	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306

1	2	3	4
	Ambliseijus sistēma	Dz	306
	Diglifus sistēma	Dz	308
	Enkarsijas sistēma	Dz	309
	Eretmiks sistēma	Dz	310
	Eretmoceru sistēma	Dz	310
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311
	Hipoaspis sistēma	Dz	312
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Mycostop	F	294
	Orius sistēma	Dz	318
Gerberas (atklātā laukā)	Candit	F	88
Gerberas (segtās platībās)	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Swirskii-Mite LD	Dz	321
Gladiolas	Champion 50 WG	F	91
	Merpan 80 WG	F	130
Gladiolas (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
Ģerānijas (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
Hiacintes (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
	Merpan 80 WG	F	130
Īrisi (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
	Merpan 80 WG	F	130
Jukas	Champion 50 WG	F	91
Klīntenes	Champion 50 WG	F	91
Krašņumaugi	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	305
	Agil 100 EC	H	182
	Attila 250 SC	F	76
	Dithane NT	F	100
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gusto	Lim	283, 284
	Mycostop	F	294
	Nemaslug	Dz	315
	Nemasys	Dz	315
	Nemasys C	Dz	316
	Nemasys No Ants	Dz	317
	Previcur Energy	F	146
	Teppeki	I	281
	Trianum-P	F	303
	Zetrola	H	182
Krašņumaugi atklātā laukā	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	305
	Aliette	F	74
	Amistar 250 SC	F	76
	Avtar 75 NT	F	100
	Decis Forte	I	259
	Decis Mega	I	261
	Difcor 250 EC	F	98
	Emin dārzam Mavrik Vita	I	273
	Evure	I	272
	Fastac 50	I	264
	Kestac 50	I	264
	Larvanem	Dz	313
	Mavrik	I	272, 273
	Mirador 250 SC	F	76

1	2	3	4
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Prestop	F	296
	Previcur Energy	F	146
	Serenade Aso	F	299
	Sferoforia sistēma	Dz	318
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
Krašņumaugi (līdz 50 cm augstumam – sējumi un stādījumi)	Ciperkils 500 e.k.	I	258
	Syper	I	258
	Wizard 500 EC	I	258
Krašņumaugi segtās platībās	Aliette	F	74
	Amistar 250 SC	F	76
	Aphidend	Dz	306
	Ahipar	Dz	307
	Aphiscout	Dz	307
	Champion 50 WG	F	91
	Cryptobug	Dz	307
	Cryptobug-L	Dz	308
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Decis Forte	I	259
	Difcor 250 EC	F	98
	Enermix	Dz	308
	En-strip	Dz	309
	Entomite-M	Dz	309
	Entonem	Dz	310
	Ercal	Dz	310
	Ervipar	Dz	311
	Fastac 50	I	264
	Kestac 50	I	264
	Larvanem	Dz	313
	Macro-Mite	Dz	313
	Miglyphus	Dz	314
	Mirador 250 SC	F	76
	Mirical	Dz	314
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
	Prestop	F	296
	Serenade Aso	F	299
	Sferoforia sistēma	Dz	318
	Spical	Dz	318
	Spical Plus	Dz	319
	Spidex	Dz	319
	Spidend	Dz	319
	Steinernema sistēma	Dz	320
	Swirskii-Mite	Dz	320
	Swirskii-Mite Plus	Dz	321
	Switch 62.5 WG	F	171
	Thripex (Thripex-plus)	Dz	321
	Thripor-L	Dz	322
	Topas 100 EC	F	176
	Trianum-P	F	303
	Vertimec 018 EC	I/A	282
Krizantēmas	Afidius sistēma	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306
	Diglifus sistēma	Dz	308
	Enkarsijas sistēma	Dz	309
	Eretmiks sistēma	Dz	310
	Eretmoceru sistēma	Dz	310
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311
	Hipoaspis sistēma	Dz	312
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Topas 100 EC	F	176
Krizantēmas (atklātā laukā)	Amistar 250 SC		76
	Candit	F	88
	Champion 50 WG	F	91

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Mavita 250 EC	F	165
	Mirador 250 SC	F	76
	Score 250 EC	F	165, 167
Krizantēmas (segtās platībās)	Amistar 250 SC	F	76
	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307
	Champion 50 WG	F	91
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Emin dārzam Score 250 EC	F	166
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Mavita 250 EC	F	165
	Mirador 250 SC	F	76
	Score 250 EC	F	165, 167
	Steinernema sistēma	Dz	320
Krokusi (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
	Merpan 80 WG	F	130
Lefkojas	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	160
Lilijas	Champion 50 WG	F	91
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Merpan 80 WG	F	130
Lilijas (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
Magones (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
Narcises (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
	Merpan 80 WG	F	130
	Stomp CS	H	248
Neļķes (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Candit	F	88
	Champion 50 WG	F	91
	Dithane NT	F	100
Neļķes (segtās platībās)	Candit	F	88
	Champion 50 WG	F	91
Orhidejas	Aliette	F	74
Pelargonijas (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
Petūnijas	Karate Zeon 5 CS	I	268
Pirakantas	Champion 50 WG	F	91
Puansetijas	ABS sistēma	Dz	305
	Afidius sistēma	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306
	Ambliseijus sistēma	Dz	306
	CBS sistēma	Dz	307
	Enkarsijas sistēma	Dz	309
	Eretmiks sistēma	Dz	310
	Eretmoceru sistēma	Dz	310
	Hipoaspis sistēma	Dz	312
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
Primulas	Karate Zeon 5 CS	I	268
Rozes	ABS sistēma	Dz	305
	Afidius sistēma	Dz	305
	Afidoletes sistēma	Dz	306
	Ambliseijus sistēma	Dz	306
	Enkarsijas sistēma	Dz	309
	Eretmiks sistēma	Dz	310
	Eretmoceru sistēma	Dz	310
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311

1	2	3	4
	Hipoaspis sistēma	Dz	312
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Orius sistēma	Dz	318
	Ridomil Gold MZ 68 WG	F	160
Rozes (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Candit	F	88
	Champion 50 WG	F	91
	Difcor 250 EC	F	98
	Dithane NT	F	100
Rozes (segtās platībās)	Candit	F	88
	CBS sistēma	Dz	307
	Champion 50 WG	F	91
	Difcor 250 EC	F	98
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Fitosējuluss	Dz	312
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Swirskii-Mite LD	Dz	321
Segliņi	Champion 50 WG	F	91
Sīpolpuķes	Trianum-P	F	303
Tulpes	Champion 50 WG	F	91
	Merpan 80 WG	F	130
	Stomp CS	H	248
Tulpes (atklātā laukā)	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
ZĀLĀJI, ILGGADĪGAS STIEBRZĀLES un TAURINĶIEŽI			
Airene, daudzdziedu	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
Airene, ganību	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Medax Top	AR	53
	Moxa	AR	55
Auzene, niedru	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Medax Top	AR	53
Auzene, pļavas	2.4-D Nufarm	H	181
	Moxa	AR	55
Auzene, sarkanā	Agil 100 EC	H	182
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Focus Ultra	H	205
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Medax Top	AR	53
	Moxa	AR	55
	Zetrola	H	182
Āboliņš	Agroksons 75 š.k.	H	184
	Basagran 480	H	190
	MCPA 750	H	225
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
Āboliņš, baltais	Butoxone	H	195
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
Āboliņš, bastarda	Fusilade Forte 150 EC	H	211
Āboliņš, sarkanais	Butoxone	H	195
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
Āboliņš, sēklai	Agil 100 EC	H	182
	Fastac 50	I	264
	Focus Ultra	H	205
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	
	Zetrola	H	182
Dižauza, augstā	2.4-D Nufarm	H	181
Galega	Butoxone	H	195
Kamolzāle, parastā	2.4-D Nufarm	H	181
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Medax Top	AR	53

1	2	3	4
Lācauza, bezakotu	2.4-D Nufarm	H	181
Lapsaste, pļavas	2.4-D Nufarm	H	181
Lucerna	Basagran 480	H	190
	Fastac 50	I	264
	Kestac 50	I	264
Lucerna sēklai	Focus Ultra	H	205
	Karate Zeon 5 CS	I	268
Skarene, pļavas	2.4-D Nufarm	H	181
Stiebrzāles, daudzgadīgās	Agroksons 75 š.k.	H	184
	Ariane S	H	184
	Estets 600 e.k.	H	203
	Fastac 50	I	264
	Grodyl	H	216
	Kestac 50	I	264
	MCPA 750	H	225
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
Stiebrzāles – sēklu lauki	Ariane S	H	184
	Arrva	H	218
	Cleave	H	199
	Cliophar 600 SL	H	199
	Cycocel 750	AR	50
	Flurostar 180	H	205
	Kinvara	H	218
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	Mixin	H	199
	Moddus Start	AR	54
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
	Tomahawk 200 EC	H	252
Stiebrzāles - lopbarībai	Arrva	H	218
	Cleave	H	199
	Kinvara	H	218
	Mixin	H	199
Stiebrzāles, daudzgadīgās – sēklu lauki	Flurostar 180	H	205
	Mollo	H	245
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
	Saracen	H	245
	Saracen Delta	H	246
	Tomahawk 200 EC	H	252
Stiebrzāles, daudzgadīgās – lopbarībai	Flurostar 180	H	205
	Tomahawk 200 EC	H	252
Timotiņš, pļavas	2.4-D Nufarm	H	181
	Countdown NT	AR	49
	Cuadro NT	AR	49
	Moxa	AR	55
Zālāji	Banvel 4S	H	186
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Gallup Super 360	H	187
	Landmaster 360 TF	H	187
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Meridian	Lim	287

1	2	3	4
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
ZĀLIENS			
Zāliena atjaunošana	Roundup 60	H	238
	Roundup B	H	238
	Roundup G	H	241
Zāliens	Amistar 250 SC	F	76
	Arrva	H	218
	Attila 250 SC	F	76
	Ferramol	Lim	283
	Flurostar 180	H	205
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kestac 50	I	264
	Kinvara	H	218
	Larvanem	Dz	313
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Meridian	Lim	287
	Mirador 250 SC	F	76
	Nemasys No Ants	Dz	317
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
	Tomahawk 200 EC	H	252
Zāliens golfa laukumā	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Fastac 50	I	264
	Larvanem	Dz	313
	Mirador 250 SC	F	76
	Switch 62.5 WG	F	171
	Tomahawk 200 EC	H	252
KOKAUDZĒTAVAS, STĀDAUDZĒTAVAS, JAUNAUDZES			
Apses kokaudzētavās	Merpan 80 WG	F	130
Augļu koku stādaudzētavas	Agil 100 EC	H	182
	Envidor	I/A	262
	Gusto	Lim	283, 284
	Zetrola	H	182
Baltegļes kokaudzētavās	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
Dekoratīvie krūmi kokaudzētavās	Switch 62.5 WG	F	171
Egļes kokaudzētavās	Cliophar 600 SL	H	199
	Fenix	H	203
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
Egļes kokaudzētavās un jaunaudzēs	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
Egļes, Ziemassvētku	Fenix	H	203
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
Kārkli, stādījumi	Fenix	H	203
Kļavas kokaudzētavās	Merpan 80 WG	F	130
Kokaugi, atklātā laukā	Serenade Aso	F	299
Kokaugi kokaudzētavās	Serenade Aso	F	299
	Trianum-P	F	303
Kokaugi, segtās platībās	Serenade Aso	F	299

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
Koku jaunaudzēs pēc ierīkošanas mežā	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Gallup Super 360	H	187
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
Krūmi, atklātā laukā	Serenade Aso	F	299
Krūmi kokaudzētavās	Serenade Aso	F	299
	Triunum-P	F	303
Krūmi, segtās platībās	Serenade Aso	F	299
Lapegles kokaudzētavās	Fenix	H	203
Lapu koki kokaudzētavās	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Fastac 50	I	264
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Mirador 250 SC	F	76
	Prestop	F	296
	Switch 62.5 WG	F	171
	Topas 100 EC	F	176
Lapu koku jaunaudzēs	Cervacol extra	R	291
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Plantskydd	R	291
	Trico	R	292
	WAM extra	R	292
	Wöbra	R	292
Meža kultūru stādu audzētavas	Agil 100 EC	H	182
	Gusto	Lim	283, 284
	Zetrola	H	182
Meža kultūru stādu audzētavas, pirms stādījumu ierīkošanas	Roundup Flex	H	239
	Roundup PowerMax	H	242
Ogulāji stādaudzētavās	Agil 100 EC	H	182
	Envidor	I/A	262
	Zetrola	H	182
Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Gallup Super 360	H	187
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187

1	2	3	4
Priedes kokaudzētavās	Fenix	H	203
Priedes kokaudzētavās un jaunaudzēs	Avtar 75 NT	F	100
	Dithane NT	F	100
Rhododendri kokaudzētavās	Merpan 80 WG	F	130
Skuju koku jaunaudzēs	Cervacol extra	R	291
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Ouragan System 4	H	233
	Plantskydd	R	291
	Roundup Ultra	H	244
	Trico	R	292
	WAM extra	R	292
	Wöbra	R	292
Skuju koku jaunie stādījumi	Emin dārzam Taifun B	H	249
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Glyphomax 480	H	214
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Taifun B	H	249
Skuju koki kokaudzētavās	Amistar 250 SC	F	76
	Attila 250 SC	F	76
	Fastac 50	I	264
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
	Mirador 250 SC	F	76
	Prestop	F	296
	Switch 62.5 WG	F	171
Stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās	ABS sistēma	Dz	305
	Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)	Dz	305
	Ambliseijus sistēma	Dz	306
	CBS sistēma	Dz	307
	Daknusa sistēma	Dz	308
	Feltiella sistēma	Dz	311
	Fitoseiulus sistēma	Dz	311
	Hipoaspis sistēma	Dz	312
	Kalifornikus sistēma	Dz	312
	Orius sistēma	Dz	318
	Steinernema sistēma	Dz	320
MEŽI			
Koku retināšana mežā	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Gallup Super 360	H	187
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
NOLIKTAVAS			
Noliktavas	Actellic 50 EC	I/A	256
	Fastac 50	I	264
	K-Obiol	I	270
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264

1	2	3	4
Noliktavas, kartupeļu	Menno Florades	Dez	59
Noliktavu apkārtnē	Karate Zeon 5 CS	I	268
Sēklas materiāls (dažādu kultūru)	Actellic 50 EC	I/A	256
DAŽĀDI			
Apelsīni	Banarg	AR	48
Apiņi	Trico	R	292
Atmata	Kyleo	H	219
Augsne	Nemasys H	Dz	317
	Nemasys L	Dz	317
Banāni	Banarg	AR	48
Celmi	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Gallup Super 360	H	187
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Glyphomax 480	H	214
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Rosate 360 TF	H	187
	Rotstop	F	298
	Rotstop SC	F	298
	Roundup B	H	238
	Roundup Flick	H	240
	Roundup G	H	241
	Roundup Gel Max	H	242
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
Celmiņi (krūmi)	Roundup B	H	238
	Roundup G	H	241
	Roundup Gel Max	H	242
Ceļa malas	Accurate 200 WG	H	181
	Nuance 75 WG	H	230
	Zypar	H	255
Citroni	Banarg	AR	48
Citrusaugļi	Banarg	AR	48
Daudzgadīgie augi	Triunum-P	F	303
Dažādu kultūru dēsti un stādi	Triunum-P	F	303
Dzelzceļi	Banvel 4S	H	186
	Nozomi p.s.	H	230
Ganības	Agroksons 75 š.k.	H	184
	Ariane S	H	184
	Arrva	H	218
	Banvel 4S	H	186
	Cliophar 600 SL	H	199
	Detia Wühlmausgas	R	291
	Estets 600 e.k.	H	203
	Ironmax Pro	Lim	285
	Kinvara	H	218
	Lima Oro	Lim	287, 289
	Limgol	Lim	287
	Lontrel 600 SL	H	223
	Lontrel 72 SG	H	224
	MCPA 750	H	225
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Meridian	Lim	287
	Mixin	H	199
	Mollo	H	245
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
	Primus	H	234
	Primus 250 WG	H	235
	Primus XL	H	236
	Pro	H	234
	Roundup Flick	H	240

1	2	3	4
	Roundup PowerMax	H	242
	Saracen	H	245
	Starane XL	H	247
	SuPrim	H	234
Ganības (zelmenī stiebrzāles)	Cleave	H	199
	Flurostar 180	H	205
	Tomahawk 200 EC	H	252
Graudi	Actellic 50 EC	I/A	256
	K-Obiol	I	270
Greipfrūti	Banarg	AR	48
Griķi	Fusilade Forte 150 EC	H	211
Kaņepes	Ironmax Pro	Lim	285
	Pictor Active	F	145
	Serenade Aso	F	299
Klementīni	Banarg	AR	48
Koksne (kokmateriāli)	Fastac 50	I	264
	Karate Zeon 5 CS	I	268
	Kestac 50	I	264
Kvinoja	Serenade Aso	F	299
Lauksaimniecības kultūras	Ferramol	Lim	283
	Polytanol	Ro	293
	SLUXX ^{HP}	Lim	290
	Detia Wühlmausgas	R	291
Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Accurate 200 WG	H	181
	Banvel 4S	H	186
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Emin dārzam Taifun B	H	249
	Gallup Super 360	H	187
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Glyphomax 480	H	214
	Kyleo	H	219
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Nuance 75 WG	H	230
	Ouragan System 4	H	233
	Rosate 360 TF	H	187
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Roundup Quick	H	243
	Taifun B	H	249
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
	Zypar	H	255
Magones	Serenade Aso	F	299
Mandarīni	Banarg	AR	48
Mežmalas	Accurate 200 WG	H	181
	Nuance 75 WG	H	230
	Zypar	H	255
Ozoli	Candit	F	88
	NeemAzal-T/S	I/A	274, 275
Papuves	Banvel 4S	H	186
	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Emin dārzam Taifun B	H	249
	Fusilade Forte 150 EC	H	211
	Gallup Super 360	H	187
	Glifomaks Plus š.k.	H	213

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTO AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU SARAKSTS

1	2	3	4
	Glyphomax 480	H	214
	Kyleo	H	219
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Ouragan System 4	F	233
	Rosate 360 TF	H	187
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Taifun B	H	249
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187
Platību sagatavošana kultūraugu audzēšanai	Roundup 60	H	238
	Roundup B	H	238
	Roundup G	H	241
Platības, kuras piesārņotas ar Japānas sūreni	Roundup B	H	238
	Roundup G	H	241
Platības, kur augi netiek audzēti lietošanai pārtikā	Roundup Gel	H	242
	Roundup Gel Max	H	242
Plāvas	Agroksons 75 š.k.	H	184
	Ariane S	H	184
	Estets 600 e.k.	H	203
	MCPA 750	H	225
	MCPA Super 500 š.k.	H	226
	Nufarm MCPA 750 š.k.	H	231
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Detia Wühlmausgas	R	291
Podi, konteineri	Nemasys H	Dz	317
	Nemasys L	Dz	317
Prosa	Granprotec	I	267
Sēnes (segtās platībās)	Mirage	F	134
	Steinernema sistēma	Dz	320
Sorgo	Granprotec	I	267
Tirumu apstrāde pēc zālāju sēklu lauku novākšanas	Glyphomax 480	H	214
Tirumi pēc ražas novākšanas	Barbarian Biograde 360 š.k.	H	187
	Barbarian Hi-Aktiv š.k.	H	189
	Barbarian Super 360	H	187
	Clinic Up	H	187
	Emin dārzam Taifun B	H	249
	Gallup Super 360	H	187
	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Glyphomax 480	H	214
	Kyleo	H	219
	Landmaster 360 TF	H	187
	Monosate G	H	187
	Ouragan System 4	H	233
	Rosate 360 TF	H	187
	Roundup Flex	H	239
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
	Roundup Ultra	H	244
	Taifun B	H	249
	Vagta	H	189
	Varvar	H	187

1	2	3	4
Tirumi pirms graudaugu un kukurūzas sējas	Kyleo	H	219
Tirumi pirms kultūrauga dīgšanas/pēc sējas	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Glyphomax 480	H	214
Tirumi pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas	Glifomaks Plus š.k.	H	213
	Glyphomax 480	H	214
	Roundup Flick	H	240
	Roundup PowerMax	H	242
Virsmas, tara, darbariki, iekārtas	Menno Florades	Dez	59
Zemes zem elektrolīniju pārvadiem	Accurate 200 WG	H	181
	Nuance 75 WG	H	230
	Zypar	H	255
FUMIGĀCIJA			
Apāļie kokmateriāli (zāgbaļķi, finierklūči, papīrmalka, stabi, mieti, malka)	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Auzas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	279
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	280
Dārza pupiņas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Graudi kuģu tilpnēs (kvieši, mieži, rudzi, auzas, tritikāle, kukurūza)	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Griķi	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Iesaiņojamie materiāli	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Iesaiņoti pārtikas produkti	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Kafijas pupiņas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Kakao pupiņas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Kaltēti augi	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Kaltētas sēnes	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Kokvilna ķipās un saiņos	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Koksnes un kokmateriālu izstrādājumi	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Kukurūza	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Kūdra	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Kvieši	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	279

1	2	3	4
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	280
Linsekļas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Lupīna	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Mieži	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	279
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	280
Mulča (sasmalcināta koku miza, koksne)	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Prosa	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	279
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	280
Pupas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Rapsis	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Rieksti	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Rīsi	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Rudzi	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	279
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	280
Saulespuķu sēkla	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277

1	2	3	4
Soja	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Sorgo	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	279
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	280
Starplikas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Šķelda	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Tabaka (iesaiņota)	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Triticāle	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	279
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	280
Tukšas noliktavu telpas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Zāgmateriāli	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Zālaugu sēklas	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Zirņi	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
	Quickphos pellets 56 GE	I/A	279
	Quickphos tablets 56 GE	I/A	280
Žāvēti augļi	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	277
Žāvēti dārzeņi	MAGTOXIN TABLET	I/A	270
	PHOSTOXIN TABLET	I/A	270

LATVIJAS TĪRUMOS IZPLATĪTĀKĀS NEZĀLES

ĪSMŪŽA DIVDĪGLĻAPJU NEZĀLES

VIENGADĪGĀS UN EFEMĒRĀS

Aklis, asais	<i>Galeopsis tetrahit</i>
Aklis, platlapu	<i>Galeopsis ladanum</i>
Aklis, raibais	<i>Galeopsis speciosa</i>
Aklis, šķeltais	<i>Galeopsis bifida</i>
Amarants, liektais	<i>Amaranthus retroflexus</i>
Balanda, baltā	<i>Chenopodium album</i>
Balanda, daudzsēklu	<i>Chenopodium polyspermum</i>
Balodene, izplestā	<i>Atriplex patula</i>
Dievkrēsliņš, saules	<i>Euphorbia helioscopia</i>
Gaurs, tīruma	<i>Spergula arvensis</i>
Kumelīte, maura	<i>Matricaria discoidea</i>
Madara, ķeraiņu	<i>Galium aparine</i>
Madara, neīstā	<i>Galium spurium</i> subsp. <i>Vaillantii</i>
Matuzāle, ārstniecības	<i>Fumaria officinalis</i>
Mikstpiene, dārza	<i>Sonchus oleraceus</i>
Naktene, melnā	<i>Solanum, nigrum</i>
Nātre, kodīgā	<i>Urtica urens</i>
Pavirza, tīruma	<i>Anagallis arvensis</i>
Pērkone, tīruma	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Sīkgalvīte, īsstaru	<i>Galinsoga parviflora</i>
Sinepe (zvēre), tīruma	<i>Sinapis arvensis</i>
Sunītis, trejdaivu	<i>Bidens tripartita</i>
Sūrene, blusu	<i>Polygonum persicaria</i>
Sūrene, maura	<i>Polygonum aviculare</i>
Sūrene mazā	<i>Polygonum minus</i>
Sūrene, mezglainā	<i>Polygonum lapathifolium</i>
Vanagzirnīšs, četršķēklu	<i>Vicia tetrasperma</i>
Veronika, lauka	<i>Veronica agrestis</i>
Vējagriķis	<i>Fallopia convolvulus</i>
Virza, parastā	<i>Stellaria media</i>

ZIEMOTSPĒJĪGĀS

Aitene, tīruma	<i>Lycopsis arvensis</i>
Atrairnīte (vijolīte), tīruma	<i>Viola arvensis</i>
Atrairnīte (vijolīte), trejkrāsu	<i>Viola tricolor</i>
Dievkrēsliņš, saules	<i>Euphorbia helioscopia</i>
Grābeklīte, velnarutku	<i>Erodium cicutarium</i>
Ilzīte, lauku	<i>Anthemis arvensis</i>
Krustaine, parastā	<i>Senecio vulgaris</i>
Kumelīte, tīruma (nesmaržīgā)	<i>Matricaria inodora</i>
Magone, lauka	<i>Papaver dubium</i>
Naudulis, tīruma	<i>Thlaspi arvense</i>
Neaizmirstule, tīruma	<i>Myosotis arvensis</i>
Panātre, sārtā	<i>Lamium purpureum</i>
Panātre, skaujošā	<i>Lamium amplexicaule</i>
Pērkonene, parastā	<i>Erysimum cheiranthoides</i>
Plikstiņš, ganu	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Rudzupuķe, parastā	<i>Centaurea cyanus</i>
Salātene, parastā	<i>Lapsana communis</i>
Spulgotne, baltā	<i>Melandrium album</i>
Veronika, efejlapu	<i>Veronica hederifolia</i>
Veronika, persijas	<i>Veronica persica</i>
Veronika, tīruma	<i>Veronica arvensis</i>
Virza, parastā	<i>Stellaria media</i>
Vīķis, četršķlu	<i>Vicia tetrasperma</i>
Vīķis, smilts	<i>Vicia villosa</i>
Vīķis, spilvainais	<i>Vicia hirsuta</i>
Vīķis, šaurlapu	<i>Vicia angustifolia</i>

DIVGADĪGĀS

Burkāns, savvaļas	<i>Daucus carota</i>

DAUDZGADĪGĀS DIVDĪĢĻLAPJU NEZĀLES

Ceļteka, lielā	<i>Plantago major</i>
Ceļteka, šaurlapu	<i>Plantago lanceolata</i>
Cūkpiene, ārstniecības	<i>Taraxacum officinale</i>
Gārša, parastā	<i>Aegopodium podagraria</i>
Gundega, kodīgā	<i>Ranunculus acris</i>
Gundega, ložņu	<i>Ranunculus repens</i>
Latvānis, Sosnovska	<i>Heracleum sosnowskyi</i>
Māllēpe, parastā	<i>Tussilago farfara</i>

Mētra, tīruma	<i>Mentha arvensis</i>
Mīkstpiene, tīruma	<i>Sonchus arvensis</i>
Nātre, lielā	<i>Urtica dioica</i>
Pelašķis, parastais	<i>Achillea millefolium</i>
Pīpene, parastā	<i>Leuchanthemum vulgare</i>
Retējs, maura	<i>Potentilla anserina</i>
Sārmene, purva	<i>Stachys palustris</i>
Skābene, blīvā	<i>Rumex confertus</i>
Skābene, cirtainā	<i>Rumex crispus</i>
Skābene, mazā	<i>Rumex acetosella</i>
Skābene, struplapu	<i>Rumex obtusifolius</i>
Tītenis, tīruma	<i>Convolvulus arvensis</i>
Usne, tīruma	<i>Cirsium arvense</i>
Viķis, vanagu	<i>Vicia cracca</i>
Vēlpiene, rudens	<i>Leontodon autumnalis</i>
Vibotne, parastā	<i>Artemisia vulgaris</i>
Zvērene, lokaugļu	<i>Barbarea arcuata</i>

KOSU KLASĒS DAUDZGADĪGĀS NEZĀLES

Kosa, tīruma	<i>Equisetum arvense</i>

ĪSMŪŽA VIENDĪGĻLAPJU NEZĀLES

Airene, daudziedu	<i>Lolium multiflorum</i>
Airene, linu	<i>Lolium remotum</i>
Airene, reibuma	<i>Lolium temulentum</i>
Gaiļšāre, parastā	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Lāčauza, rudzu	<i>Bromus secalinus</i>
Lāčauza, mīkstā	<i>Bromus mollis</i>
Rudzusmilga, parastā	<i>Apera spica-venti</i>
Sarene, zaļā	<i>Setaria viridis</i>
Sarene, zilganā	<i>Setaria glauca</i>
Skarene, maura	<i>Poa annua</i>
Vējauza	<i>Avena fatua</i>

DAUDZGADĪGĀS VIENDĪGĻLAPJU NEZĀLES

Airene, daudzgadīgā	<i>Lolium perenne</i>
Skarene, parastā	<i>Poa trivialis</i>
Skarene, pļavas	<i>Poa pratensis</i>
Vārpata, ložņu	<i>Elytrigia repens</i>

Stājās spēkā: 13.01.1999.

Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 388/399 (1449/1460), 30.12.1998.,

"Ziņotājs", 2, 28.01.1999.

Grozījumi:

- 11.03.2004. likums/LV, 47 (2995), 25.03.2004./Stājas spēkā 01.05.2004.
- 12.05.2005. likums/LV, 85 (3243), 31.05.2005./Stājas spēkā 14.06.2005.
- 02.11.2006. likums/LV, 183 (3551), 15.11.2006./Stājas spēkā 01.01.2007.
- 17.07.2008. likums/LV, 116 (3900), 30.07.2008./Stājas spēkā 01.07.2009.
- 09.10.2008. likums/LV, 164 (3948), 22.10.2008./Stājas spēkā 23.10.2008.
- 04.03.2010. likums/LV, 43 (4235), 17.03.2010./Stājas spēkā 31.03.2010.
- 13.10.2011. likums/LV, 173 (4571), 02.11.2011./Stājas spēkā 03.11.2011.
- 07.11.2019. likums / LV, 235, 21.11.2019. / Stājas spēkā 05.12.2019.

AUGU AIZSARDZĪBAS LIKUMS

Redakcija:[01.01.2020]

**I NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI****1.pants. Likumā lietotie termini**

Likumā ir lietoti šādi termini:

- 1) **augi** — dzīvi augi un dzīvas augu daļas (dārzeni, bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi, griezti ziedi, zari ar lapām, nozāgēti koki ar lapotni, lapas, lapotne, augu audu kultūras, ziedputekšņi, potzari, spraudeņi, dzinumi, sēklas), izņemot sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;
- 2) **augu produkti**:
 - a) neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti) augu valsts izcelsmes produkti,
 - b) augu daļas, ieskaitot augļus un sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;
- 3) **augu aizsardzības līdzeklis** — produkts, kurā ir darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģisti vai kurš sastāv no tām un kurš paredzēts kādam no šādiem lietojumiem:
 - a) augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes nepieļaušanai, ja vien līdzekļa galvenais mērķis ir augu vai augu produktu aizsardzība, nevis higiēnas nodrošināšana,
 - b) augu dzīvības procesu ietekmēšanai, piemēram, ar vielām, kas ietekmē augšanu un nav barības vielas,
 - c) augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus),
 - d) nevēlamu augu vai augu daļu (izņemot aļģes) iznīcināšanai, ja vien līdzekli nelieto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai,
 - e) nevēlamu augu (izņemot aļģes) augšanas apturēšanai vai novēršanai, ja vien līdzekli neizmanto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai;
- 4) **augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas** — jebkuras iekārtas, kas ir īpaši paredzētas augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, kā arī šo iekārtu efektīvai darbībai vajadzīgie piederumi, piemēram, sprauslas, manometri, filtri, sieti, tvertņu tīrīšanas ierīces;
- 5) **augu aizsardzības konsultants** — persona, kura kā komercpakalpojumu sniedz konsultācijas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un ir ieguvusi apliecību par tiesībām sniegt šādas konsultācijas;
- 6) **augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs** — persona, kura augu aizsardzības līdzekļu izplatītāja uzdevumā tirdzniecības vietā pirms augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas sniedz pircējam augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū regulējošos normatīvajos aktos minētajā kārtībā informāciju par augu aizsardzības līdzekli un ir ieguvusi augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību;
- 7) **augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators** — persona, kas veic darbības ar pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, augu aizsardzības līdzekļus lieto, atšķaida, gatavo to maisījumus) un ir ieguvusi apliecību par tiesībām veikt šādas darbības;
- 8) **dzīvie organismi** — kukaiņi, ērces, nematodes, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā un paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes nepieļaušanai;
- 9) **integrētā augu aizsardzība** — visu pieejamo augu aizsardzības paņēmieni rūpīga izvērtēšana un tādu atbilstošu paņēmieni lietošana, kuri novērš kaitīgo organismu populāciju vairošanos, vienlaikus saglabājot augu aizsardzības līdzekļu un citu ietekmes formu lietošanu ekonomiski un ekoloģiski pamatotā līmenī, samazinot vai minimalizējot risku cilvēka veselībai un videi. Integrētā augu aizsardzība paredz veselīgu kultūraugu audzēšanu ar iespējami mazāku nelabvēlīgo ietekmi uz agroekosistēmām un veicina kaitīgo organismu ierobežošanas dabisku mehānismu izmantošanu;
- 10) **izsmidzināšana no gaisa** — augu aizsardzības līdzekļu lietošana, izmantojot lidaparātus;
- 11) **invazīvo augu suga** — Latvijas dabai neraksturīga

suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu cilvēka veselībai vai videi;

- 12) **kaitīgie organismi** — dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes kaitīgie organismi (vīrusi, mikoplazma vai citi patogēni), kas apdraud augus vai augu produktus;
- 13) **profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs** — persona, kas savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus no gaisa un ir ieguvusi apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus. (13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Grozījumi 5., 6. un 13.punktā stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir reglamentēt fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu ieviešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā un Eiropas Savienībā, kā arī panākt, lai augu aizsardzības pasākumi un augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, to sugu dzīvniekiem, kurus cilvēks audzē vai izmanto uzturā, un vidi, novērst augu aizsardzības līdzekļu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām. (11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

3.pants. Augu aizsardzība

- (1) Augu aizsardzība ir tiesisko, tehnisko, organizatorisko un praktisko pasākumu kopums, kas veicams, lai izpētītu augiem kaitīgo un konkurējošo organismu bioloģiskos un ekoloģiskos faktorus, noteiktu un īstenotu šo organismu izplatības ierobežošanu un apkarošanu.
- (2) Augu aizsardzību valstī pārziņā Zemkopības ministrija.

II NODAĻA

VALSTS INSTITŪCIJU KOMPETENCE AUGU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

4.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi

- (1) Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un veic Valsts augu aizsardzības dienests, kas ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešā pārvaldes iestāde.
- (2) Valsts augu aizsardzības dienestu vada direktors. Kontroles funkcijas augu aizsardzības jomā veic dienesta inspektori.
- (3) Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevums ir laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos, prognozēt to attīstību, noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās, kā arī veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu

vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi.

- (4) Valsts augu aizsardzības dienests savu uzdevumu veikšanai:

- 1) pilda kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (turpmāk — regula Nr. 1107/2009), 3.panta 30.punktu;
- 2) izveido un kārtot to personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību, ieviešanu un izvešanu;
- 3) izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;
- 4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lietošanu, izvešanu, uzglabāšanu un transportēšanu;
- 5) veic augu pārbaudes, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;
- 6) veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;
- 7) izsniedz atļauju kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanai vai pārvietošanai zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām;
- 8) pilda references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, laboratoriski diagnosticē augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, apstiprina citas laboratorijas konstatētu augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu un pēc pieprasījuma sniedz laboratoriskus pakalpojumus;
- 9) veic kaitīgo organismu riska analīzi;
- 10) izsniedz sertifikātu par tiesībām veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus;
- 11) ievieš, izpilda, uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas lēmumus augu aizsardzības jomā;
- 12) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, izveido un uztur datubāzi par invazīvo augu sugu izplatību;
- 13) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli.;

- 14) izsniedz speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
- 15) sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa;
- 16) uzrauga koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, sertifikēšanu un apriti, kārtu koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistru, pieņem lēmumu par personas iekļaušanu koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā un izsniedz atļauju sertificēt koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi;
- 17) kārtu un uztur kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu.
- (5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem, veicot uzraudzību un kontroli, ir šādas tiesības:
 - 1) pārbaudīt, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības augu aizsardzības jomā;
 - 2) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt personas, kuras darbojas augu aizsardzības jomā, pieprasīt un saņemt dokumentus un informāciju, kā arī ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai.
- (6) Valsts augu aizsardzības dienests apkopo un izplata tehnisko informāciju par kaitīgajiem organismiem, izstrādā ieteikumus par to izplatības ierobežošanas un apkarošanas pasākumiem, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp valstīm augu aizsardzības jomā un informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām.
- (7) Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu eksperti kopā ar Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonām var veikt kontroli augu aizsardzības jomā Latvijā.
- (8) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- (9) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par fitosanitārā pasākuma piemērošanu un augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu vai aizliegšanu izpildāms nekavējoties. Dienesta direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.
- (10) Iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei vai pieteikuma iesniegšana tiesai, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitārā pasākuma piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.
- (11) Ja rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienesta direktors ir tiesīgs noteikt fitosanitāros pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanu,

audzēšanu vai pārvietošanu. Lēmumu par minētajiem fitosanitārajiem pasākumiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Argrozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004., 02.11.2006., 04.03.2010. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011. Ceturtās daļas 1. un 4.punkta jaunā redakcija, kā arī 15.punkts stājas spēkā 26.11.2011. Sk. Pārejas noteikumu 18.punktu)

5.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

- 1) noteikumus par augu karantīnu, nosakot fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievadēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamās fitosanitāros pasākumus, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, kārtību, kādā sniedzama informācija Eiropas Komisijai, un robežkontroles punktu minimālo aprikojumu fitosanitārās kontroles veikšanai;
- 2) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ievērojot regulu Nr. 1107/2009;
- 3) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;
- 4) (izslēgts ar 13.10.2011. likumu);
- 5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un glabāšanu, tajos reglamentējot augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un glabāšanas prasības, integrētās augu aizsardzības principus un prasības, profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru pienākumus un tiesības, kārtību, kādā sagatavojams novērtējums par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku, kādā izsniedzama atļauja augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa, speciālos ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzības pasākumus;
- 6) (izslēgts ar 13.10.2011. likumu);
- 7) noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;
- 8) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakojšanu un marķēšanu;
- 9) noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai;

- 10) noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ieviešanu vai pārvietošanu;
- 11) noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;
- 12) noteikumus par kārtību, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai un maksā valsts nodevu par to izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī par valsts nodevas apmēru;
- 13) noteikumus par atsevišķu karantīnas organismu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtību;
- 14) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem;
- 15) noteikumus par invazīvo augu sugas latvāņa (*Heracleum sosnowskyi* Manden) (turpmāk — latvānis) ierobežošanas pasākumiem, kā arī iznīcināšanas kārtību un metodēm, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par latvāņa izplatību zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par sugas izplatību, kā arī par darba aizsardzības prasībām, veicot ierobežošanas pasākumus;
- 16) noteikumus par invazīvo augu sugu sarakstu;
- 17) noteikumus par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas kārtību, par kārtību, kādā invazīvo augu suga tiek iekļauta invazīvo augu sugu sarakstā, par kārtību, kādā tiek veikts invazīvo augu sugu monitorings, valsts uzraudzība un kontrole, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par invazīvo augu sugu izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par invazīvo augu sugu izplatību, kā arī noteikumus par valsts institūciju, kas kontrolē Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu ieviešanu uz valsts robežas, un kārtību, kādā veic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus, konkrētu invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumus un metodes un, ja nepieciešams, darba aizsardzības prasības;
- 18) noteikumus par kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi, nosakot augu karantīnas un kaitīgos organismus, par kuru apkarošanu un izplatības ierobežošanu maksājama kompensācija, tās apmēru un izmaksas kārtību;
- 19) noteikumus par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem un šā materiāla aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai pavairošanas materiāls ir vīrusbrīvs vai vīrustestēts;
- 20) noteikumus par kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, reglamentējot laboratorijas funkcijas un pienākumus, kārtību, kādā tā atzīst citu laboratoriju tiesības diagnosticēt augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, un šo laboratoriju uzraudzības kārtību;
- 21) noteikumus par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību, reglamentējot kārtību, kādā izsniedzama atļauja apmācības veikšanai, prasības atļaujas saņemšanai, apmācības kārtību, mācību programmas saturu, pārbaudījumu un apliecības izsniegšanas kārtību;
- 22) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, reglamentējot šo iekārtu pārbaudes veikšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtību, prasības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, izņēmumus attiecībā uz pārbaudēm, citu Eiropas Savienības dalībvalstu izsniegto sertifikātu atzīšanas kārtību, pārbaudes termiņus;
- 23) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, reglamentējot prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ieviešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, kārtību, kādā sniedzama informācija augu aizsardzības līdzekļa pircējam, un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;
- 24) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un kārtību, kādā tie piemērojami koksnes iepakojamā materiāla aizsardzībai, reglamentējot šo pasākumu veikšanas un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas kārtību, piemērojamus izņēmumus, kārtību, kādā veicama un anulējama reģistrācija koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā, koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes sertifikācijas noteikumus un kārtību, kādā sertifikācijas institūcijai izsniedz un anulē atļauju veikt koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikāciju, kā arī fitosanitāropasākumu veikšanas, koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas un sertifikācijas uzraudzības kārtību.

(Argrozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004., 12.05.2005., 02.11.2006., 09.10.2008., 04.03.2010. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011. 5.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 26.11.2011. Sk. Pārejas noteikumu 18.punktu)

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā apstiprina konkrētu Latvijā audzējamu kultūraugu audzēšanas vadlīnijas, ievērojot integrētās augu aizsardzības principus.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

III NODAĻA AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI UN PASĀKUMI

7.pants. Augu aizsardzības līdzekļi

- (1) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū, lietot un uzglabāt saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009. Augu aizsardzības līdzekļu reģistru kārtoti Valsts augu aizsardzības dienests.
- (2) Iesniegumu augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanai reģistrā iesniedz persona, kura ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa pirmreizēju izplatīšanu Latvijā, vai tās pilnvarota persona (turpmāk — reģistrācijas pieteicējs). Reģistrācijas pieteicējam ir juridiskā adrese Eiropas Savienības teritorijā. Par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (3) Lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā Valsts augu aizsardzības dienests pieņem viena gada laikā no dienas, kad reģistrācijas pieteicējs iesniedzis dokumentus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma sagatavošanu.
- (4) Iekļaujot augu aizsardzības līdzekļus reģistrā, tiem nosaka trīs reģistrācijas klases.
- (5) Uz pirmās un otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem attiecas šādi ierobežojumi:
 - 1) tos atļauts lietot profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoram vai augu aizsardzības konsultantam;
 - 2) tos atļauts iegādāties profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam vai augu aizsardzības konsultantam.
- (6) Trešās klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst iegādāties un lietot visas personas.
- (7) Augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs nodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā ir pārdevējs, kurš ieguvis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību.
- (8) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic juridiskā persona, kura profesionālo

augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju.

- (9) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apliecības izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.
- (10) Valsts augu aizsardzības dienests jebkurai ieinteresētajai personai nodrošina iespēju saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu, vispārēju informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, ar to lietošanu saistītajiem riskiem, augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas alternatīvām, kas nav saistītas ar ķīmisku vielu lietošanu, un reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu. Informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru Valsts augu aizsardzības dienests publicē savā mājaslapā internetā.

(11.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.2006. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011. Piektās, sestās, astotās un devītās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 19.punktu)

8.pants. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un lietošana

- (1) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītāji — komersanti, kas saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izdotu speciālo atļauju (licenci).
- (2) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū vai lietot, ja tie ir klasificēti, iepakoti un marķēti augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakojumu un marķēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un iepakoti oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu latviešu valodā.
- (3) Nav atļauts laist tirgū vai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam. Ja rodas šaubas vai aizdomas par augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram ir tiesības ņemt augu aizsardzības līdzekļa paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei.
- (4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja rodas šaubas par to kvalitāti, — apturēt šo līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu līdz galīgai kvalitātes noskaidrošanai. Šādā gadījumā lēmums pieņemams ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad apturēta augu aizsardzības līdzekļa laišana tirgū vai lietošana.

- (5) Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti lietotājiem.
- (6) Augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš, atļauts laist tirgū, ja tā paraugs atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Paraugš tiek ņemts, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā pēc analīžu saņemšanas no akreditētās laboratorijas lemj par turpmāko rīcību ar šādu līdzekli. Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 26.11.2011. Sk. Pārejas noteikumu 18.punktu)

9.pants. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

- (1) Komersanti, kas minēti šā likuma 8.panta pirmajā daļā, nodrošina:
 - 1) augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā un to marķējumā norādītajos apstākļos, turklāt atsevišķi no citiem produktiem un vielām, kas var ietekmēt attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa īpašības;
 - 2) to augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu atsevišķi, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.
- (2) Šā panta pirmajā daļā minētajām augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām izvirzāmās tehniskās prasības nosaka Ministru kabinets.
- (3) Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu, kas stājas spēkā 14.06.2005.)

10.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

- (1) Persona augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot norādes marķējumā, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktos labas augu aizsardzības prakses principus (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā) un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos integrētās augu aizsardzības principus un prasības visos tajos paredzētajos gadījumos.
- (2) Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma persona sniedz informāciju par kaitīgo organismu parādīšanos, izplatību,

īstenotajiem to apkarošanas pasākumiem un lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

- (3) Augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšana no gaisa ir atļauta augu aizsardzības līdzekļu lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- (4) Lietošanai nederīgos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Ar šīm darbībām saistītās izmaksas sedz ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu īpašnieks.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 26.11.2011. Sk. Pārejas noteikumu 18. un 21.punktu)

11.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

- (1) Atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.
- (2) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic reizi trijos gados.
- (3) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām. Jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic pēc pieciem gadiem no to iegādes brīža.
- (4) Valsts augu aizsardzības dienests uzrauga augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes un izmantošanu.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011. Grozījumi pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi) un ceturtajā daļā stājas spēkā 26.11.2016. Sk. Pārejas noteikumu 22.punktu)

IV NODAĻA AUGU KARANTĪNA UN PASĀKUMI

12.pants. Augu karantīna

- (1) Augu karantīna jeb fitosanitārija ir valsts organizētu pasākumu kopums, kas veicams, lai nodrošinātu augu aizsardzību, neļaujot ievest un izplatīt augu karantīnas organismus un citus augiem sevišķi bīstamus organismus, kuri nav sastopami vai ir ierobežoti izplatīti un kuriem piemērojami fitosanitārie pasākumi.
- (2) Valsts augu aizsardzības dienests veic fitosanitāro kontroli vai tā uzraudzībā tiek veikta šī kontrole, lai noskaidrotu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību fitosanitārajām normām, un, ja nepieciešams, nosaka fitosanitāros pasākumus, lai novērstu augu karantīnas organismu ieviešanu, ieviešanos un izplatīšanos.
- (3) Ja valsts teritorijā rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienests var ierosināt zemkopības ministram

noteikt fitosanitāros pasākumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievēšanai, audzēšanai un pārvietošanai.

- (4) Personai ir pienākums nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu vai simptomu parādīšanos.
- (5) Valsts augu aizsardzības dienests izstrādā ilgtermiņa programmu noteiktu kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai.
- (6) Persona var saņemt kompensāciju par tai uzdoto fitosanitāro pasākumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kompensācija tiek maksāta no valsts budžeta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

13.pants. Personu reģistrācija

- (1) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ievēšanu, tirdzniecību, eksportu un pārvietošanu valsts iekšienē, reģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā. Par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu aprītē iesaistīto personu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (2) Reģistrēto personu pienākums ir:
 - 1) glabāt ar augiem un augu produktiem saistīto dokumentāciju un pēc pieprasījuma uzrādīt to Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem;
 - 2) vizuāli pārbaudīt augus un augu produktus un par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu vai simptomu parādīšanos nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu;
 - 3) ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti;
 - 4) nodrošināt iespēju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem piekļūt īpašumam, kurā tiek audzēti vai glabāti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, un kontrolēt fitosanitāro pasākumu izpildi;
 - 5) informēt Valsts augu aizsardzības dienestu par izmaiņām reģistrā iekļautajā informācijā;
 - 6) nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienestam nepieciešamo rakstveida informāciju par augu un augu produktu audzēšanas, ražošanas un uzglabāšanas vietām.
- (3) Valsts augu aizsardzības dienests ne retāk kā reizi gadā kontrolē, kā reģistrētās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības

attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 02.11.2006. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

14.pants. Augu un augu produktu ievēšana

- (1) Eiropas Savienībā un valstī aizliegts ievest augu karantīnas organismus, kā arī augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja tie neatbilst fitosanitārajām normām, kā arī tad, ja nav attiecīgu dokumentu.
- (2) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievēšanu, nodrošina apstākļus fitosanitārās kontroles veikšanai.
- (3) Pāri muitas robežai ievedamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu muietošanu var pabeigt tikai pēc to fitosanitārās kontroles.
- (4) Atsevišķos gadījumos Valsts augu aizsardzības dienests var pakļaut fitosanitārajai kontrolei arī citus augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja pastāv augsta augu karantīnas organismu ievēšanas riska iespēja.
- (5) Ja fitosanitārās kontroles rezultātā konstatēta augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstība fitosanitārajām normām, attiecībā uz tiem veic vienu no šādiem pasākumiem:
 - 1) nosūta atpakaļ attiecīgajai valstij vai izņem no kravas inficētu vai invadētu produkciju, pārējo kravas daļu atļauj ievest, ja tiek nodrošināts, ka nepastāv kaitīgā organisma izplatīšanās draudi;
 - 2) iznīcina Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktajā kārtībā;
 - 3) novieto muitas kontrolē līdz brīdim, kamēr ievēdējs veic Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus.
- (6) Šā panta piektajā daļā minēto pasākumu izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Šo pasākumu izmaksas sedz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievēdējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (7) Zemkopības ministra noteiktā ievestā pavairojamā materiāla fitosanitārā kontrole notiek tā uzglabāšanas vai audzēšanas vietās. Šādu pavairojamo materiālu atļauts izplatīt vai pārvietot tikai pēc tam, kad Valsts augu aizsardzības dienests pieņemis lēmumu par tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

15.pants. Augu un augu produktu tranzīts

- (1) Ja augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava tiek vesta tranzītā

cauri valsts teritorijai, šo kravu nesadalot, nepārsaiņojot, neuzglabājot un nodrošinot, ka nerodas iespēja ar to inficēt valsts teritoriju vai tai valsts teritorijā inficēties ar augu karantīnas organismiem, attiecīgo kravu nepakļauj fitosanitārajai kontrolei.

- (2) Fitosanitārā kontrole tiek veikta, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tranzītkrava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un ir iespējama to izplatīšanās, kā arī tad, ja netiek ievēroti šā panta pirmās daļas noteikumi.

16.pants. Augu un augu produktu izvešana (eksports) un atpakaļizvešana (reeksports)

- (1) Izvedamiem un atpakaļizvedamiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem jāatbilst saņēmējas valsts fitosanitārajiem noteikumiem.
- (2) Personas, kas nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu un atpakaļizvešanu, vismaz 48 stundas pirms nosūtīšanai paredzētās kravas sagatavošanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par fitosanitārās kontroles nepieciešamību.
- (3) Pēc fitosanitārās kontroles veikšanas Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz fitosanitāro sertifikātu izvešanai vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai, ja augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava atbilst saņēmējas valsts vai tranzītvalsts fitosanitārajiem noteikumiem.
- (4) Aizliegts izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez fitosanitārajiem dokumentiem, ja to nepieciešamību paredz saņēmējas valsts fitosanitārie noteikumi.
- (5) Ja importētājvalsts normatīvie akti paredz, ka koksnes iepakojamais materiāls marķējams saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu Nr.15 "Vadlinijas koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijai starptautiskajā tirdzniecībā", fitosanitāros pasākumus veic un koksnes iepakojamo materiālu marķē koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā iekļauta persona. Iepakojamā materiāla termisko apstrādi veic persona, kas ir sertificēta kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par fitosanitārajiem pasākumiem koksnes iepakojamam materiālam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.2006. un 13.10.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

17.pants. Augu un augu produktu iekšzemes aprīte

- (1) Aizliegts izplatīt un pārvietot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas inficēti ar augu karantīnas organismiem, kā arī augus un augu produktus, kuri neatbilst fitosanitārajiem normām.

- (2) Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda augus un augu produktus, analizē kaitīgo organismu ieviešanās vai izplatīšanās risku un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniedz ierosinājumu Eiropas Komisijai atzīt par aizsargājamo zonu visu Latvijas teritoriju vai tās daļu, kurā eksistencei piemērotos apstākļos nav ieviesušies un izplatījušies viens vai vairāki noteikti kaitīgie organismi, bet pastāv draudi, ka šiem organismiem labvēlīgos ekoloģiskos apstākļos tie var ieviesties un izplatīties.

- (3) Valsts augu aizsardzības dienests veic augaugļu, dekoratīvo kultūru un dārzeņu pavairojamā materiāla sertifikācijas uzraudzību un izsniedz atbilstības dokumentus.

- (31) Augļu koku pavairošanas materiāla vīrustestēšanu veic persona, kuru dienests atzinis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

- (4) Ja konstatēta augu karantīnas organismu klātbūtne, personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora norādījumiem veic attiecīgo augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu dezinfekciju vai dezinfekciju un ievēro augu un augu produktu aprītei noteiktos ierobežojumus.

- (5) Augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu uzglabāšanu un pavairošanu, kā arī darbības, kas saistītas ar šo organismu ģenētisko modifikāciju, drīkst veikt tikai fitosanitārās pētniecības vai diagnosticēšanas mērķiem pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu.

- (6) Kaitīgo organismu masveida izplatīšanās (epifitotijas) gadījumā augu aizsardzības pasākumus veic saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

- (7) Lai izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus Latvijā un Eiropas Savienībā, augiem un augu produktiem pievieno augu pasi, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību fitosanitārajiem prasībām.

- (8) Kaitīgos organismus, augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām ievieš vai pārvieto, ja saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. un 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

18.pants. Kontrole un uzraudzība pār augu un augu produktu aprīti

- (1) Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprīti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo

- priekšmetu kontrolei uz valsts robežas Ministru kabinets var noteikt citu institūciju, kura ievēro Valsts augu aizsardzības dienesta norādījumus fitosanitārās kontroles veikšanā.
- (2) Veicot augu un augu produktu aprites uzraudzību un kontroli, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori:
- 1) pārbauda augus un augu produktus noliktavās, transportlīdzekļos un ražošanas telpās, kā arī zemes platības neatkarīgi no to apsaimniekošanas veida, īpašuma formas, gadalaika un citiem apstākļiem;
 - 2) nemaksājot atlīdzību personām, ņem augu un augu produktu, audzēšanas substrātu, sēklu un pavairojamā materiāla paraugus analizēm saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta direktora apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem;
 - 3) uzdod personām veikt augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apstrādi ar atbilstošiem augu aizsardzības līdzekļiem un dezinfekciju, ja konstatēti augu karantīnas organismi un augi un augu produkti neatbilst fitosanitārajām prasībām, kā arī uzdod lietot noteiktas ierīces, paņēmienus vai pārvietot augus un augu produktus uz zonām, kur tie neradīs papildu apdraudējumu, vai pārvietot augus un augu produktus uz rūpnieciskās pārstrādes vietām, kā arī nosaka augu audzēšanas un novākšanas kārtību, kontrolē šo pasākumu izpildi;
 - 4) aizliedz noteiktu sēklu sēšanu, augu stādīšanu un audzēšanu, ar kaitīgiem organismiem piesārņotu augšņu izmantošanu uz laiku vai pavisam, inficētu sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu, inficētu augu vai augu produktu transportēšanu un realizāciju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu ģenētiski modificēto organismu apriti;
 - 5) aizliedz vai nosaka ierobežojumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievēšanai, izvešanai un iekšzemes aprītei, ja konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 - 6) ja pārkāpti noteiktie fitosanitārie pasākumi un pastāv augu karantīnas organismu izplatības draudi, nepieciešamos fitosanitāros pasākumus veic piespiedu kārtā. Ar šiem pasākumiem saistītās izmaksas sedz pārkāpējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

IV¹ NODAĻA INVAZĪVO AUGU SUGU IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANA UN IZPLATĪBAS APZINĀŠANA

(Nodaļa 02.11.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)

18.1 pants. Invazīvo augu sugas un to izplatības ierobežošana

- (1) Invazīvo augu sugu var iekļaut invazīvo augu sugu sarakstā, ja šī suga ir iekļauta Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas apstiprinātajā invazīvo augu sugu sarakstā vai iesniedzot attiecīgu priekšlikumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (2) Latvijā aizliegts ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Ministru kabinets nosaka valsts institūciju, kas uz valsts robežas kontrolē invazīvo augu sugu ieviešanu.
- (3) Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemesīpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.
- (4) Valsts augu aizsardzības dienests veic invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli.
- (5) Invazīvo augu sugu iznīcināšana visās teritorijās, kurās tās izplatījušās, kā arī šīm teritorijām piegulošajās teritorijās uzsākama un veicama vienā sezonā. Par piegulošajām teritorijām uzskatāmas tādas teritorijas, kuras no apkārtējās teritorijas ir norobežotas ar dabiskiem šķēršļiem (ceļš, ūdenstece, mežs u.tml.), kas traucē minēto augu sugu tālāku izplatību.
- (6) Atsevišķu invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesaista vietējās pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai republikas pilsētas pašvaldība vai novada pašvaldība:
 - 1) pieņem lēmumu par Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumiem attiecīgās pašvaldības teritorijā un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";
 - 2) izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā iekļauj Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvi. Ekspertu grupa izstrādā attiecīgās pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu;
 - 3) sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un koordinē invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu īstenošanu, ja zemes īpašnieks vai valdītājs neveic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus.

- (7) Invazīvo augu sugu zinātniskiem un pētniecības mērķiem drīkst ievest vai audzēt, ja ir saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja normatīvajos aktos par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanu noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2008. un 17.07.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

18.2 pants. Invazīvo augu sugu izplatības apzināšana un datu apkopošana

- (1) Valsts augu aizsardzības dienests veic invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Informāciju par invazīvo augu sugu izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās Valsts augu aizsardzības dienestam sniedz valsts pārvaldes iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
- (2) Valsts augu aizsardzības dienests datus par invazīvo augu sugu izplatību apkopo datubāzē. Informācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir brīvi pieejama sabiedrībai.
- (3) Ikviens persona informē Valsts augu aizsardzības dienestu, ja tās rīcībā ir ziņas par invazīvo augu sugu izplatību.

V NODAĻA SADARBĪBA AUGU AIZSARDZĪBĀ

19.pants. Sadarbība augu aizsardzībā

- (1) Zinātniskās pētniecības institūcijas un citas personas, kas veic zinātniskos pētījumus, pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu veic pētījumus par augu karantīnas organismiem, augiem sevišķi bīstamiem organismiem un fitosanitārajiem pasākumiem minēto organismu izplatīšanās ierobežošanai.
- (2) Policija, valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz palīdzību normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes nodrošināšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.10.2008.)

VI NODAĻA ATBILDĪBA PAR LIKUMA NEIEVĒROŠANU

20.pants. Atbildība par likuma neievērošanu

- (1) Par šā likuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.
- (2) Par augu aizsardzības pasākumu neveikšanu, augu aizsardzības līdzekļu nolaidīgu lietošanu, nekvalitatīvu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, ar augu karantīnas organismiem inficētu augu un augu produktu tīšu izplatīšanu, kā rezultātā augu audzētājiem nodarīti zaudējumi vai radušies papildu izdevumi, vainīgās personas ir atbildīgas saskaņā ar Civillikumu.
- (3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā atbildība neatbrīvo personas no Valsts augu

aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu veikšanas.

- (4) (Izslēgta ar 11.03.2004. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

PĀREJAS NOTEIKUMI

1. Valsts augu aizsardzības dienests ir Valsts augu aizsardzības stacijas tiesību un saistību pārņēmējs.
 2. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.
 3. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais darbības termiņš un reģistrācijas nosacījumi.
 4. (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)
 5. (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)
 6. Ministru kabinets izdod līdz:
 - 1) 2004.gada 1.maijam noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;
 - 2) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
 - 3) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;
 - 4) 2004.gada 1.maijam noteikumus par ķīmisku augu aizsardzības līdzekļu un mikroorganismus un vīrusus saturošu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību;
 - 5) 2004.gada 1.maijam noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, augu aizsardzības līdzekļu ieviešanas un izvešanas kārtību, kā arī augu aizsardzības līdzekļu un neregistrētu augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli;
 - 6) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ieviešanu vai pārvietošanu;
 - 7) 2004.gada 1.jūlijam noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakojšanu un marķēšanu;
 - 8) 2004.gada 1.jūlijam noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus.
- (11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

7. Līdz 2004.gada 1.maijam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.
(11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)
8. Līdz 2004.gada 1.maijam reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais reģistrācijas termiņš un reģistrācijas nosacījumi.
(11.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)
9. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta 15. un 16.punktā minētos noteikumus.
(02.11.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)
10. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.maijam izdod šā likuma 5.panta 17.punktā minētos noteikumus.
(02.11.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2007.)
11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.decembrim izdod šā likuma 5.panta 18. un 19.punktā minētos noteikumus.
(09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)
12. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.decembrim izdod šā likuma 5.panta 20.punktā minētos noteikumus.
(09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)
13. Šā likuma 5.panta 20.punkts stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī.
(09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)
14. Šā likuma 12.panta sestajā daļā paredzētā kompensācija 2008.gadā tiek maksāta no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtajiem līdzekļiem.
(09.10.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.10.2008.)
15. Zemkopības ministrijas izdotās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.
(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)
16. Šā likuma 5.panta 12.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".
(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)
17. Līdz šā likuma 5.panta 12.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.470 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)
18. Grozījumi šā likuma 1.panta 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā, 4.panta ceturtais daļas 1., 4. un 15.punktā, 5.panta 5.punktā, 7.panta pirmajā, ceturtajā, septītajā un desmitajā daļā, 8. un 10.pantā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2011.gada 26.novembrī.
(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)
19. Grozījumi šā likuma 1.panta 5., 6. un 13.punktā, 7.panta piektajā, sestajā, astotajā un deviņtajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)
20. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punktā un 11.panta trešajā daļā attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi stājas spēkā 2012. gada 1.janvārī.
(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)
21. Šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētie integrētās augu aizsardzības principi un prasības piemērojamas no 2014.gada 1.janvāra.
(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)
22. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi) un ceturtajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2016.gada 26.novembrī.
(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)
23. Līdz 2016.gada 26.novembrim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudāmas vismaz vienu reizi.
(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)
24. Līdz 2020.gada 1.janvārim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaūžu starplaiks nepārsniedz piecus gadus.
(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)
25. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta 2.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.156 "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulu Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.
(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)
26. Ministru kabinets līdz 2011.gada 26.novembrim izdod šā likuma 5.panta 5., 21., 22., 23. un 24.punktā minētos noteikumus. Integrētās augu

aizsardzības principus un prasības Ministru kabinets izdod līdz 2014.gada 1.janvārim.

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

27. Grozījums šā likuma 4. panta devītajā daļā par tās papildināšanu ar teikumu un šā likuma VI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(07.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.12.2019. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.07.2020.)

INFORMATĪVA ATSAUCE UZ EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVĀM

(13.10.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2011.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

- 1) Komisijas 1992.gada 30.jūlija direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;
- 2) Komisijas 1992.gada 3.novembra direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu;
- 3) Komisijas 1995.gada 26.jūlija direktīvas 95/44/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām;
- 4) Padomes 1999.gada 31.maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakojšanu un marķēšanu;
- 5) Padomes 2000.gada 8.maija direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ieviešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;
- 6) Komisijas 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/61/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām (kodificētā versija);
- 7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ);
- 8) Padomes 2009.gada 26.novembra direktīvas 2009/143/EK, ar ko groza direktīvu 2000/29/EK attiecībā uz laboratorisko pārbaudi uzdevumu deleģēšanu.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents **G.Ulmanis**

Rīgā 1998.gada 30.decembrī

Stājās spēkā: 24.12.2011.

Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (4600), 23.12.2011.

Ministru kabineta noteikumi Nr.949

Rīgā 2011. gada 13. decembrī (prot. Nr.74 18.§)

Grozījumi:

- Ministru kabineta 04.10.2016. noteikumi Nr. 652/LV, 194 (5766), 06.10.2016./Stājās spēkā 07.10.2016.

NOTEIKUMI PAR AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LAIŠANU TIRGŪ

*Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5. panta
23. punktu un 9. panta otro daļu*

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI**1. Noteikumi nosaka:**

- 1.1. prasības augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvīrāmos kritērijus, augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ieviešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu pienākumus, informācijas sniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļa pircējam un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;
- 1.2. augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām (turpmāk – uzglabāšanas vieta) izvīrāmās prasības.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

- 1.¹ Atļaujas sniegšanas pamatojumu augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK. Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību Latvijā reglamentē saskaņā ar minēto regulu izdotie normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

2. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

II. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LAIŠANA TIRGŪ

3. Augu aizsardzības līdzekļu ieviešanu no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroles punktā vai muitas noliktavā (atkarībā no muietošanas vietas). Muitas procedūru noformē pēc šajā punktā noteiktās kontroles.
4. Licences īpašnieks septiņu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa ieviešanas Latvijā par to informē dienestu, iesniedzot dienestā augu aizsardzības līdzekļa ražotāja izsniegtu augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecināšu dokumentu.

5. Augu aizsardzības līdzekli nosūta atpakaļ uz trešo valsti, no kuras tas Latvijā ievests, ja:

- 5.1. augu aizsardzības līdzeklis nav reģistrēts Latvijā;
- 5.2. augu aizsardzības līdzeklim beidzies derīguma termiņš;
- 5.3. augu aizsardzības līdzeklis nav klasificēts, marķēts vai iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu;
- 5.4. augu aizsardzības līdzeklis nav iepakots oriģinālā iepakojumā vai tam nav ražotāja marķējuma latviešu valodā.

6. Latvijā neregistrētu augu aizsardzības līdzekli, ko paredzēts pārvest uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nosūta atpakaļ uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, no kuras tas ievests, ja augu aizsardzības līdzeklis:

- 6.1. nav reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;
- 6.2. nav klasificēts, iepakots vai marķēts saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunkta prasībām.

7. Latvijā atļauts ievest, ražot, uzglabāt vai transportēt neregistrētu augu aizsardzības līdzekli, ja tas paredzēts lietošanai:

- 7.1. kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvest;
- 7.2. kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir klasificēts, marķēts un iepakots atbilstoši normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu, izņemot prasību par marķējumu valsts valodā;

- 7.3. trešajā valstī un licences īpašnieks piecu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa izvešanas informē dienestu par katru no Latvijas izvesto augu aizsardzības līdzekļu partiju.

8. Neregistrētus augu aizsardzības līdzekļus līdz to pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai līdz izvešanai uz trešo valsti uzglabā noliktavā, kuras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

9. Licences īpašnieks 10 darbdienu pirms tāda neregistrēta augu aizsardzības līdzekļa ieviešanas

- uzglabāšanas vietā, kurš paredzēts pārvietošanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, rakstiski iesniedz dienestā informāciju, norādot:
- 9.1. Eiropas Savienības dalībvalsti, no kuras augu aizsardzības līdzekli ievēd, tās juridiskās personas nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kura nosūta augu aizsardzības līdzekli;
 - 9.2. Eiropas Savienības dalībvalsti, uz kuru paredzēts pārvēst augu aizsardzības līdzekli, tās juridiskās personas nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
 - 9.3. partijas numuru, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu.
10. Par pārvietošanai paredzēto neregistrēto augu aizsardzības līdzekli licences īpašnieka rīcībā ir šādi dokumenti:
- 10.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošs dokuments;
 - 10.2. dokuments, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 - 10.3. dokuments, kurā ir šāda informācija:
 - 10.3.1. Eiropas Savienības dalībvalsts, no kuras augu aizsardzības līdzekli ievēd, un tās juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
 - 10.3.2. Eiropas Savienības dalībvalsts, uz kuru paredzēts pārvēst augu aizsardzības līdzekli, un tās juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kura saņem augu aizsardzības līdzekli;
 - 10.3.3. partijas numurs, augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, daudzums, iepakojuma lielums.
11. Persona, kas atbild par neregistrēta augu aizsardzības līdzekļa pārvietošanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nodrošina:
- 11.1. augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinoša dokumenta kopiju katrai partijai;
 - 11.2. dokumentu, kas apliecina šī augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, uz kuru to paredzēts pārvēst.
12. Licences īpašnieks:
- 12.1. nodrošina, lai katrai jebkura augu aizsardzības līdzekļa partijai būtu kvalitāti apliecinošs dokuments, ja viņš ir attiecīgās augu aizsardzības līdzekļa partijas ievēdējs;
 - 12.2. nodrošina katram augu aizsardzības līdzeklim drošības datu lapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas;
 - 12.3. nodrošina iespēju dienesta inspektoram iepazīties ar šo noteikumu 29. un 31. punktā minētajiem uzskaites datiem, kā arī kontrolēt tirdzniecības vai uzglabāšanas vietas;
 - 12.4. glabā augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošus dokumentus un šo noteikumu 29. un 31. punktā minēto informāciju vismaz piecus gadus;
 - 12.5. nodrošina, lai tirdzniecības vietā ir darbinieks, kurš saņēmis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, vai augu aizsardzības konsultanta apliecību un kurš, pārdodot augu aizsardzības līdzekli, var konsultēt pircēju saskaņā ar šo noteikumu V nodaļas prasībām;
 - 12.6. pirms ievēstā augu aizsardzības līdzekļa tālākas izplatīšanas pārbauda, vai augu aizsardzības līdzekļa marķējumā nav šo noteikumu 15. punktā minēto būtisko neatbilstību;
 - 12.7. 24 stundu laikā pēc tam, kad konstatēta neatbilstība augu aizsardzības līdzekļa marķējuma informācijā (turpmāk – neatbilstošs marķējums), par neatbilstošo marķējumu informē dienestu un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvi un iesniedz dienestā iesniegumu par iespējamo neatbilstības novēršanas veidu. Dienests izvērtē iesniegumu un 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu;
 - 12.8. nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir dienesta lēmums (kopija), kurā paredzētas izmaiņas reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas vai izplatīšanas nosacījumos, kā arī nodrošina minētā lēmuma kopijas izsniegšanu personai, kas pērk šo augu aizsardzības līdzekli, ja tas paredzēts dienesta lēmumā.
- (Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)*
13. Persona, kas ievēd augu aizsardzības līdzekli, pēc licences īpašnieka pieprasījuma nekavējoties tam nodod augu aizsardzības līdzekļa kvalitāti apliecinošā dokumenta kopiju.
14. Licences īpašniekam aizliegts:
- 14.1. izplatīt augu aizsardzības līdzekli personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem;
 - 14.2. izplatīt pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus personām, kurām nav speciālas atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai vai apliecības par tiesībām konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, vai apliecības par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus;
 - 14.3. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kura iepakojums ir bojāts (izņemot šo noteikumu 70. punktā minēto gadījumu) vai bez marķējuma, kā arī tad, ja marķējums ir nesalasāms, bojāts, neatbilstošs vai labots

- (daļēji dzēsts, papildināts), ja nav saņemts šo noteikumu 17. punktā minētais dienesta lēmums;
- 14.4. pārbērt vai pārliet augu aizsardzības līdzekļus citā iepakojumā;
 - 14.5. izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, ja vien dienests nav pieņēmis lēmumu par atļaujas izsniegšanu šāda augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai.
 15. Marķējumu par būtiski neatbilstošu uzskata, ja:
 - 15.1. marķējuma teksts nav latviešu valodā;
 - 15.2. norādītās darbīgās vielas nav reģistrētas Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
 - 15.3. norādīts Latvijā neregistrēts augu aizsardzības līdzekļa lietojums.
 16. Licences īpašnieks, kas Latvijā ievēdis augu aizsardzības līdzekļa partiju, kam ir šo noteikumu 15. punktā minētais būtiski neatbilstošais marķējums, atsauc partiju no izplatīšanas šo noteikumu 20. punktā minētajā kārtībā, kā arī divu mēnešu laikā pēc neatbilstošā marķējuma konstatēšanas dienas to izved no Latvijas vai nodod apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu un iesniedz dienestā apliecinājumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)
 17. Augu aizsardzības līdzekļa partiju, kurai konstatēts neatbilstošs marķējums, atļauts izplatīt ar labotu marķējumu, ja neatbilstība saskaņā ar šo noteikumu 15. punktu nav būtiska un dienests ir pieņēmis lēmumu par atļauju labot augu aizsardzības līdzekļa marķējumu (turpmāk – dienesta lēmums).
 18. Licences īpašnieks dienesta lēmuma kopiju glabā katrā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības vietā un nodrošina augu aizsardzības līdzekļa marķējuma izlabošanu septiņu darbdienu laikā pēc dienesta lēmuma saņemšanas.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)
 19. Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka pārstāvja pienākums ir nekavējoties informēt citus licences īpašniekus, kas Latvijā ievēduši attiecīgo augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu.
 20. Lai atsauktu no izplatīšanas augu aizsardzības līdzekļa partiju ar neatbilstošu marķējumu vai partiju, kuras izplatīšanu dienests ir aizliedzis, licences īpašnieks nosūta paziņojumu citiem licences īpašniekiem, kam konkrētā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:
 - 20.1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma lielumu, partijas numuru;
 - 20.2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;
 - 20.3. tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku un atbildīgā darbinieka tālruna numuru. (Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)
 21. Lai dienesta inspektors varētu piedalīties tāda augu aizsardzības līdzekļa parauga noņemšanā, kuram beidzies derīguma termiņš, licences īpašnieks vismaz piecas darbdienu pirms parauga noņemšanas iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu (pielikums).
 22. Licences īpašnieks šo noteikumu 14.5. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanai iesniedz dienestā iesniegumu, kam pievienoti akreditētas laboratorijas augu aizsardzības līdzekļa parauga analīžu rezultāti.
 23. Dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 22. punktā minētajiem dokumentiem, pieņem lēmumu par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš, uz vienu gadu no dienas, kad parakstīti augu aizsardzības līdzekļa paraugu analīžu rezultāti, ja saskaņā ar tiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs joprojām atbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam.
 24. Ja saskaņā ar augu aizsardzības līdzekļa paraugu analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļa sastāvs neatbilst reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam, dienests atsaka atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai, kuram beidzies derīguma termiņš.
 25. Augu aizsardzības līdzekļus aizliegts izplatīt:
 - 25.1. izmantojot tirdzniecības automātus vai pašapkalpošanās sistēmas;
 - 25.2. izstādēs un citos publiskos pasākumos, ielu tirdzniecības vietās un tirgos.
 26. Augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietā ir aizliegta pārtikas, lopbarības un zāļu tirdzniecība, ja vien augu aizsardzības līdzekļi nav izvietoti atsevišķā telpā. (MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)
 27. Tirdzniecībai paredzētos augu aizsardzības līdzekļus izvieto slēgtā skapī vai plauktā atsevišķi no citām precēm. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:
 - 27.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;
 - 27.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
 28. Gaistošus augu aizsardzības līdzekļus atļauts izvietot tikai vēdināmās telpās.
 29. Licences īpašnieks reģistrācijas žurnālā uzskaita:
 - 29.1. saņemtos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī augu aizsardzības līdzekļus, kuri ir bojāti vai kuriem beidzies derīguma termiņš, norādot:
 - 29.1.1. saņemšanas datumu, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, iepakojuma lielumu un daudzumu – iegādātajiem augu aizsardzības līdzekļiem;

- 29.1.2. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, no noliktavas izsniegto daudzumu un atlikumu – augu aizsardzības līdzekļiem, kas atrodas noliktavā;
- 29.1.3. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, derīguma termiņa beigu datumu, parauga ņemšanas datumu, datumu, kad pieņemts lēmums par atļauju izplatīt augu aizsardzības līdzekli, kam beidzies derīguma termiņš, – augu aizsardzības līdzekļiem, kam beidzies derīguma termiņš;
- 29.1.4. nosaukumu, iepakojuma lielumu, daudzumu un bojājuma raksturu – augu aizsardzības līdzekļiem, kam bojāts iepakojums;
- 29.2. neregistrētos augu aizsardzības līdzekļus, kas saņemti un izvesti no noliktavas, norādot:
- 29.2.1. saņemšanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – iegādātajiem augu aizsardzības līdzekļiem;
- 29.2.2. nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – augu aizsardzības līdzekļiem, kas tiek glabāti noliktavā;
- 29.2.3. izvešanas datumu, nosaukumu, daudzumu, iepakojuma lielumu, partijas numuru – izvestajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
30. Šo noteikumu 29. punktā minēto uzskaiti var veikt elektroniski.
31. Personām izplatītos pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus licences īpašnieks reģistrē šo noteikumu 29. punktā minētajā reģistrācijas žurnālā, atzīmējot pircēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, apliecības numuru par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekli vai konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu vai speciālās atļaujas (licences) numuru augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, pārdotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un daudzumu.
32. Persona, kas iegādājusies augu aizsardzības līdzekli, reģistrācijas žurnālā ar parakstu apliecina šo noteikumu 31. punktā minētās ziņas.
- 32.¹ Licences īpašnieks katru gadu līdz 1. aprīlim, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, elektroniski iesniedz dienestam informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to realizācijas apjomu.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2017., sk. 75. punktu)

III. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UZGLABĀŠANA

33. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā speciāli iekārtotā uzglabāšanas vietā, ievērojot augu aizsardzības līdzekļa ražotāja noteiktos uzglabāšanas apstākļus un temperatūras režīmu.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)
- 33.¹ Augu aizsardzības līdzekļus glabā atsevišķi atbilstoši to lietošanas kategorijai.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)
34. Ja vairākiem licences īpašniekiem speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīta viena tirdzniecības vietas adrese, uzglabāšanas vietu iekārto tā, lai varētu identificēt augu aizsardzības līdzekļu izplatītāju un tam piederošos augu aizsardzības līdzekļus.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)
35. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot degvielas noliktavas, dzīvojamās vai administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kurām pastāv acīmredzams applūšanas risks, un pagrabus, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes.
36. Lai garantētu darba drošību, darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem uzglabāšanas vietā vienlaikus veic vismaz divas personas.
37. Uzglabāšanas vietā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
38. Uzglabāšanas vietā aizliegts glabāt pārtikas produktus, lopbarību un medikamentus.
39. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā slēgtā vēdināmā telpā atsevišķi no pārējiem augu aizsardzības līdzekļiem.
40. Ja uzglabāšanas vietā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem tiek glabātas citas preces, augu aizsardzības līdzekļus norobežo no pārējām precēm vai izvieto tos skapjos, nodrošinot ventilāciju. Šī prasība neattiecas uz šādiem trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem:
- 40.1. augu un dzīvnieku valsts izcelsmes augu aizsardzības līdzekļiem;
- 40.2. mikrobioloģiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem.
41. Augu aizsardzības līdzekli novieto plauktos (statīvos) vai uz paliktņiem tā, lai starp plauktu vai paliktņu rindām būtu vismaz vienu metru plata eja.
42. Ja augu aizsardzības līdzekļus:
- 42.1. novieto plauktā (ar vai bez paliktņiem), krāvuma augstums vienā plauktā nedrīkst pārsniegt 2,5 metrus;
- 42.2. novieto ar paliktņiem uz grīdas, krāvuma augstums uz viena paliktņa nedrīkst pārsniegt 1,6 metrus;
- 42.3. novieto ar paliktņiem citu uz cita, kopējais krāvuma augstums nedrīkst pārsniegt 2,6 metrus.
43. Uzglabāšanas vietu iekārto atbilstoši šādām tehniskajām prasībām:

- 43.1. ieklāj grīdu no ūdensnecaurļaidīga materiāla vai betona;
 - 43.2. ierīko ventilāciju ar atbilstošu gaisa cirkulāciju;
 - 43.3. ierīko ūdensvadu vai speciālu ierīci roku mazgāšanai.
 - 44. (*Svītrots ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652*)
 - 45. Uzglabāšanas vietā izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "UZMANĪBU, PESTICĪDI" un "NESMĒKĒT, NEĒST, NEDZERT".
 - 46. Neregistrētu augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietā papildus šo noteikumu 45. punktā minētajiem uzrakstiem izvieto labi redzamus uzrakstus uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "NEREGISTRĒTI AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI".
 - 47. Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem, vai kuru marķējums neatbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām, vai kuriem bojāts iepakojums, uzglabā atsevišķi. Šo līdzekļu uzglabāšanas vietā izvieto uzrakstu uz balta pamata ar vismaz 10 centimetru lieliem burtiem tumši sarkanā krāsā "PĀRDOT AIZLIEGTS". Augu aizsardzības līdzekļus, kuru iepakojums ir bojāts, likvidē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
 - 48. Uzglabāšanas vietā nodrošina:
 - 48.1. individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, respiratoru, aizsargbrilles, aizsargapģērbu, cimdus);
 - 48.2. absorbējošu materiālu (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdru);
 - 48.3. atsevišķu inventāru (slotu, spaini, liekšķeri), kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja augu aizsardzības līdzekļi izbirst vai izlīst.
 - 49. Uzglabāšanas vietā novieto labi redzamus norādījumus par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī tās personas uzvārdu, adresi un tālruna numuru, ar kuru var sazināties, ja noticis nelaimes gadījums vai avārija.
 - 50. Neregistrētus augu aizsardzības līdzekļus uzglabā atsevišķā telpā, ievērojot šo noteikumu 36., 37., 38., kā arī 41., 42., 43., 45. un 46. punktā minētās prasības.
- (*Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652*)

IV. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU TRANSPORTĒŠANA

- 51. Augu aizsardzības līdzekli pārvadā:
 - 51.1. oriģinālā nebojātā un marķētā iepakojumā;
 - 51.2. vietējos vai tranzīta pārvadājumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus.

- 52. Aizliegts pārvadāt augu aizsardzības līdzekli vienā kravas nodalījumā ar pārtikas produktiem, lopbarību un medikamentiem.

V. PĀRDEVĒJU UN AUGU AIZSARDZĪBAS KONSULTANTU PIENĀKUMI

- 53. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, vai augu aizsardzības konsultants, kas ieguvis šo noteikumu 12.5. apakšpunktā minēto apliecību, pircējam sniedz augu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļu marķējumam atbilstošu informāciju par:
 - 53.1. iespējamo konkrētā augu aizsardzības līdzekļa radīto risku cilvēku veselībai un videi, īpaši par tā bīstamību un kaitīgu iedarbību;
 - 53.2. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas un uzglabāšanas prasībām un drošu izlieto to augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu apglabāšanu;
 - 53.3. citām kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām ar mazu risku;
 - 53.4. citiem pircēju interesējošiem jautājumiem.
- (*Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652*)
- 54. Augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs vai konsultants pircējam, kas iegādājas trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekli un nav profesionāls augu aizsardzības līdzekļa lietotājs, sniedz šo noteikumu 53. punktā minēto informāciju, bet profesionālam augu aizsardzības līdzekļa lietotājam – pēc tā pieprasījuma.
- 55. Ja augu aizsardzības konsultants sniedzis normatīvajiem aktiem, augu aizsardzības līdzekļa reģistrētajiem lietošanas noteikumiem vai Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktajiem labas augu aizsardzības prakses principiem (publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē) neatbilstošas konsultācijas, persona ir tiesīga vērsties dienestā.

VI. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU APRITES KONTROLE

- 56. Kontrolējot augu aizsardzības līdzekļu apriti, dienests ņem paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, augu aizsardzības līdzekļu sagatavotiem darba šķidrumiem un priekšmetiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Lai noteiktu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, paraugus analizē laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts

- vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā akreditētā laboratorijā, vai laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma “Laba laboratorijas prakse”.
(*Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652*)
57. Lai pārbaudītu augu aizsardzības līdzekļu kvalitāti, dienests ņem kontroles iepakojumu.
58. Kontroles iepakojums ir augu aizsardzības līdzekļa vienas partijas viena iepakojuma vienība, ko dienests iesniedz šo noteikumu 56. punktā minētajā laboratorijā augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes analīzei.
59. Par analizējamo paraugu izmanto vismaz 200 mililitru augu aizsardzības līdzekļa. Ja augu aizsardzības līdzekļa iepakojuma tilpums ir mazāks par 200 mililitriem, ņem vairākus kontroles iepakojumus.
60. Kontroles iepakojumu dienests ņem, piedaloties augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam. Ja augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks atsakās piedalīties kontroles iepakojuma ņemšanas procedūrā, dienesta inspektors paraugu ņem bez augu aizsardzības līdzekļa īpašnieka klātbūtnes un pārbaudes aktā izdara atzīmi par īpašnieka atteikšanos piedalīties pārbaudē.
61. Par parauga vai kontroles iepakojuma ņemšanu dienesta inspektors sastāda aktu trijos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru kopā ar paraugu vai kontroles iepakojumu ievieto iesaiņojumā. Iesaiņojumu noslēdz tā, lai to nevarētu atvērt nesabojājot. Otrs akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, bet trešais – augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam.
62. Kontroles iepakojumu līdz nodošanai laboratorijā uzglabā atbilstoši augu aizsardzības līdzekļa uzglabāšanas prasībām.
63. Pamatojoties uz šo noteikumu 56. punktā minētās laboratorijas analīžu rezultātiem, dienests triju darbdienu laikā pēc rezultātu saņemšanas sagatavo atzinumu par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem.
(*MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā*)
64. Atzinums par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem attiecināms uz visu augu aizsardzības līdzekļa partiju.
(*MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā*)
65. Ja saskaņā ar atzinumu augu aizsardzības līdzeklis atbilst reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas izsniedz atzinuma kopiju augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas īpašnieka pārstāvim Latvijā.
(*MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā*)
66. Ja dienests pieņem lēmumu apturēt augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanu vai lietošanu Latvijā uz laiku, līdz pilnībā tiek noskaidrota augu aizsardzības līdzekļa atbilstība reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63. punktā minētā atzinuma parakstīšanas nosūta:
- 66.1. lēmumu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā;
- 66.2. kontroles iepakojumu augu aizsardzības līdzekļa atkārtotām analīzēm uz citu šo noteikumu 56. punktā minētajām prasībām atbilstošu laboratoriju, kurā atkārtoti analizē tos augu aizsardzības līdzekļa kvalitātes rādītājus, kas neatbilda prasībām.
(*MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā*)
67. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzeklis atbilst augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas nosacījumiem, dienests triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas atceļ lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa partijas izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu Latvijā. Lēmumu nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā.
(*MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā*)
68. Ja saskaņā ar atzinumu pēc atkārtoto analīžu rezultātiem augu aizsardzības līdzeklis neatbilst augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas nosacījumiem, dienests pieņem lēmumu par aizliegumu izplatīt vai lietot augu aizsardzības līdzekļa partiju Latvijā un uzliek par pienākumu augu aizsardzības līdzekļa partiju izvest no Latvijas vai nodot apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī segt visus ar augu aizsardzības līdzekļa kontroles parauga testēšanu saistītos izdevumus. Lēmumu triju darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas pārstāvim Latvijā, kā arī publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un dienesta tīmekļvietnē www.vaad.gov.lv.
(*MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā*)
69. Ja, veicot analīzes, augu aizsardzības līdzeklis nav izlietots vai nodots apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, dienests atdod kontroles iepakojuma daļu augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam un par to sastāda aktu divos eksemplāros. Viens akta eksemplārs paliek dienesta inspektoram, otrs – augu aizsardzības līdzekļa īpašniekam.
(*MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā*)
70. Šo noteikumu 69. punktā minēto kontroles iepakojuma daļu kopā ar vienu akta eksemplāru ievieto iesaiņojumā un noslēdz tā, lai to nevarētu atvērt nesabojājot. Šādu augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu ir atļauts izplatīt.
71. Ja dienests pieņēmis lēmumu aizliegt izplatīt nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa partiju, augu aizsardzības līdzekļa īpašnieks un pārējie

licences īpašnieki, kas ievēduši un izplatījuši augu aizsardzības līdzekli Latvijā, šo augu aizsardzības līdzekļa partiju atsauc no izplatīšanas un divu mēnešu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma saņemšanas izved no Latvijas vai nodod apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentu, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa partijas izvešanu no Latvijas vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

72. Lai atsauktu no izplatīšanas nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekļa partiju, licences īpašnieks nosūta paziņojumu personām, kurām attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa partija ir izplatīta. Paziņojumā norāda:

- 72.1. augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas numuru Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, iepakojuma apjomu, partijas numuru;

- 72.2. izplatīšanas aizlieguma iemeslu;

- 72.3. tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis atdodams, tās darba laiku, atbildīgā darbinieka tālruna numuru un citu informāciju, kura konkrētajā gadījumā ir būtiska.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 652)

73. Ja dienests pieņēmis lēmumu par nekvalitatīvā augu aizsardzības līdzekļa lietošanas aizliegumu, augu aizsardzības līdzekļa lietotājs konkrēto neizlietoto augu aizsardzības līdzekli nodod licences īpašniekam divu mēnešu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās. Licences īpašnieki piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā dienesta lēmuma izpildes iesniedz dienestā dokumentus, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa izvešanu vai nodošanu apsaimniekošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

74. Licences īpašniekam ir pienākums pieņemt pārdoto nekvalitatīvo augu aizsardzības līdzekli atpakaļ no pircēja un segt viņam radušos zaudējumus.

INFORMATĪVA ATSAUCE UZ EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVU

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

(Nodaļa MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 652 redakcijā)

75. Noteikumu 32.¹ punkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents **V. Dombrovskis**
Zemkopības ministre **L. Straujuma**

Pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 13. decembra noteikumiem Nr.949

Valsts augu aizsardzības dienestam

**Iesniegums par parauga noņemšanu augu aizsardzības līdzeklim,
kam beidzies derīguma termiņš**

Iesnieguma iesniedzējs _____
(nosaukums, adrese)

Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vieta _____
(adrese)

Speciālās atļaujas (licences) Nr. _____

Augu aizsardzības līdzekļa:

nosaukums _____

darbīgās vielas nosaukums _____, daudzums % _____

_____, daudzums % _____

_____, daudzums % _____

reģistrācijas numurs _____

partijas numurs _____

iepakojuma lielums _____ (l), (kg)

Iesniegumu aizpildīja _____
(vārds, uzvārds) (paraksts*)

Datums* _____

Iesniegumu pieņēma _____
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre **L. Straujuma**

Stājās spēkā: 24.12.2011.

Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (4600), 23.12.2011.

Grozījumi:

- MK 26.02.2013. noteikumi Nr.104 / LV, 42 (4848), 28.02.2013. / Stājas spēkā 01.03.2013.
- MK 19.11.2014. noteikumi Nr.706 / LV, 232 (5292), 22.11.2014. / Stājas spēkā 23.11.2014.
- MK 13.06.2017. noteikumi Nr.330 / LV, 119 (5946), 15.06.2017. / Stājas spēkā 16.06.2017.

Ministru kabineta noteikumi Nr.950

Rīgā 2011. gada 13. decembrī (prot. Nr.74 19.§)

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

*izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 5. punktu un 9. panta otro daļu*

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumi nosaka:
 - 1.1. augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un uzglabāšanas prasības;
 - 1.2. profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru pienākumus un tiesības;
 - 1.3. novērtējuma sagatavošanas kārtību par iespējamo risku augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa;
 - 1.4. atļaujas izsniegšanas kārtību augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa;
 - 1.5. speciālos pasākumus ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzībai.
2. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

II. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU UZGLABĀŠANAS PRASĪBAS

3. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā, ievērojot marķējumā noteiktos uzglabāšanas apstākļus, kā arī Augu aizsardzības likuma 9. panta trešās daļas un Aizsargjoslu likuma prasības.
4. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā plauktos vai uz paletēm. Ja uzglabāšanas vieta ir telpa, kurā persona var uzturēties, lai veiktu darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, kārtotu, pārvietotu), tajā nodrošina gaisa apmaiņu.
(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)
5. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot degvielas noliktavas, dzīvojamās vai administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kuras var applūst, un pagrabus, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes.
6. Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus uzglabā slēgtā, vēdināmā telpā atsevišķi no pārējiem augu aizsardzības līdzekļiem.
7. Izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus līdz to apglabāšanai tur kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem un apglabā saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību. Šo prasību var neievērot, ja izlietotā

augu aizsardzības līdzekļa iepakojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, vairs nav uzskatāms par bīstamu atkritumu.

III. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS PRASĪBAS

8. Saimniecībā, kurā tiek uzglabāti vai lietoti augu aizsardzības līdzekļi, darbā iesaistītajām personām ir pieejami:
 - 8.1. individuālie aizsardzības līdzekļi (piemēram, respirators, aizsargbrilles, aizsargapģērbs, cimdi);
 - 8.2. absorbējošie materiāli (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdra);
 - 8.3. inventārs, kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja augu aizsardzības līdzekļi izbirst vai izlīst (piemēram, slota, spainis, liekšķere).
9. Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu, kā arī ievērojot marķējuma prasības par augu aizsardzības līdzekļu atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas, kultūrauga attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību.
10. Par prasību ievērošanu attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību ir atbildīgs ikviens augu aizsardzības līdzekļu lietotājs, kā arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.
11. Lietošanai pēc iespējas izvēlas tādus augu aizsardzības līdzekļus, kuri potenciāli var radīt mazāku risku videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai, kuri nav kvalificēti kā bīstami ūdens videi un kuros nav prioritāro bīstamo vielu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu. Informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem un to iespējamo blakusiedarbību uz cilvēku veselību un vidi dienests ievieto un aktualizē savā tīmekļa vietnē.
12. Lai aizsargātu ūdens vidi un dzeramā ūdens ņemšanas vietas, augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības.

13. Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs kārtro reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas žurnālā uzskaita gan iegādātos augu aizsardzības līdzekļus (norāda saņemšanas datumu, augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, iepakojuma lielumu un daudzumu), gan izlietos augu aizsardzības līdzekļus (norāda informāciju par apstrādāto kultūraugu sugu vai objektu (piemēram, labības noliktava), apstrādāto teritoriju, tās platību, apstrādes datumu, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un devu). Reģistrācijas žurnālu glabā vismaz trīs gadus.
- 13.¹ Ja augu aizsardzības līdzekļi lietoti, izmantojot profesionāla augu aizsardzības līdzekļu lietotāja sniegtu pakalpojumu, tad pakalpojuma sniedzējs apstrādātā objekta īpašniekam izsniedz izrakstu no reģistrācijas žurnāla par apstrādāto objektu, norādot tajā šo noteikumu 13. punktā un 23.2. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pakalpojumu sniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi un lietotāja apliecības numuru. Izrakstu sagatavo divos eksemplāros, un uz eksemplāra, kas paliek pie pakalpojumu sniedzēja, jābūt apstrādātā objekta īpašnieka parakstam. Objekta īpašnieks izrakstu glabā trīs gadus un pēc pieprasījuma uzrāda dienestam.
(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)
14. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus, aizliegts:
 - 14.1. iesaistīt darbā personas, kas jaunākas par 18 gadiem, grūtnieces un mātes, kas baro bērnu ar krūti;
 - 14.2. izmantot bojātas, neregulētas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas, kā arī iekārtas, kas nav pārbaudītas normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām noteiktajā kārtībā;
 - 14.3. atstāt bez uzraudzības sagatavotus darba šķidrumus un neizlietos augu aizsardzības līdzekļus;
 - 14.4. izliet smidzināšanai paredzētā darba šķidruma atlikumu;
 - 14.5. nepiederošām personām uzturēties vietā, kur strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem;
 - 14.6. ēst, dzert un smēķēt.
15. Iztukšoto augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu darba šķidruma gatavošanas laikā trīs reizes izskalo ar tīru ūdeni un skalojamo ūdeni iepilda darba šķidruma tvertnē. Darbīgo vielu magnija un alumīnija fosfīdu saturošu augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu apsaimnieko atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un saskaņā ar norādēm šo augu aizsardzības līdzekļu marķējumā.
(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)
16. Pēc augu aizsardzības līdzekļa lietošanas darba šķidruma atlikumu atšķaida ar lielu ūdens daudzumu un izsmidzina uz apstrādāta lauka. Darbu beidzot, iekārtas tvertni izskalo ar tīru ūdeni vai ar lietotā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādīto mazgāšanas līdzekli, ko izsmidzina uz apstrādāta lauka.
17. Aizliegts atkārtoti izmantot izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus.
18. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sējumu un stādījumu apsmidzināšanai, ievēro šādus drošības pasākumus:
 - 18.1. augus drīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz četrus metrus sekundē. Ja smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt tad, ja vēja ātrums nepārsniedz astoņus metrus sekundē;
 - 18.2. strādājot seko smidzinātāja darba kvalitātei, kā arī preparāta izlietojumam.
19. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, persona, lietojot augu aizsardzības līdzekļus, ievēro marķējumā noteiktās īpašās drošības prasības, ja tajā ir:
 - 19.1. norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57;
 - 19.2. standartfrāze *Spe8*;
 - 19.3. citas norādes par bišu un citu apputeksnētāju aizsardzību.
20. Ja persona lieto augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm" vai ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57, tā trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes brīdina tos bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.
21. Lietojot augu aizsardzības līdzekļus sēklu kodināšanā, ievēro šādus drošības pasākumus:
 - 21.1. sēklas kodina speciāli iekārtotās telpās, nojumēs, laukumos un kodināšanai piemērotās iekārtās;
 - 21.2. kodināšanas darbos iesaistītās personas izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus;
 - 21.3. kodināto sēklu pārpalikumus uzglabā sausā aizslēgtā noliktavā atsevišķi no pārtikas un lopbarības graudiem iepakojumā ar norādi "KODINĀTS", norādot arī kodnes vai darbīgās vielas nosaukumu;
 - 21.4. pēc sēklu kodināšanas un sējas pabeigšanas kodināšanas vietu, sēklu kodināšanas iekārtas, sējmašīnas, sēklu iepildītājus un citas iekārtas, kurām ir bijusi saskare ar kodinātām sēklām, kā arī individuālos aizsardzības līdzekļus neitralizē, ievērojot norādes attiecīgās kodnes marķējumā;
 - 21.5. kodinātās sēklas aizliegts lietot pārtikā, izbarot dzīvniekiem un putniem, kā arī mazgāt vai attīrīt no kodnes, lai tās realizētu pārtikas vai lopbarības vajadzībām;
 - 21.6. kodinātās sēklas drīkst pārvadāt tikai šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētajos iepakojumos vai speciālos sējmašīnu uzpildītājos, kā arī sējmašīnu tvertnēs.

- 21.¹ Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai personām, kurām izsniegta profesionāla augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem.
(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)
22. Ja pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus lieto par fumigantiem fumigācijā (objekta apstrādē ar augu aizsardzības līdzekli gāzveida stāvoklī), ievēro šādas darba drošības prasības:
- 22.1. fumigāciju drīkst veikt tikai hermētiski noslēdzamā objektā, ja tas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no dzīvojamām, administratīvajām un publiskajām ēkām un ne tuvāk par 30 metriem no plašai sabiedrībai pieejamām teritorijām (piemēram, parka, sporta laukuma, atpūtas vietas);
 - 22.2. vienu dienu pirms fumigācijas sākšanas par fumigāciju un tās veikšanas laiku brīdina cilvēkus, kas atrodas objektam piegulošajā teritorijā;
 - 22.3. pirms fumigācijas sākšanas veic objekta hermetizāciju. Objekta hermētiskumu nodrošina visa procesa laikā;
 - 22.4. objektu norobežo un izvieto labi saredzamus brīdinājuma uzrakstus "BĪSTAMI DZĪVĪBAI" un "IEEJA AIZLIEGTA";
 - 22.5. lai garantētu darba drošību, fumigāciju veic vismaz divas personas;
 - 22.6. nodrošina personas klātbūtni objektā no fumigācijas sākuma līdz pilnīgai fumiganta neitralizācijai un telpu izvēdināšanai pēc fumigācijas beigām (turpmāk – degazācija);
 - 22.7. fumigācijā iesaistītās personas nodrošina ar gāzmaskām;
 - 22.8. fumigācijas sagatavošanu un fumiganta palaišanu veic diennakts gaišajā laikā;
 - 22.9. pirms degazācijas sākšanas mēra fumiganta koncentrāciju objektā, lai konstatētu, vai fumigācijas laikā sasniegta nepieciešamā fumiganta koncentrācija;
 - 22.10. degazāciju veic pakāpeniski, neļaujot izplūst atmosfērā lielumam fumiganta daudzumam;
 - 22.11. objekta degazāciju veic, līdz fumiganta koncentrācija sasniedz attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā paredzētos rādītājus.
- (Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.706)
23. Fumigācijas un degazācijas laikā:
- 23.1. mēra fumiganta koncentrāciju gaisā un nodrošina, lai augu aizsardzības līdzekļu koncentrācija nepārsniedz attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādītās pieļaujamās normas;
 - 23.2. reģistrācijas žurnālā papildus šo noteikumu 13. punktā minētajam norāda fumigācijas laiku, izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, apstrādāto produkciju, norādot produkcijas nosaukumu un apstrādāto apjomu, temperatūru pēc Celsija, kādā veikta apstrāde, mērījumu izdarīšanas laiku un fumiganta koncentrāciju.
(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.706)
24. Pēc degazācijas mēra fumiganta koncentrāciju visās telpās, kurās veikta fumigācija, ja šī koncentrācija norādīta augu aizsardzības līdzekļa marķējumā, un sastāda aktu par fumigācijas un degazācijas veikšanu. Aktu paraksta visas personas, kas piedalījušās fumigācijā.
(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)
25. Ja augu aizsardzības līdzekli lieto segtās platībās, tad pēc attiecīgā līdzekļa lietošanas tās noslēdz un pie durvīm pieliek brīdinājuma zīmi ar informāciju par lietoto augu aizsardzības līdzekli, kā arī norāda laiku, kad telpā atkal drīkstēs uzturēties, un par augu aizsardzības līdzekļa lietošanu atbildīgās personas tālruna numuru.
26. Teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra (EK) Regulas Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, 3. pantu (piemēram, parkā, sporta laukumā, atpūtas vietā, skolu teritorijā, slimnīcu teritorijā), augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tad, ja citādi nav iespējams ierobežot augiem kaitīgo organismu izplatību un lietošanas instrukcijā ir atļauts šāds konkrētā augu aizsardzības līdzekļa lietojums. Augu aizsardzības līdzekli plašai sabiedrībai pieejamās teritorijās lieto pēc iespējas tādā laikā, kad tajās neuzturas cilvēki.
27. Vismaz divas dienas pirms augu aizsardzības līdzekļu lietošanas šo noteikumu 26. punktā minētajās vietās atbildīgā persona vietējos novada vai pagasta laikrakstos vai savā tīmekļa vietnē ievieto paziņojumu par paredzēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanu vai citādi publisko šo informāciju.
28. Šo noteikumu 26. punktā minētajos gadījumos augu aizsardzības līdzekļa lietošanas laikā, kā arī pēc tā lietošanas apstrādāto teritoriju norobežo ar brīdinājuma zīmēm, kurās norādīta informācija par lietoto augu aizsardzības līdzekli, nogaidīšanas periodu un par to, kad atkal drīkst apmeklēt apstrādāto teritoriju.
29. Dzelzeļa līnijas, autoceļu daļas un ļoti caurlaidīgas teritorijas, kā arī necaurlaidīgas teritorijas, kas ir tuvu virszemes vai pazemes ūdeņiem, ir atļauts apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, tikai ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības un nodrošinot, ka augu aizsardzības līdzekli nenokļūst virszemes ūdeņos vai noteku sistēmās.

IV. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IZSMIDZINĀŠANA NO GAISA

30. Augu aizsardzības līdzekļus atļauts izsmidzināt no gaisa, ja saņemta dienesta atļauja augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa (turpmāk – atļauja).

31. Dienests, ievērojot šo noteikumu 34. punktā minētos nosacījumus, atļauju izsniedz šādos gadījumos:
 - 31.1. ja tas nepieciešams zinātniskām institūcijām pētījumu veikšanai lauksaimniecības nozarē;
 - 31.2. lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistītajām personām ārkārtas gadījumā;
 - 31.3. mežu apstrādei kokiem kaitīgo organismu masveida savairošanās gadījumā.
32. Lai saņemtu atļauju, ieinteresētā persona dienestā iesniedz:
 - 32.1. pieteikumu atļaujas saņemšanai. Pieteikumā pamatota atļaujas nepieciešamība, kā arī norādīta kaitīgā organisma identitāte, kultūrauga apdraudējuma apjoms, nozīmīgums, ekonomiskais apdraudējums, lietošanai paredzētā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, tā deva, apstrādājamā platība, paredzamais izsmidzināšanas laiks, kā arī pamatojums, kādēļ konkrētajā situācijā nav izmantojamas citas kaitīgā organisma apkarošanas metodes;
 - 32.2. karti, kurā iezīmēta apsmidzināšanai no gaisa paredzētā teritorija;
 - 32.3. informāciju par personu, kura veiks smidzināšanas darbus, kā arī par lietošanas iekārtām.
33. Dienests, pamatojoties uz iesniegto un citu dienesta rīcībā esošo informāciju, sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku un dzīvnieku veselību un veic riska analīzi ne ilgāk kā:
 - 33.1. divu nedēļu laikā, ja augu aizsardzības līdzeklis nav atļauts lietošanai Latvijā;
 - 33.2. vienas nedēļas laikā, ja augu aizsardzības līdzeklis ir atļauts lietošanai Latvijā.
34. Dienests pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja:
 - 34.1. nav citas piemērotas alternatīvas vai arī izsmidzināšanai no gaisa salīdzinājumā ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu uz zemes ir lielākas priekšrocības, lai mazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi;
 - 34.2. ir veikta riska analīze un gūts apstiprinājums tam, ka pozitīvais efekts no šāda augu aizsardzības līdzekļu lietojuma būs lielāks nekā iespējamais risks videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai;
 - 34.3. operators, kas veic smidzinājumu no gaisa, ir apmācīts un ieguvis apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus;
 - 34.4. lietošanas iekārtas ir pārbaudītas un atbilst normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām noteiktajām prasībām;
 - 34.5. lidaparāts ir reģistrēts normatīvajos aktos par aviāciju noteiktajā kārtībā un aprīkots ar piederumiem, kas atbilst labākai pieejamai tehnoloģijai, lai samazinātu augu aizsardzības līdzekļu nonesi ar vēju;
 - 34.6. apstrādājamā teritorija neatrodas dzīvojamo zonu tuvumā.
35. Atļaujā dienests iekļauj šādas ziņas:
 - 35.1. izmantošanai atļautā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums;
 - 35.2. izmantošanai atļautā teritorija, norādot precīzu tās vietu un platību;
 - 35.3. augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nosacījumi, ietverot riska ierobežošanas pasākumus;
 - 35.4. par augu aizsardzības līdzekļa lietošanu atbildīgā persona;
 - 35.5. plānotais augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanas datums, laiks un nogaidīšanas laiks – laika intervāls no apstrādes līdz laikam, kad teritorijā drīkst atkal uzturēties un veikt saimnieciskas darbības (piemēram, ogot, sēņot).
36. Persona, kas saņēmusi atļauju, pirms darbu veikšanas informē attiecīgās apkārtnes iedzīvotājus šo noteikumu 27. punktā minētajā kārtībā, kā arī veic šo noteikumu 28. punktā minētos drošības pasākumus.
37. Ja tiek izsniegta atļauja izsmidzināt augu aizsardzības līdzekļus no gaisa, dienests lēmumu publicē savā tīmekļa vietnē, kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)
38. Persona ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanas no gaisa iesniedz dienestā pārskatu par smidzinājumu, norādot datumu un laiku, kad notika izsmidzināšana, izlietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, tā daudzumu un devu, kā arī informāciju par apstrādāto teritoriju.
39. Persona sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar dienesta sagatavoto novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku un dzīvnieku veselību un riska analīzi un kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanai no gaisa, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

V. AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS KONTROLE

40. Kontrolējot augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, dienests augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtnes konstatēšanai var ņemt paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, sagatavotiem augu aizsardzības līdzekļu darba šķidrumiem un citiem priekšmetiem, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Paraugus analizē laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā akreditētā

laboratorijā, vai laboratorijā, kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Laba laboratorijas prakse".

41. Paraugus ņem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā. Augu aizsardzības līdzekļa paraugu dienests ņem saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū noteikto kārtību.

- 41.¹ Ja dienests šo noteikumu 40. punktā minētos paraugus ņem, pamatojoties uz personas lūgumu, ārpus dienesta īstenotās kontroles, ar parauga ņemšanu un novērtējuma sagatavošanu saistītos izdevumus sedz persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2015., sk 46. punktu)

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumus Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69. nr.; 2009, 70., 166. nr.; 2010, 174. nr.).
43. Līdz 2013. gada 31. maijam vai apliecības derīguma termiņa beigām (līdz ilgākajam no minētajiem termiņiem) pirmās un otrās reģistrācijas klases

augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot un iegādāties personām, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi" minētajām prasībām.

(MK 26.02.2013. noteikumu Nr.104 redakcijā)

44. Šo noteikumu 14.2. un 34.4. apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz iekārtu pārbaudi stājas spēkā 2016. gada 26. novembrī.

45. Šo noteikumu 34.5. apakšpunkta prasības attiecībā uz lidaparātu aprīkojumu stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī.

46. Šo noteikumu 41.¹ punkts stājas spēkā 2015. gada 1. februārī.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.706 redakcijā)

INFORMATĪVA ATSAUCE UZ EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVU

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents **V. Dombrovskis**

Zemkopības ministre **L. Straujuma**

Stājas spēkā: 11.03.1997.

Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 56/57 (771/772), 25.02.1997.,
"Zinotājs", 6, 27.03.1997.**Grozījumi:**

- 21.02.2002. likums/LV, 39 (2614), 12.03.2002./Stājas spēkā 26.03.2002.
- 19.06.2003. likums/LV, 101 (2866), 08.07.2003./Stājas spēkā 22.07.2003.
- 22.06.2005. likums/LV, 108 (3266), 12.07.2005./Stājas spēkā 15.07.2005.
- 06.03.2008. likums/LV, 43 (3827), 18.03.2008./Stājas spēkā 01.04.2008.
- 14.05.2009. likums/LV, 82 (4068), 27.05.2009./Stājas spēkā 10.06.2009.
- 16.12.2010. likums/LV, 205 (4397), 29.12.2010./Stājas spēkā 01.01.2011.
- 13.10.2011. likums/LV, 169 (4567), 26.10.2011./Stājas spēkā 09.11.2011.
- 14.03.2013. likums/LV, 61 (4867), 27.03.2013./Stājas spēkā 10.04.2013.
- 18.04.2013. likums/LV, 87 (4893), 08.05.2013./Stājas spēkā 22.05.2013.
- 23.05.2013. likums/LV, 106 (4912), 04.06.2013./Stājas spēkā 18.06.2013.
- 28.11.2013. likums/LV, 243 (5049), 12.12.2013./Stājas spēkā 01.03.2014.
- 23.10.2014. likums/LV, 220 (5280), 05.11.2014./Stājas spēkā 19.11.2014.
- 19.11.2015. likums/LV, 240 (5558), 08.12.2015./Stājas spēkā 22.12.2015.
- 19.05.2016. likums/LV, 108 (5680), 06.06.2016./Stājas spēkā 20.06.2016.

AIZSARGJOSLU LIKUMA IZRAKSTS

Redakcija:[01.01.2020.]

34. pants. Aizsargjoslu pārklāšanās

Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām.

35. pants. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās

- (1) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros.
- (2) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.
- (3) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas un pārbūves darbi veicami laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā.
- (4) Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.
- (5) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo

objektu ekspluatāciju un remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji pēc savstarpējas vienošanās.

- (6) Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai – pēc savstarpējas vienošanās – objekta īpašnieks vai valdītājs.
- (7) Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības.
- (8) Pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kontroles veikšanas kārtību. Objektu īpašnieku vai valdītāju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, – zemes lietotāju.
- (9) Tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, kuram noteikta aizsargjosla, izmanto šo aizsargjoslu, nemaksājot atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis nosacījums neierobežo nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo zaudējumu atlīdzību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002., 19.06.2003., 22.06.2005., 14.05.2009. un 19.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2016.)

36. pants. Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

(1) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā noteikti šādi aprobežojumi:

- 1) pilsētās un ciemos jaunveidojamās zemes vienības platību un apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;
- 2) ārpus pilsētām un ciemiem uz katra zemes īpašuma atļauts izvietot vienu viensētu ar palīgēkām, viesnīcu un tai līdzīga lietojuma ēku, tūrismam nepieciešamo skatu torni, šajā pantā minēto infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvi atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Sadalot zemes gabalu vairākos zemes gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem, izņemot gadījumus, kad atdalāmais zemes gabals ir nepieciešams šajā pantā minētās infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves nosacījumus paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;
- 3) ja, atsavinot vai iznomājot valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, paredzēta zemes lietojuma veida maiņa, kas nav noteikta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, katru reizi nepieciešams Ministru kabineta rīkojums;
- 4) aizliegts ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;
- 5) apdzīvotās vietās, lai saglabātu piekrastei raksturīgu kultūrvēsturisko ainavu, vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā var iekļaut papildu arhitektūras prasības jaunajai būvniecībai.

(2) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem aprobežojumiem aizliegts celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās, izņemot gadījumus, kad:

- 1) saskaņojot ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam tiek:
 - a) atjaunotas vai restaurētas esošās ēkas un būves;
 - b) būvētas palīgēkas pie esošajām dzīvojamām ēkām vai būvēm;
 - c) pārbūvētas esošās ēkas vai būves, nepārsniedzot esošo būvapjomu, bet, pārbūvējot esošās dzīvojamās ēkas, kuru platība ir mazāka par 150 kvadrātmetriem, to kopējā platība pēc pārbūves nedrīkst pārsniegt 150 kvadrātmetrus;
- 2) tiek attīstīta osta vai attīstīti un pārbūvēti esošie zvejniecības un zivju pārstrādes uzņēmumi;
- 3) ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana ir paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un notiek pilsētas teritorijā un šīs darbības ir saskaņotas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;

4) ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana notiek šā likuma 67. pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātajās un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciema robežās vietās, kur bijusi iepriekšējā apbūve, minētās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un saskaņotas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi;

5) tiek veikta krastu nostiprināšana esošo būvju un infrastruktūras aizsardzībai;

6) tiek veikta mehānisko transportlīdzekļu stāvlaukumu un glābšanas staciju būvniecība un tiem nepieciešamo pievedceļu un teritorijas labiekārtošanai nepieciešamo mazēku būvniecība.

(2¹) Šā panta otrajā daļā minētās darbības veic, ja:

- 1) veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu, novērtējuma ziņojumu vai izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām;
- 2) attiecīgā apbūve paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

(3) Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajam aizliegts:

- 1) atsavināt valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, izņemot likumos noteiktos gadījumus, kad personai ir tiesības iegūt īpašumā zemi zem ēkas (būves), ievērojot nosacījumu, ka īpašuma tiesības uz ēku (būvi) attiecīgajai personai ir nostiprinātas zemesgrāmatā;
- 2) pludmalē un tauvas joslā norobežot ar žogiem pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmģājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos, izņemot ostas teritoriju atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Lēmumi par nožogojumu nojaukšanu pieņemami un izpildāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 3) izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas, izņemot atbilstoši teritoriju plānojumam – ostas teritorijā, kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez vienlaidu pamatiem);
- 4) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvu ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām;
- 5) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
- 6) ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties ārpus autoceļiem, pludmalē, meža un lauksaimniecības zemēs, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;
- 7) rīkot publiskus sporta, izklaides vai atpūtas pasākumus, kas nav saskaņoti ar vietējo

- pašvaldību, bet, ja aizsargjosla atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, – ar šīs teritorijas administrāciju;
- 8) novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās būves, izņemot pludmales labiekārtošanas elementus, ārpus šim nolūkam vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām vietām;
 - 9) pārveidot reljefu, bojāt un iznīcināt dabisko zemsedzi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams šajā pantā atļauto darbību veikšanai.
- (4) Krasta kāpu aizsargjoslā papildus šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajam aizliegts:
- 1) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situācijas seku likvidēšanai, kā arī vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai;
 - 2) mežā veikt būvniecību, parku, mežaparku un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu, kuras rezultātā platība tiek atmežota, un laucēs veikt būvniecību, parku, mežaparku un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu bez Ministru kabineta iekreizēja rīkojuma. Iekreizēju rīkojumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai krasta kāpu aizsargjoslā esošā mežā Ministru kabinets izdod sešu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums saņemts vietējā pašvaldībā. Koku ciršanas kārtību krasta kāpu aizsargjoslā esošā mežā šajā punktā minēto darbību īstenošanai nosaka Ministru kabinets;
 - 3) kurt ugunscurus ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām un māju pagalmiem, izņemot gadījumus, kad jāiznīcina sausie, vēja izgāztie vai lauztie koki un slimību inficētie vai kaitēkļu invadētie materiāli;
 - 4) novietot teltis ārpus šim nolūkam iekārtotām vai norādītām vietām bez saskanošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
- (5) Pašvaldībai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājām-gājējiem piekļūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvietu ierīkošanai. Vietējā pašvaldība organizē gājēju celiņu ierīkošanu, ņemot vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, kā arī to, ka celiņi nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izņemot gadījumu, kad to nav iespējams nodrošināt dabā esošo apstākļu dēļ. Ja nepieciešams, pašvaldība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekļūt pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies aprobežojuma noteikšanas dēļ. Zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
- (6) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī kultūras un vēstures pieminekļu teritorijās kājām-gājēju pārvietošanos regulē šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
- (7) Ja ir paredzēts celt valsts nozīmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus, kuri nav paredzēti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, apbūve krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē ir pieļaujama tikai ar Ministru kabineta iekreizēju rīkojumu.
- (8) Jūras aizsargjoslā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību. Vietējā pašvaldība nosaka speciāli iezīmētas vietas, kurās atļauts braukt ar ūdens motocikliem.
- (19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005., 14.05.2009., 13.10.2011., 14.03.2013. un 19.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2016.)*
- 37. pants. Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās**
- (1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās papildus šā likuma 35. pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:
- 1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos vai lokālplānojumos paredzētās vietas;
 - 2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
 - 3) aizliegts veikt kailcirtes 50 metrus platā joslā vai visā aizsargjoslas platumā, ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, izņemot mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai. Veicot kailcirti mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, ievēro šādus nosacījumus:
 - a) saglabā ozolus, liepas, vīksnas, gobas, kļavas, priedes, melnalkšņus, vītulus un mežābeles,
 - b) aizliegta koku ciršana nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 30 grādus,
 - c) aizliegta koku ciršana no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam,
 - d) kailcirtes platība virszemes ūdens objekta aizsargjoslā nepārsniedz vienu hektāru,
 - e) atjaunojot mežaudzi, egļu īpatsvars nepārsniedz 80 procentus no kopējā ieaugušo koku skaita;
 - 4) applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, izņemot:
 - a) īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku būvniecību,
 - b) esošo būvju atjaunošanu,

- c) kultūras pieminekļu restaurāciju,
 - d) transporta un elektronisko sakaru tīklu būvju būvniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, enerģijas pārvades un sadales būvju būvniecību,
 - e) peldvietu, eliņu, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātņu būvniecību,
 - f) jahtu ostu būvniecību, kurās paredzētas ne mazāk kā 25 atpūtas kuģu stāvvietas ūdenī, un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu būvniecību,
 - g) valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu staciju un posteņu un citu stacionāru valsts nozīmes monitoringa punktu un posteņu būvniecību,
 - h) biotopu apsaimniekošanai nepieciešamo īslaicīgas lietošanas būvju un dabas tūrisma nepieciešamo skatu torņu, laipu u.tml. objektu būvniecību,
 - i) inženieraizsardzības un hidrotehnisko būvju izbūvi esošās apbūves aizsardzībai pret paliem vai plūdiem un stacionārās aizsardzības būves piesārņojuma aizturēšanai un savākšanai,
 - j) teritorijas uzbēršanu šā punkta "d", "e", "f", "g" un "i" apakšpunktā noteiktās būvniecības īstenošanai;
- 4¹) ostu applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, izņemot hidrotehniskās būves, piestātnes, infrastruktūras, inženierkomunikācijas un citas ar ostu darbību saistītās būves un veikt minētajām būvēm nepieciešamo teritorijas uzbēršanu, arī esošo būvju atjaunošanu, ja šādas darbības nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, arī prasības, kas noteiktas attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu;
- 5) 10 metrus platā joslā papildus šīs daļas 1., 2., 3., 4. un 4.¹ punktā minētajam aizliegts:
- a) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
 - b) būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot esošo būvju atjaunošanu; kultūras pieminekļu restaurāciju; transporta un elektronisko sakaru tīklu būvniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ņemšanas ietaišu un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, enerģijas pārvades un sadales būvju būvniecību; peldvietu, eliņu, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātņu būvniecību; valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu staciju un posteņu un citu stacionāru valsts nozīmes monitoringa punktu un posteņu būvniecību, kā arī krastu nostiprināšanu; ostu teritorijā esošo hidrotehnisko būvju, piestātņu, infrastruktūras, inženierkomunikācijas, kā arī citu ar ostu darbību saistītu būvju būvniecību; jahtu ostu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju un infrastruktūras objektu būvniecību, kā arī šīs daļas 4. un 4.¹ punktā minētajos gadījumos paredzēto teritorijas uzbēršanu),
 - c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,
 - d) ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi,
 - e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis,
 - f) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai,
 - g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku,
 - h) veikt teritorijas atmežošanu, ja tā nav saistīta ar šā punkta "b" apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem,
 - i) kurt ugunsķurkus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju,
 - j) ierīkot tehnoloģiskos koridorus kokmateriālu pievešanai;
- 6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;
- 7) aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas;
- (1) Šā panta pirmās daļas 4. punktā minētās darbības drīkst veikt, ja tās nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, arī prasības, kas noteiktas attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu.
- (2) Virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību.
- (3) Vietējā pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu nožogojumu nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Vietējā pašvaldība veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas nožogojumu viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
- (21.02.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003., 06.03.2008., 14.05.2009., 13.10.2011., 19.11.2015. un 19.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2016.)*
- 37.¹ pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap purviem**
 Aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrēm nosaka Meža likums.

(21.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2002.)

38. pants. Aprobežojumi aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem

Aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem papildus šā likuma 35. pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:

- 1) jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;
- 2) pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemi, aizliegts to sadalīt;
- 3) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;
- 4) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
- 5) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;
- 6) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.

39. pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām

Aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām papildus šā likuma 35. pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:

- 1) stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvī konkrētā ūdensapgādes urbūmā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;
- 2) bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto pazemes (no virszemes piesārņojuma infiltrācijas neaizsargātu) ūdens horizontu, kā arī pazemes ūdens resursu mākslīgas papildināšanas metodi, jāievēro šā panta 1. punktā minētie aprobežojumi. Bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts:
 - a) izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas

materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot teritoriju plānojumos vai lokālplānojumos paredzētās vietas,

- b) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus,
 - c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
 - d) aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm,
 - e) veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus,
 - f) veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus,
 - g) glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas,
 - h) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;
- 3) ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi;
- 4) ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto grunts-ūdeņu (neaizsargātu) ūdens horizontu vai pazemes ūdens krājumu mākslīgas papildināšanas metodi, ķīmiskajā aizsargjoslā 500 metru platā joslā ap stingrā režīma aizsargjoslu aizliegts:
- a) veikt meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu esošo ciemu teritorijās un ēku un būvju būvniecībai viensētās ārpus ciema teritorijas robežām, kā arī gadījumos, kad tas nepieciešams ūdensapgādes būvju būvniecībai,
 - b) veidot jaunus ciemus un paplašināt esošos,
 - c) ārpus esošajiem ciemiem sadalīt zemi zemes vienībās, kas mazākas par 2400 kvadrātmetriem,
 - d) no jauna projektējamās un pārbūvējamās būvobjektos novadīt notekūdeņus (arī pēc attīrīšanas lokālajās attīrīšanas iekārtās) gruntī un virszemes ūdensobjektos,
 - e) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus.

(21.02.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2009., 13.10.2011., 23.10.2014. un 19.05.2016. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2016.)

IZRAKSTS NO LIKUMA

„LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSS”

07.12.1984. likums “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” (Ziņotājs, 51, 20.12.1984.)
[stājas spēkā 01.07.1985.] ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 30.12.2014.

Redakcija: [01.01.2020]

102.2 pants. Augu aizsardzības līdzekļu ieviešanas, izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas prasību pārkāpšana

Par Latvijā neregistrētu augu aizsardzības līdzekļu ieviešanu, izplatīšanu vai lietošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit *euro*, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt *euro*, konfiscējot neregistrētos augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas vai lietošanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit *euro*, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt *euro*, konfiscējot augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt *euro*, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrpadsmit trīssimt *euro*, konfiscējot augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Tiesību akts zaudēs spēku 2020.gada 1.jūlijā.

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA TELEFONA NUMURI

Direktors	67027098
Galvenā eksperte (dokumentu pārvaldības jomā)	67027406
Direktora vietnieks – galvenais inspektors	67027186
Agroķīmijas departaments	67551272

AUGU AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTS

Direktors	67550929
Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa	67185481
	67185479
Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļa	67550923
Integrētās augu aizsardzības daļa	67185478
	67550951

AUGU KARANTĪNAS DEPARTAMENTS

Direktors	67550931
Fitosanitārās uzraudzības daļa	67550926
Nacionālā fitosanitārā laboratorija	67543138

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA REĢIONĀLĀS NODAĻAS

Rīgas reģionālā nodaļa	67324506	Vidzemes reģionālā nodaļa ..	64221594
Rīga	67325849	Valmiera	64221578
Tukums	63122778		64221591
Kurzemes reģionālā nodaļa ..	63222552		64221137
Tālsi	63232248	Priekuli	64123937
.....	63221286		64130977
Kuldīga	63322092		64130300
.....	63348239	Alūksne	64322963
Liepāja	63427206	Gulbene	64471050
.....	63425068	Madona	64822541
Saldus	63821377	Latgales reģionālā nodaļa ..	65444113
	63822679	Daugavpils	65440058
Ventspils	63628548		65444112
Zemgales reģionālā nodaļa ..	63022541		65474059
Jelgava	63010920	Rēzekne	64622728
.....	63027872	Balvi	64522971
Bauska	63926692	Preiļi	65307405
.....	63922318	Krāslava	65623832
Dobele	63791288		65624592
Aizkraukle	65123591	Ludza	65723565
Jēkabpils	65233164		
	65235207		

Mājaslapa: <http://www.vaad.gov.lv>

Informāciju par 2020.gadā reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to lietojumu un apstiprinātajām izmaiņām iepriekš reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietojumā var atrast Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā <http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba.aspx>



Sākums > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība



Rapša fenoloģiskās attīstības stadijas (BBCH identifikācijas skala)

Dīgļlapu atraisīšanās	10	
Pirmā lapiņu pāra attīstība	11	
Otrā lapiņu pāra attīstība	13	
Astotā lapu pāra attīstība	18	
Divu starpmezglu posmu attīstība	32	
Ziedkopas veidošanās	51	
10% ziedu galvenajā dzinumā	61	
Ziedēšanas beigas	69	
Nogatavošanās	79	
	89	

Sēkleņu augļu koku fenoloģiskās attīstības stadijas (BBCH identifikācijas skala)

Miera periods	00	
Pumpuru briešana	51	
Zaļais konuss	53	
Peļausu stadija	54	
Ziedpumpuru parādīšanās	55	
Ziedpumpuru uzbriešana	59	
Ziedēšanas sākums	61	
Augļaizmetņu augšana (līdz 10 mm diametrā)	71	
Augļa augšana	75	